

يشغل **كريس بولند** الحائز شهادة الدكتوراه في علوم الأحياء تخصص علم الطيور من جامعة أستراليا الوطنية (ANU)، منصب عالم لبيئة الأرض في إدارة حماية البيئة بأرامكو السعودية منذ عام 2012. كما عمل محاضراً لعلوم البيئة وسلوك الحيوانات والوراثة وحفظ الأحياء في جامعة أستراليا الوطنية لخمس سنوات، قبل إدارة عدد من مشروعات حفظ الأحياء الوطنية، بما في ذلك الطيور والزواحف والثدييات وسرطان البحر والحشرات والنباتات والشعاب المرجانية. نشر أكثر من 20 ورقة بحث علمية في المحافل الدولية، وهو المؤلف الرئيس للكتاب *Field Guide to the Biodiversity of Dhahran*.

شغل **عبدالله السحيباني** وظيفة عالم بيئي في إدارة حماية البيئة بأرامكو السعودية، وذلك في الفترة من عام 2015 وحتى 2019، وهو حائز شهادة الماجستير في علوم حماية البيئة البحرية تخصص علم الطيور، من جامعة شمال ويلز بالمملكة المتحدة. كما عمل على مدى 30 عاماً في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمملكة العربية السعودية. يشغل حالياً منصب نائب المدير التنفيذي في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة.



يعد **«الطيور في السعودية»** أول كتاب متخصص يتحدث عن أنواع الطيور المسجلة في المملكة العربية السعودية التي وصل عددها حتى الوقت الراهن إلى 499 نوعاً، منها 401 نوع أصيل ومهاجر و11 نوعاً غريباً و87 نوعاً شاردأ. والكتاب مؤلف من مجلدين، ويتضمنان نحو ألف صورة تم التقاطها من خلال عدسات مجموعة من مصوري الحياة البرية في المملكة. وتحاكي هذه الصور الرائعة المحتوى التحريري الذي أشرف عليه خبراء الطيور الرواد في البلاد لتقديم أفضل دراسة شمولية حول الطيور في المملكة العربية السعودية.

booksarabia.com

موتيفيت
ميديا جروب



الطيور في السعودية

حياة الطيور

~ المجلد الثاني ~

الطيور في السعودية

أوصاف الأنواع

~ المجلد الثاني ~



أرامكو السعودية
saudi aramco

تتسم الطيور في المملكة العربية السعودية بتنوعها المذهل وروعتها وجمالها الأخاذ وتنفرد بخصائص نادرة. فيظهر من بينها الأكبر والأسرع في العالم، ناهيك عن الأكثر ندرة وغرابة، فضلاً عن مجموعة من الطيور المهاجرة، إلى جانب صغيرة الحجم وغيرها. واحتفاءً بجمال هذه الطيور الرائعة، جاء هذا الكتاب بمجلديه؛ الأول والثاني، ليرصد طرفاً من روعة هذا الجمال، ويوثق شيئاً من أسرار حياة طيور المملكة.

ويتناول المجلد الثاني التعداد الدقيق لأنواع الطيور في المملكة العربية السعودية. كما يزدان بالصور وخرائط التوزيع والمعدلات السنوية ووصوفات للطيور وأنواعها الـ 401، الأصيلة والمهاجرة، والأنواع الـ 11 الغريبة التي شكلت تجمعات تكاثرية في البلاد، فضلاً عن 87 نوعاً شاردأ تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية.

ومما لا شك فيه أن الدراسات التي تناولت في طياتها الطيور في المملكة العربية السعودية قليلة جداً، غير أن هذا الكتاب من شأنه الإسهام في مساعدة القراء على التعرف إلى التنوع المذهل للطيور في المملكة. إضافة إلى ذلك، سيشيخ للقراء فرصة الاستمتاع بمحتواه الغني حول الطيور، وكيفية المحافظة عليها وحمايتها والاعتزاز بها أيضاً.

الطيور في السعودية

الطيور في السعودية

إعداد كريس بولند وعبدالله السحيباني

المجلد الثاني: أوصاف الأنواع

صدر بإسهامات مشكورة من:

جيم بابنغتون، أرامكو السعودية

فيليب روبرتس، أرامكو السعودية

مايكل جينينغز، مؤسسة التوازن البيئي

بيتر كاستل، مؤسسة التوازن البيئي

أرامكو السعودية
saudi aramco



إصدار: **موتيفيت ميديا جروب**

دبي

مينى ميديا ون، مدينة دبي للإعلام
ص.ب 2331، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 427 3000 (4 971 +) فاكس: 428 2268 (4 971 +)
البريد الإلكتروني: books@motivate.ae
الموقع الشبكي: www.booksarabia.com

أبوظبي

برج مكين، شارع رقم 9، الزاهية
ص.ب 43072، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 657 3490 (2 971 +)

لندن

إيكر هاوس، 11/15 ويليام رود،
لندن إن دبليو 1 3 إي آر

رئيسا التحرير: عبيد حميد الطائر، وإيان فيرسيرفيس

الناشر: إيان فيرسيرفيس

مدير عام تحرير المجموعة: أندرو وينغروف

مديرا النشر: أحمد سعيد السكيثي، وملدا صمادي

مسؤول التحرير والإنتاج (القسم العربي): رباب برهم

مترجم أول: يزيد النجار

المدير الفني: أحمد أبو طاحون

المراجعة اللغوية - أرامكو السعودية:

سعيد الغامدي

عبدالوهاب بوزيد

محمد عذاربه

© الحقوق محفوظة، أرامكو السعودية، 2020

حقوق الصور محفوظة:

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل كان (بما في ذلك النسخ المصورة أو استخدام الوسائل الإلكترونية) من دون الموافقة المكتوبة لأصحاب حقوق النشر. وينبغي توجيه الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المكتوبة لأصحاب حقوق النشر بهدف إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب، إلى الناشرين طبقاً لقانون حقوق النشر الدولي لعام 1956. وللقانون الاتحادي رقم (7) لعام 2002 الخاص بحقوق النشر الخاصة بالمنشئ الأصلي والمنشئين الثانويين. وكل من يتصرف بما يخالف حقوق النشر المذكورة سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمطالبة بالأضرار الناجمة عن ذلك.

الأرشفة في المكتبة البريطانية:

يوجد إدراج خاص بهذا الكتاب في المكتبة البريطانية.

ISBN: 978 1 xxxx xxx xx

رقم الترخيص من المجلس الوطني للإعلام: MC-02-01-xxxxxx

المحتويات

vii	مدخل إلى المجلد الثاني
1	أنواع الطيور الأصيلة والمهاجرة
405	أنواع الطيور الغريبة المدخلة
419	أنواع الطيور الشاردة
432	الكتب والمراجع الأدبية
443	فهرس بأسماء الطيور العلمية
447	فهرس بأسماء الطيور الشائعة



مدخل إلى المجلد الثاني

يشتمل هذا المجلد على وصف لكل نوع من الأنواع الأصلية والمهاجرة الموجودة في المملكة بانتظام، والبالغ عددها 401 نوعاً، يليه وصف للأنواع الغريبة المدخلة التي تكاثرت بشكل هائل داخل المملكة وعددها 11، ومن ثم قائمة مفضلة بالأنواع الشاردة المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 87 نوعاً.

حالة الحماية ومنحى المجموعات

أُقْبِس حالة الحماية العالمي ومنحى المجموعة لكل نوع من القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (www.iucnredlist.org)، والمحدثة حتى 10 مارس 2020، فيما تم اقتباس حالة الحماية الإقليمي ومنحى المجموعة من القائمة 1 للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مع مراعاة تحديثات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عند الاقتضاء. إضافة إلى ما سبق، تم إدراج معلومات حول كل نوع تتعلق بحالة الحماية للأنواع المهددة عالمياً أو المهددة بالانقراض إقليمياً، وهي المعلومات التي تم استقاؤها إلى حد بعيد من القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ودليل طيور العالم، فضلاً عن سجلاتنا الخاصة.

الحجم والوزن وباع الجناح

تم اقتباس القياسات الخاصة بحجم الجسم والوزن وباع الجناح من دليل طيور العالم 2، مع مراعاة التحديثات في سجلاتنا الخاصة عند الاقتضاء. أما بالنسبة للأنواع التي تُشاهد غالباً أثناء الطيران، فنعرض لقياسات باع الجناح الخاصة بها في نهاية الوصف.

حالته بالمملكة

كما وضحنا بالتفصيل في المجلد الأول، تظهر الطيور في السعودية في وضع واحد أو أكثر وفق ما يلي:

- الأنواع المقيمة المتكاثرة، وهي التي تبقى في المملكة على مدار السنة وتتكاثر داخل أراضيها.
- الأنواع المهاجرة المتكاثرة، وهي التي تصل

يشتمل هذا المجلد على وصف لكل نوع من الأنواع الأصلية والمهاجرة الموجودة في المملكة بانتظام، والبالغ عددها 401 نوعاً، يليه وصف للأنواع الغريبة المدخلة التي تكاثرت بشكل هائل داخل المملكة وعددها 11، ومن ثم قائمة مفضلة بالأنواع الشاردة المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 87 نوعاً.

قائمة مرجعية بطيور المملكة العربية السعودية

حتى تاريخه، لا توجد قائمة مرجعية رسمية بأسماء الطيور في المملكة العربية السعودية، ولغرض هذا الكتاب، فقد حرصنا على جمع معلومات الخبراء وملاحظات كبار العلماء والمصورين المعنيين بالطيور في المملكة لوضع قائمة مرجعية شاملة تتضمن 401 نوعاً أصيلاً ومهاجراً موجوداً بانتظام في المملكة، و11 نوعاً غريباً، و87 نوعاً شارباً. وبذلك، يوجد 499 نوعاً مسجلاً من الطيور على وجه اليقين في المملكة. ومن ثم نضع بين يديك – أيها القارئ – ما نعتقد أنها أدق قائمة مرجعية جمعت لأسماء طيور المملكة العربية السعودية على الإطلاق (الملحق 1 في المجلد الأول).

أسماء الأنواع وتصنيفاتها

تستند التصنيفات والأسماء الشائعة وكذلك الأسماء النوعية إلى التصنيف الذي تستخدمه جمعية الطيور العالمية، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، ودليل طيور العالم. ومن المتفق عليه اصطلاحاً أن تكون أسماء الطيور الرسمية مكتوبة بالإنجليزية البريطانية (أما بقيتها في الكتاب فمكتوبة بالإنجليزية الأميركية). من جهة أخرى، الأسماء العربية هي أسماء شائعة الاستخدام داخل المملكة، في حين الأسماء العربية الأخرى أُخِذت من كتاب بعنوان «طيور الشرق الأوسط» من تأليف بوتر وأسبينال

نبح عربي (يومة الأشجار العربية)



الفصل الأول

أنواع الطيور الأصيلة والمهاجرة



دجاجة حبشية*Numida meleagris*

Helmeted Guineafowl

غير مهدد

مستقر

معرض للانقراض

يتناقص

53 - 63 سم / 1,135 - 1,823 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يُوجد في مناطق كثيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء الغابات الاستوائية، والصحاري شديدة الجفاف)، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية واليمن). وقد تم إدخاله بشكل مُتعمد في مواقع عديدة حول العالم. مع التنويه بوجود إجراء دراسات جينية لتحديد ما إذا كان التعداد العربي الفرعي مستقلاً، أم أنه نشأ عن عمليات التوطین المقصودة. **حاليته بالمملكة: مقيم** بمعدل انخفاض تعداده الحالي، قد يفرض هذا الطائر الرائع في المملكة بحلول عام 2030.

لغذاء جيد من الأشجار والأدغال المنخفضة، حيث يستخدم المياه السطحية القريبة في الشرب، والغذاء النباتي الكثيف للاختباء والتعشيش. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** المواد النباتية، واللافقاريات التي يلتقطها بالنش في الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً في أسراب صغيرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية موسمياً، أو مجموعات متعددة التزاوج، حيث تضع إناث متعددة بيضها في عش واحد. وقد يحاول الذكر التزاوج مع إناث عدة في وقتٍ مبكر من الموسم. **الأدوار الأبوية:** تختار الأنثى موقع العش وتبنيه وتحضن البيض، فيما يعتني الأبوان معاً بالصغار (يتولى الذكر معظم الرعاية على مدار أول أسبوعين). ثم ينضم الأبوان والصغار إلى أسراب أكبر بعد مدة تراوح بين شهر إلى 3 أشهر. **العش:** حفرة ضحلة على الأرض، مبطنة بالنباتات والريش ومخفية جيداً في غطاء نباتي كثيف (مثل العشب الطويل، أو قاعدة كتلة من الأعشاب النامية، أو أسفل شجيرة). **البيض المحضون:** 6 - 12 بيضة (حتى 50 بيضة إذا وضعت أكثر من أنثى بيضها في عش واحد). **الحضانة:** 24 - 27 يوماً. **مدة التعشيش:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير عند سن 30 يوماً. **الحضنة:** على الأرجح حضنة واحدة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500

منطقة النشاط: برك معالجة مياه الصرف في جازان

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

النعام*Struthio camelus*

Common Ostrich

غير مهدد

يتناقص

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

175 - 275 سم / الذكر 100 - 156 كغم؛ الأنثى 90 - 100 كغم (أخف وزناً بنسبة 20%)




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جنوب أفريقيا ومنطقة الساحل حتى شرق أفريقيا. كما كان يوجد سابقاً في أرجاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر جداً.** كان النوع الفرعي العربي المتوطن (*S. c. syriacus*) من النعام، يتجول في أنحاء شبه الجزيرة العربية حتى سوريا، وظل موجوداً بكثرة خلال القرن التاسع عشر، لكن تم اصطياده حتى انقرض في الفترة ما بين 1939 و1966. ولحسن الحظ، أعيد إدخاله (باستخدام النوع الفرعي الأفريقي الأوثق صلة *S. c. camelus*) في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز (محارة الصيد) (1994)، وعروق بني معارض (2017)، ومحمية الحياة البرية في الشبية؛ وهي محمية مسيجة كبيرة تابعة لشركة أرامكو السعودية (2016). **الموئل:** سابقاً كان يوجد في السهول الحجرية الصلبة ذات الأشجار الخفيضة (منها الحزات) في الشمال والسهوب القاحلة في أطراف الربع الخالي. ويقتصر وجوده اليوم، على ثلاثة من بين مواقع إعادة التوطین. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الأعشاب والبيذور وأوراق الأشجار الملتقطة من الأرض، أو بالقرب منها. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يبحث عادةً عن الغذاء في أسراب صغيرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة منفردة، أو مجموعات تتكون من ذكر مهيم وأنثى

رئيسية، وما بين 2 - 5 إناث إضافية. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن المنطقة بندايات مُدوية ويجهز العش. ويتولى الذكر والأنثى الرئيسية (فقط) حضنة البيض والاعتناء بالفراخ وإطعام الصغار لمدة 9 أشهر. **العش:** حفرة ضحلة (قطرها 3 م) على أرض مفتوحة. **البيض المحضون:** تضع الأنثى الرئيسية ما بين 5 - 11 بيضة، في حين تضع كل أنثى ثانوية عدداً إضافياً من البيض يراوح ما بين 2 - 6 ببوض في عش الأنثى الرئيسية. **الحضانة:** 42 - 45 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد 3 - 5 أيام، ويكتمل ريشها في عمر 4 - 5 أشهر. **الحضنة:** عادةً حضنة واحدة.

يُوم أن كانت النعام شائعة، تم اصطيادها حتى انقرضت في شبه الجزيرة العربية بحلول عام 1966. ومنذ ذلك الحين، أعيد إدخالها في ثلاث مناطق محمية كبرى من المملكة العربية السعودية.

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 80

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 80

منطقة النشاط: محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز

(محارة الصيد)

الاسم العربي: **سمان شائعة**الاسم العلمي: *Coturnix coturnix*

الاسم الشائع: Common Quail

حالة الحماية العالمية: غير مهدد

المنحى العالمي للمجموعة: يتناقص

حالة الحماية الإقليمية: غير مهدد


المنحى الإقليمي للمجموعة: مستقر (ربما يتزايد)

الحجم والوزن: 16 - 18 سم / 70 - 155 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في غرب ووسط أوراسيا، من الجزر البريطانية حتى وسط روسيا، وجنوباً نحو العراق مع وجود تعدادات صغيرة معزولة منه في شبه الجزيرة العربية. كما يقضي شتاءه على بُعد 2,000 - 7,000 كم جنوباً في منطقة الساحل الأفريقي والهند. **حالته بالمملكة: مهاجر متكاثر غير شائع، ومهاجر عابر غير شائع، ورائر شتوي غير شائع.** يوجد هذا الطائر جميل الريش على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم هجرته (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، وخلال فصل الشتاء. كما يتكاثر في مجموعات متفرقة في المناطق الوسطى. ويمكن أن يتكاثر أيضاً، في الشمال والشرق. **الموئل:** حقول الحبوب والأعلاف المروية (خاصة أعشاب البرسيم والعلف الأخضر)، وأحياناً حقول القمح. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور وغيرها من المواد النباتية، إلى جانب اللافقاريات الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يرعى في مجموعات تتكون من 10 إلى 20 طائراً. وعلى الرغم من أنه متخفي جيداً، إلا أنه غالباً ما تتم رؤيته في مجموعات من 4 - 5 طيور فقط لدى طرده من الغطاء الحي النامي. ويهاجر في أسراب كبيرة تضم مئات الطيور في بعض الأحيان. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** معقد؛ أزواج متكاثرة مناطقية ذات روابط زوجية متغيرة، منها الزواج الأحادي، وتعدد الأزواج، وتعدد

الزوجات، والاختلاط. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن المنطقة، بينما تتولى الأنثى بناء العش وحضن البيض وتربية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة على الأرض، مبطنة بالعبس والمواد النباتية. **البيض المحضون:** 8 - 13 بيضة. **الحضانة:** 17 - 20 يوماً. **الفراخ:** تغادر الفراخ العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير عند عمر 19 يوماً. **الحضنة:** عادةً حضنة واحدة. **ملاحظة:** هذا الطائر حذر للغاية، وبالتالي من المرجح أن يُسمع أكثر مما يُشاهد. وغالباً ما يُصدر الذكر سلسلة من النغمات الإيقاعية تتكرر كل بضع ثوانٍ. **باغ الجناح:** 32 - 35 سم.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 6,000
منطقة النشاط: حرض

**الاسم العربي:** **السمان الضاحك**

الاسم العربي الآخر: سمان مهرجة

الاسم العلمي: *Coturnix delegorguei*

الاسم الشائع: Harlequin Quail

حالة الحماية العالمية: غير مهدد

المنحى العالمي للمجموعة: مستقر

حالة الحماية الإقليمية: -

المنحى الإقليمي للمجموعة: -

الحجم والوزن: 16 - 19 سم / 49 - 95 غم




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومدغشقر، مع تعداد صغير في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، علماً أنه تم التعرف إلى ثلاثة أنواع فرعية، منها «*C. d. arabica*» المتوطن في شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر.** على الرغم من أنه نادراً ما يتم تسجيله، إلا أن هذا الطائر بديع الزخرفة قد يكون واسع الانتشار في أقصى جنوب تهامة. **الموئل:** الأراضي العشبية ذات الأشجار

المتناثرة بالقرب من المياه والمناطق المنخفضة الزراعية، خاصة التي تضم محاصيل الذرة الرفيعة والذرة والحبوب الأخرى. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بذور الأعشاب والبراعم، إلى جانب اللافقاريات التي يلتقطها من الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يرعى في أسراب تصل إلى 20 طائراً في مواسم غير موسم التكاثر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً (ربما مع وجود بعض حالات من تعدد الزوجات، مع وجود اثنتين من الإناث تبيض في العش نفسه)، ولكن عديداً منها قد يعيش في مجموعة قريبة جداً من أن تكون مستعمرة.

في حال اقتراب أحد المفترسات من عش طائر السمان الضاحك، يتعمد أحد الزوجين ادعاء الإصابة للفت الانتباه إليه، ومن ثم توجيه المفترس بعيداً عن الفراخ.

وجود بعض حالات من تعدد الزوجات، مع وجود اثنتين من الإناث تبيض في العش نفسه)، ولكن عديداً منها قد يعيش في مجموعة قريبة جداً من أن تكون مستعمرة. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى بناء العش

وحضن البيض، فيما يرعى الزوجان الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة على الأرض، مبطنة بالمواد النباتية ومخفية جيداً في الأراضي العشبية المنخفضة. **البيض المحضون:** 4 - 8 بيوض (حتى 15 بيضة إذا وضعت اثنتان من الإناث البيض في عش واحد). **الحضانة:** 14 - 18 يوماً. **الفراخ:** تترك العش بعد فترة قصيرة من الفقس، وتختبئ في مكان قريب، ثم تبدأ في الرفرفة بعد 5 أيام. **الحضنة:** انتهائية، تبدأ مع المطر. هناك سجلات كثيرة حول تكاثر هذا الطائر في شبه الجزيرة العربية. **ملاحظة:** هذا الطائر متخفي جيد، ويمكن تحديد موقعه بشكل أفضل من نداءه المتميز.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 300

منطقة النشاط: حقول صبياء المروية محورياً



حجل فيلبي

الاسم العربي:	قهيبة
الاسم العربي الآخر:	<i>Alectoris philbyi</i>
الاسم العلمي:	Harlequin Quail
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	مستقر
المنحى العالمي للمجموعة:	غير مهدد
حالة الحماية الإقليمية:	مستقر
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	33 - 36 سم / 441 غم




النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، حيث يوجد فقط في مرتفعات جنوب غرب السعودية وغرب اليمن. **حاليته بالمملكة: مقيم.** متكاثر شائع. يمكن العثور على هذا الطائر العربي المتوطن والمبهم في الجنوب من الطائف على الجانب الشرقي من الجرف. **الموئل:** يُوجد بشكل رئيس عند ارتفاعات تتجاوز 2,000 م في الحقول والمدرجات البور، أو المحروثة المتاخمة للعشب والمناطق الصخرية والأشجار الخفيضة. ويوجد أيضاً فوق التلال العارية وصخور الجلمود. لم يُسجل منه سوى عشرين فقط، كلاهما فوق 2,800 م. **سلوك البحث**

عن الغذاء: النظام الغذائي: المواد النباتية والبذور، إلى جانب اللافقاريات الملتقطة من الأرض. **النشاط:**

يوجد هذا الطائر المدهش الذي يحمل اسم المستكشف البريطاني هاري سانت جون فيلبي (الشيخ عبد الله)، فقط في المملكة العربية السعودية واليمن.

نهارياً. **السلوك الاجتماعي:** يربى في مجموعات أقل من 15 طائراً في غير موسم التكاثر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** غير معروف، ربما أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة، ولكن ربما يشبه طائر الحجل. سُجّلت حضنات تضم حتى 15 فرخاً في السعودية، وأحياناً كانت برفقة الأبوين. **العش:** غير معروف (تستخدم الأنواع المماثلة حفرة ضحلة فوق الأرض، قليلة التبيين، ومخفية في نباتات كثيفة، ومحمية بشجيرة أو صخرة). **البيض المحضون:** 8 - 10 بيوض (الأعشاش المدروسة=2). **الحضانة:** غير معروفة (22 - 26 يوماً في الأنواع المماثلة، و25 يوماً في الحاضنات). **مدة التعشيش:** غير معروفة (تظل الأنواع المماثلة في العش لبطعة أيام، وتطير بشكل ضعيف في غضون 7 - 12 يوماً). **الحضنة:** غير معروفة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 15,000
منطقة النشاط: جبل السوداء

**حجل شائع**


الاسم العربي:	<i>Alectoris chukar</i>
الاسم العلمي:	Chukar
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	مستقر
المنحى العالمي للمجموعة:	غير مهدد
حالة الحماية الإقليمية:	يتناقص
المنحى الإقليمي للمجموعة:	32 - 39 سم / 450 - 800 غم
الحجم والوزن:	



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد ضمن نطاق يمتد من بلغاريا شرقاً إلى شمال غرب الصين، وجنوباً إلى شمال غرب وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** يشيع هذا النوع الجريء من الحجل محلياً في أقصى الشمال الغربي، وسبق له أن وُجد في الجنوب (بالقرب من ينبع وجبل رضوى)، ولكن لا توجد تسجيلات حديثة له في هاتين المنطقتين. **الموئل:** على ارتفاع 1,600 - 2,000 م فوق سفوح التلال القاحلة ذات الشجيرات والأشجار الخفيضة المتناثرة، لا سيما فوق منحدرات جبل اللوز الغرانيتية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الجذور، والحبوب، والبراعم، والبذور، والتوت، والحشرات الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارياً.

السلوك الاجتماعي: يربى في مجموعات لا تزيد على 20 طائراً في غير موسم التكاثر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج بوجه عام، وترعى البيض المحضون متزامنة في وقت واحد.

أحياناً. **الأدوار الأبوية:** تحتضن الأنثى الحضنة الرئيسية وتضع أحياناً حضنة ثانوية، بينما يقوم الذكر بحضانتها على نحو متزامن. ويميل كلا الأبوين نحو رعاية الحضنة (أو الحضنات الخاصة بهما)، فيما تندمج الحضنات العائلية أحياناً لتشكيل مجموعات من 40 طائراً. **العش:** حفرة ضحلة فوق الأرض، مبطنه بالمواد النباتية، ومحمية بصخرة أو شجيرة عادة. **البيض المحضون:** 8 - 15 بيضة. **الحضانة:** 22 - 23 يوماً. **الفراخ:** تترك الفراخ العش بعد فترة قصيرة من الفقس، وتختبئ في مكان قريب. وتطير لكن بشكل ضعيف في عمر 7 - 10 أيام، ثم تصل إلى مرحلة النمو التام بعد 7 أسابيع. **الحضنة:** حضنة واحدة مفردة، ما لم تضع الأنثى حضنة مزدوجة. **باغ الجناح:** 47 - 52 سم.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 4,000
منطقة النشاط: جبل اللوز



حجل سبي سبي	الاسم العربي:
طيهورج	الاسم العربي الآخر:
<i>Ammoperdix griseogularis</i>	الاسم العلمي:
See-see Partridge	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير محدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير محدد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
22 - 25 سم / الذكر 187 - 238 غم؛ الأنثى 182 - 205 غم (أخف وزناً بنسبة 10%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ ويوجد في كل من سوريا وجنوب شرق تركيا، وشرقاً عبر شمال العراق حتى تركمانستان وأفغانستان وباكستان. كما يوجد تعداد صغير منعزل متكاثر ودائم في شمال المملكة، **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر جداً**. سُجِّل وجود هذا الطائر الصغير في مناسبات قليلة فقط، غالباً بالقرب من سكاكا، ومرة واحدة في محمية الملك سلمان (حرة الحرة). وفي أحد السجلات (سكاكا، أبريل 2017)، كان هناك ذكر ينادي بصوت عالٍ على الطيور الأخرى ضمن مجموعته الصغيرة، وهو أمر معتاد لدى مجموعة عائلة الحجل وإشارة إلى التكاثر. وفي سجل آخر (سكاكا، مايو 2018) شوهد 18 طائراً معاً، بينها صغار. **الموائل:** الصحاري الرملية الحصوية، أو التلال الصخرية البازلتية ذات النباتات الصحراوية المتفرقة، والقريبة عادةً من المياه. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البراعم والأوراق والتوت والبيذور، إلى جانب بعض الحشرات الملتقطة عادةً من الأرض. كما تطير هذه الطيور إلى الماء لتشرب حتى ثلاث مرات في اليوم. **النشاط:** نهاري وشفقي.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 20
منطقة النشاط: سكاكا



حجل عربي	الاسم العربي:
<i>Alectoris melanocephala</i>	الاسم العلمي:
Arabian Partridge	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
39 - 43 سم / 522 - 724 غم / الذكر 724 - 522 غم؛ الأنثى 522 غم (أخف وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية. ويوجد في غرب المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان واليمن. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع جداً**. يوجد هذا النوع المتوطن غير المعروف في شبه الجزيرة العربية، تقريباً جنوب منطقة الوجه إلى الغرب من المملكة. **الموائل:** يوجد في المناطق ذات الغطاء النباتي الجيد التي تكثر بها الصخور والجلاميد، بما في ذلك التلال والوديان المكسوة بالأشجار والشجيرات والغطاء الأرضي، مثل أشجار الطلح الخفيضة، وغابات العرعر المرتفعة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** المواد النباتية والبيذور، إلى جانب اللافقاريات الملتقطة من الأرض عادةً. **النشاط:** نهاري وشفقي. **السلوك الاجتماعي:** يرضع عادةً في مجموعات أقل من 15 طائراً في غير موسم التكاثر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** غير معروف. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة. قد تتولى الذكور والإناث حضنات منفصلة، مع دمج الفراخ بعد فقسها. **العش:** غير معروف (تستخدم الأنواع المماثلة حفرة ضحلة فوق الأرض، قليلة التبطين، ومخفية في نباتات كثيفة ومحمية بشجيرة أو صخرة).

البييض المحضون: غير معروف (8 - 15 بيضة

في الأنواع المماثلة). **الحضانة:** غير معروفة

(22 - 26 يوماً في الأنواع المماثلة، و25 يوماً

في الحاضنات). **مدة التعشيش:** غير معروفة

(تظل الأنواع المماثلة في العش لبضعة أيام،

وتطير بشكل ضعيف في غضون 7 - 12 يوماً).

الحضنة: حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.

ملاحظة: هذا الطائر مرشح عظيم لمشروعات

بحثية واسعة النطاق، كرسائل الدكتوراه أو الماجستير؛ لأن هناك تعداداً كبيراً منه لم

يُدرس على الإطلاق، ولم يُعثر على أي عش له. وأُتي معلومات يتم الحصول عليها بشأن

هذا الطائر ستكون جديرة بالنشر. علماً أن جميع طيور الحجل الأخرى المدروسة جيداً

برهنت على مدى إثارته للاهتمام بشكل لا يصدق. وأخيراً، هو نوع متوطن يعيش في

ظروف غير عادية في جزء ساحر من العالم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 150,000
منطقة النشاط: محمية ريدة

إوزة ربداء	الاسم العربي:
<i>Anser anser</i>	الاسم العلمي:
Greylag Goose	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
76 - 89 سم / 2,450 - 4,100 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أوراسيا الشمالية والمعتدلة، ابتداءً من أيسلندا ومن ثم شرقاً حتى الصين وجنوباً إلى تركيا والعراق، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً حول البحر المتوسط، ومن ثم في العراق حتى جنوب الصين، وجنوباً نحو السعودية من حين لآخر. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي نادر، ولا يهاجر سوى عدد قليل جداً من تعداد هذا الإوز الرمادي الكبير الذي يتكاثر في الغرب من نطاق وجوده جنوباً أثناء الشتاء على طول سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر. ربما يُعَدُّ أيضاً، من الأنواع الشاردة في المملكة. **الموئل:** الأراضي الرطبة المفتوحة، خاصة البحيرات والأهوار الساحلية الغنية بالغطاء النباتي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الأوراق والبراعم والجذور وبذور الأعشاب، والحبوب المائية والبرية الملتقطة إما من الماء، أو عن الأرض. وعندما يتغذى فوق الماء، يمكن أن يغوص للوصول إلى النباتات المغمورة. كما يعتمد إلى الأراضي الجافة بشكل أساس حتى يتغذى على

يشكّل هذا الإوز علاقات

اجتماعية معقدة، وما يثير

الاهتمام هو أن أفرادها لا يعانون

ضغوطاً، إذ تُعَدُّ قليلة. كما

يكسبون المزيد من المعارك


إذا كان «أصدقائهم» (أعضاء

المجموعة الاجتماعية

المقربين) إلى جوارهم.

الحشائش والأوراق والحبوب والمحاصيل الزراعية. **النشاط:** نهارى، وليلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عموماً، يُعَدُّ طائراً اجتماعياً في أماكن وجوده الأخرى، غير أن ندرته في المملكة تعني أنه غالباً ما يوجد بمفرده، أو ضمن مجموعات صغيرة للغاية تتألف من سبعة طيور كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** للأسف، هذا الإوز الكبير هدف

رئيس للصيدين أينما حلّ. لذلك؛ يُعَدُّ هذا الطائر دائم الحد، ولا يسمح لأيّ كان بالاقتراب منه أبداً في حدود 200 م تقريباً. **بأح الجناح:** 147 - 180 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل



حجل رملي	الاسم العربي:
<i>Ammoperdix heyi</i>	الاسم العلمي:
Sand Partridge	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
22 - 25 سم / 180 - 200 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد ضمن نطاق يمتد من شرق مصر إلى جنوب سوريا، خاصة في شبه الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن) التي تضم ما يزيد على 80% من تعداده العالمي. وتم التعرف إلى أربعة أنواع فرعية منه، منها *A. h. intermedius* المتوطن في شبه الجزيرة العربية و *A. h. heyi* الذي يكاد يكون متوطناً في المملكة، ويمتد شمالاً نحو سوريا وسيناء. **حاليته بالمملكة:** مقيم، متكاثر شائع جداً. يوجد طائر الحجل الأنيق هذا - بزينة جناحه الرائعة - في غرب المملكة (*A. h. intermedius*)، وفي المناطق الشمالية والوسطى (*A. h. heyi*). **الموئل:** على ارتفاعات دون 2,000 م فوق سفوح التلال الصخرية والوديان والهضاب الحجرية، مع بعض الغطاء النباتي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور (خاصة في الصيف)، والتوت والحشرات (بما في ذلك الجراد لدى احتشاده) الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يرعى عادةً في

أسراب تتألف من 10 - 15 طائراً، رغم أنه

سُجِّلَت أسراب منه تضم حتى 70 طائراً في

الأحواض المائية في جرف طويق. **سلوك**

التكاثر: نظام التزاوج غير مؤكد، ربما أزواج

متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، رغم

أن الأعشاش لا تبعد عن بعضها سوى 30 - 70 م، وأحياناً ترقد اثنتان من الإناث

في العش نفسه. **الأدوار الأبوية:** تحتضن الأنثى البيض، ويشترك الزوجان في رعاية

الفراخ. قد تتحد الأفراف العائلية لتشكّل أسراباً تصل إلى 20 سرباً (أو ربما 70 كما


هو مسجل في أفريقيا). **العش:** حفرة ضحلة فوق الأرض، أو شق في الصخر، غير مبطنة،

أو بها كسيرات من النباتات محمية بواسطة شجيرة، أو نتوء صخري. **البيض المحضون:**

5 - 14 بيضة. **الحضانة:** 21 - 24 يوماً. **الفراخ:** تترك الصغار العش بعد 9 - 20 يوماً من

الفقس، ويكتمل نموها في غضون 30 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة أو مزدوجة. **بأح**

الجناح: 39 - 41 سم.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 530,000
منطقة النشاط: حوطة بني تميم



شهرمانة	الاسم العربي:
<i>Tadorna tadorna</i>	الاسم العلمي:
Common Shelduck	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
58 - 67 سم / الذكر 830 - 1,500 غم؛ الأنثى 562 - 1,250 غم (أخف وزناً بنسبة 20%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من أيسلندا شرقاً حتى شمال شرق الصين، مع تعدادات صغيرة جنوباً باتجاه كل من تركيا وسوريا وإيران، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم جنوباً، في شمال أفريقيا وغرب أوروبا وامتداداً حتى جنوب شرق الصين، مع وصول أعداد متغيرة منه إلى المملكة العربية السعودية في فصل الشتاء. **حاليته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر.** تمثل المملكة الحد الجنوبي الأقصى من نطاق التشتية لهذا الطائر الجميل. لذلك، تتعذر مشاهدته على نحو دوري كل عام، غير أنه يوجد بأعداد وفيرة أحياناً، وبعضه أحياناً يزور المملكة خلال أشهر الصيف. **الموائل:** المساحات المفتوحة، حيث يمكنه البحث عن الفرائس في السهول الساحلية، والأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، خاصة السبخات الغنية بالمغذيات التي تغمرها المياه موسمياً، والأراضي الرطبة الضحلة ذات المياه العذبة، وأطراف حقول القصب. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات المائية، كالحشريات والرخويات والديدان، إلى جانب بعض الأسماك والبرمائيات، وأحياناً المواد النباتية كالأعشاب والحبوب.



زائر شتوي وصيفي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل




إوزة غراء كبيرة	الاسم العربي:
<i>Anser albifrons</i>	الاسم العلمي:
Greater White-fronted Goose	الاسم الشائع:
غير معروف	حالة الحماية العالمية:
-	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
65 - 86 سم / 1,800 - 3,600 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في سهول القطب الشمالي المنخفضة (تندرا) في شمال روسيا وأمريكا الشمالية وجرينلاند. ويقضي فصل الشتاء على بُعد 4000 كم جنوباً في غرب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. كما تقضي بعض المجموعات منه فصل الشتاء أثناء مروره عبر منطقة أوراسيا الجنوبية باتجاه اليابان. **حاليته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر.** فالسعودية تقع جنوب موطن هذا الطائر الطبيعي للتشتية، لكن خلال فصول الشتاء الشمالية شديدة البرودة، قد تصل بعض التعدادات التي تتكاثر في روسيا حتى أقصى جنوب السعودية، وبالتالي لا يوجد هذا الإوز الضخم في المملكة كل شتاء. **الموائل:** بحيرات المياه العذبة الداخلية والمستنقعات والمزارع المجاورة للأراضي الرطبة، وكذلك الأخوار الساحلية والبحيرات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الأعشاب والأوراق وثمار التوت، والأعلاف، والمحاصيل الزراعية (مثل الحبوب المنبئة، والبطاطا) الملتقطة عن الأرض. ويرعى في الغالب فوق الأراضي الجافة، وفي الحقول القريبة من الرياض.

بعد موسم تكاثره في القطب الشمالي الروسي، يقطع هذا الطائر الكبير والجميل مسافة 4,000 كم جنوباً ليقتضي فصل الشتاء، وقد يصل أحياناً إلى المملكة العربية السعودية.

منه أيضاً **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر هو الإوز الذي يمكن رؤيته في المملكة، غير أنه لا يزال نادراً. ولسوء الحظ، يزيد ضغط الصيد من حذره وعدم تسامحه لدى الاقتراب منه. لذلك، يطير بعيداً بكل سهولة عند إزعاجه بأي وسيلة. **باع الجناح:** 130 - 165 سم.




زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: ينبع



الونس	الاسم العربي:
بطة حمراء قنة	الاسم العربي الآخر:
<i>Netta rufina</i>	الاسم العلمي:
Red-crested Pochard	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
شبه مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
53 - 58 سم / الذكر 720 - 1,000 غم؛ الأنثى 520 - 870 غم (أخف وزناً بنسبة 20%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ تتكاثر التعدادات المقيمة بأجزاء أوروبا في مجموعات صغيرة. كما تتكاثر التعدادات المهاجرة منه أيضاً. في أوروبا وضمن نطاق يمتد من بحر قزوين حتى منغوليا، بينما تقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً حول البحر الأبيض المتوسط، وفي دلتا النيل والهند. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر، ومهاجر صيفي نادر وغير منتظم. تقع المملكة العربية السعودية بالقرب من جنوب نطاق تشتية هذا البطة الصامت بديع الألوان، حيث تمكث بعض أفراد هذا الطائر في المملكة أشهر عدة خلال فصل الشتاء. وأحياناً، تتجول في المملكة أثناء الصيف. **الموائل:** مواقع المياه العذبة، مثل المستنقعات (لا سيما تلك التي تحتوي على برك مياه عميقة)، والمجاري المائية بطيئة التدفق، والبحيرات، وأحياناً البحيرات الاصطناعية أو السواحل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**



زائر شتوي، وصيفي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

يتغذى بشكل أساسي على النباتات المائية الخضراء والبذور والجذور، وفي بعض الأحيان اللافقاريات والبرمائيات والأسماك. ويتغذى هذا الطائر عبر الغطس (بعد الوثب)، والتنقيب في الماء وغمر أعلى الجسم والرأس. ونادراً ما يربى فوق الأرض. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** يعيش هذا الطائر منفرداً أو في مجموعات صغيرة جداً. علماً أن أكبر مجموعة مسجلة في المملكة كانت مؤلفة من أربعة طيور فقط. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عندما لا يتم إزاعجه، فإنه يجلس بكل راحة على صفحة الماء. إنه طائر خجول، وفي حال تعرضه للإزعاج يرتفع ضارباً جناحيه بصعوبة على صفحة الماء قبل أن يطير بقوة. يُعدُّ طائراً صامتاً على الأغلب في السعودية. **باغ الجناح:** 84 - 90 سم.




بط أبو فروة	الاسم العربي:
شهرمانة حمراء	الاسم العربي الآخر:
<i>Tadorna ferruginea</i>	الاسم العلمي:
Ruddy Shelduck	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
61 - 70 سم / الذكر 1,200 - 1,640 غم؛ الأنثى 925 - 1,500 غم (أخف وزناً بنسبة 15%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد تعدادات منه مقيمة بشكل متقطع في الشمال الغربي والشمال من أفريقيا وإثيوبيا وتركيا حتى أوزبكستان، وجنوباً باتجاه العراق والكويت. كما تتكاثر التعدادات المهاجرة منه ضمن نطاق يمتد من البحر الأسود باتجاه منغوليا، وتقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم جنوباً، حيث الشمال الشرقي لأفريقيا وجنوب آسيا، وأحياناً في شبه الجزيرة العربية، خاصة من جهة الشرق. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر جداً، زائر شتوي نادر. يُعدُّ هذا الطائر ذو اللون الأحمر الداكن زائراً شتوياً واسع الانتشار (سبتمبر - فبراير)، رغم أنه يتجنب المناطق الوسطى. ويمكن أن يعيش بشكل انتهاز في الأراضي الرطبة الاصطناعية، علماً أنه تم تسجيل تكاثره في موقعين من المنطقة الشرقية، ولكن ليس منذ عام 1984. **الموائل:** بحيرات مياه الصرف الصحي المعالجة وغيرها من الأراضي الرطبة الاصطناعية. وقد يوجد أيضاً، في المواقع المفتوحة منخفضة الملوحة (كما هو مسجل في مكان آخر). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحبوب، والبراعم، والدرنات والنباتات المائية والحشرات والقشريات، والرخويات المائية، والأسماك الصغيرة وبيض البرمائيات والضفادع والزواحف الصغيرة. **النشاط:** ليلي، وغسقي. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في أزواج، أو مجموعات صغيرة، علماً أنه تم حساب 37 طائراً في أراضي بقيق، الرطبة في أول يناير. **سلوك التكاثر:**

عادةً ما يقضي هذا الطائر البديع ذو اللون الأحمر «أو وردي ضارب إلى الحمرة» 90% من وقته في أزواج، لا يفصلها عن بعضها سوى ثلاثة أمتار.

بقيق، الرطبة في أول يناير. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً (ربما مع روابط زوجية مدى الحياة)، ومناطقية للغاية حول موقع العش. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضارة البيض، في حين يتولى الذكر مسؤولية الدفاع عن موقع العش وحراسة الأنثى. كما يربى الزوجان الفراخ. **العش:** تجويف ضحل فوق سطح الأرض، مبطن بالعشب والشعور والريش الزغبى المتساقط من الأنثى المعششة (ربما أيضاً في حفرة في جرف، أو ضفة تل، أو جحر، أو بين الصخور أو الأنقاض كما هو مسجل في مكان آخر). **البيض المحضون:** 8 - 12 بيضة. **الحضانة:** 28 - 29 يوماً. **الفراخ:** تُقاد الفراخ إلى الماء بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد 55 يوماً. **الحضنة:** من المحتمل التكاثر انتهازياً. **باغ الجناح:** 121 - 145 سم.




مهاجر متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: بحيرات الأحساء



حمرأوي أبيض العين

بطة كمييت
Aythya nyroca
Ferruginous Duck
شبه مهدد
يتناقص
شبه مهدد
يتناقص
يتناقص
730-464 سم / 42-38 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: 150
منطقة النشاط: بحيرات الأحساء

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في مجموعات معزولة حول البحر المتوسط والبحر الأسود، وباتجاه الجنوب نحو شبه الجزيرة العربية، ثم شرقاً نحو أفغانستان، أما التعدادات المهاجرة منه فتتكاثر ابتداءً من وسط أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 - 5,000 كم جنوباً حول البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. هذا الطائر غير شائع، ولكنه واسع الانتشار أثناء موسم الهجرة، وفي فصل الشتاء (سبتمبر - أبريل).

ومن المحتمل أن يكون هناك تعداد صغير متكاثر مقيم في المملكة، لا سيما بالمنطقة الشرقية وحول تبوك والرياض. **الموائل:** الأراضي الرطبة غير المضطربة التي تضم حواف قصبية زائدة النمو، مثل بحيرات مياه الصرف المعالجة، والبحيرات الاصطناعية. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: البذور المائية والجذور والبراعم واللافقاريات، فضلاً عن البرمائيات والأسماك الصغيرة. **النشاط:** نهارى. **السلوك**

الاجتماعي: عادةً ما يربى بمفرده، أو في مجموعات صغيرة لا يتجاوز تعدادها عشرة طيور في المياه الضحلة (يعمق لا يتجاوز متراً واحداً)، رغم أنه تم تسجيل 23 طائراً مرة واحدة في الظهران. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج موسميًا، وتعشش بشكل فردي، أو في مجموعات متفرقة، وتنفك الروابط الزوجية خلال مرحلة الحضنة. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش، وتحضن البيض، وترعى الفراخ. **العش:** متغير، إما تجويف في الأرض في غطاء نباتي كثيف بالقرب من حافة الماء، أو سلة مصنوعة من سيقان النباتات المجمعة من الماء بين تجمعات القصب الكثيفة التي تكون مبطنة بمواد نباتية والريش الناعم للأنثى المعشوشة. **البيض المحضون:** 7 - 11 بيضة. **الحضنة:** 25 - 27 يوماً. **الفراخ:** تعوم الفراخ بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد 56 - 60 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باع الجناح:** 63 - 67 سم.

غالباً ما تكون عيون البط مرئية تماماً عند فتحها، ويمكن لأعضاء المجموعة الآخرين تقييم الطيور النائمة بسهولة، وضبط مستوى يقظتها وفقاً لذلك.

حمرأوي

بطة حمرأ رأس
Aythya ferina
Common Pochard
معرض للانقراض
يتناقص
-
-
42 - 49 سم / 467 - 1,240 غم


الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وغرب أوروبا، فيما تتكاثر التعدادات المهاجرة من وسط أوروبا حتى شمال الصين، وتقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً نحو جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والنيل والعراق وباكستان حتى اليابان. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، وزائر شتوي غير منتظم. ينتشر هذا الطائر في جميع أنحاء المملكة بوصفه مهاجراً عابراً نادراً (فبراير - أبريل، سبتمبر - أكتوبر) وزائراً شتوياً غير منتظم، ويحتمل أن تكون هجرته ممتدة بطول جبهة عريضة. ثمة سجلات تفيد بأن أسراباً كبيرة تتحرك شمالاً على ساحل البحر الأحمر في الربيع. ويُعتقد أن بعضها يتغذى قبالة سواحل الخليج العربي، ولا تدخل إلى البر إلا في حال ساعات الظروف الجوية، ما يدعم ظهورها غير المنتظم بالمنطقة الشرقية. **الموائل:** مواقع المياه العذبة المفتوحة، مثل البحيرات وبحيرات مياه الصرف الصحي، والبحيرات الاصطناعية، والبحيرات الساحلية المحمية. **سلوك البحث**

عن الغذاء: النظام الغذائي: الخضراوات المائية، بما في ذلك البذور والجذور والدرنات والأوراق والأعشاب، إلى جانب اللافقاريات المختلفة، لا سيما الرخويات والقشريات. ويتغذى عبر الغطس في الأعماق (حتى 2.5 م)، ولكنه أيضاً يحب اللعب في المياه. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** شوهدت أسراب تتألف من 500 طائر في الخليج العربي، ولكن في معظم الأماكن، يُغذ السرب الذي يتألف من 50 طائراً سرباً كبيراً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عندما يشعر هذا الطائر بالانزعاج، فإنه يطير ويتجول بعيداً عن الخطر بعد أن يضرب جناحيه على صفحة المياه. ونادراً ما يبقى في منطقة واحدة خلال فصل الشتاء بأكمله. وبدلاً من ذلك، يتحرك لمسافات طويلة (أكثر من 200 كم) بين مواقع التشتية المتعاقبة، ربما استجابةً لنضوب الطعام، وللأسف، فإن هذا النوع، شأنه شأن عديد من الطيور المائية، معرض للتسمم بالرمضات بفعل ابتلاعه مخلفات الطلقات النارية.

يهاجر هذا البط الكستنائي انطلاقاً من شرق أفريقيا مروراً بالمملكة ووصولاً إلى أراضي تكاثره في أوراسيا، وهو يقطع أحياناً أكثر من 300 كم يومياً.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

حذفة صيفية*Spatula querquedula*

Garganey

غير مهدد

يتناقص

37 - 41 سم / 240 - 585 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



أنثى

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا حتى شمال الصين، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً نحو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى وادي النيل، والهند، وجنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، **زائر شتوي نادر جداً، زائر صيفي غير منتظم.** يُعدُّ هذا الطائر مهاجراً شائعاً واسع النطاق والانتشار عبر المملكة (مارس - مايو، أغسطس - نوفمبر). كما يكثر في بعض السنوات، حيث تكثر أعدادها بشكل عام في فصل الصيف. **الموئل:** الأراضي الرطبة الضحلة ذات المياه العذبة، مثل المستنقعات والأهوار والبرك الرسوبية ذات النباتات الظاهرة، والبرك الحافلة بالقصب، وبرك المياه على جنبات الطرق، وحتى فيضانات الصحراء. وقد يعتمد إلى الراحة لفترات قصيرة في البحار الهادئة أثناء موسم الهجرة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات المائية بشكل رئيس، إلى جانب البرمائيات والأسماك الصغيرة، وكميات متفاوتة من الخضراوات، مثل البذور والأعشاب والجذور، وأجزاء أخرى من النباتات المائية. يتغذى عبر غمس الرأس والتنقيب في الماء، أو الالتقاط من السطح وغمر أعلى الجسم، ولكنه لا يغوص. **النشاط:** ليلي، ونهاري جزئياً (أحياناً يتغذى نهاراً في الأراضي الرطبة الخالية من مصادر الإزعاج). **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُشاهد في مجموعات تصل إلى 12 طائراً، لكن أسرابه في موسم الهجرة تتكون من 50 إلى مئات عدة، لا سيما في فصل الصيف. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يكون هذا الطائر الصغير متخفياً عندما يتغذى، ولكن عندما ينتبه إلى خطر ما، يندفع بسرعة بعيداً عن الماء ويطيح مباشرة إلى البركة التالية، أو يدور حول المنطقة ويهبط في مكان آخر قريب وآمن. **باع الجناح:** 58 - 69 سم.

يُصدر هذا الطائر المزخرف صوتاً مميزاً أثناء طيرانه السريع، ويُفترض أنه بهذا الصوت ينبه الطيور الأخرى إلى وجود مفترس محتمل.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: برك سكاكا الرسوبية

**أبو خصلة**

بطة قنبراء

Aythya fuligula

Tufted Duck

غير مهدد

مستقر

40-47 سم / 560-1,020 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




أنثى وذكر (إلى اليسار)

النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وغرب أوروبا، بينما تتكاثر التعدادات المهاجرة في أيسلندا وشمال أوروبا عبر معظم أنحاء روسيا، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم جنوباً في شمال وشرق أفريقيا، وجنوب أوروبا عبر الهند إلى اليابان، وحتى شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، **زائر شتوي غير شائع، زائر صيفي غير منتظم.** يُعدُّ هذا الطائر البديع زائراً شتوياً واسع الانتشار في المقام الأول (أكتوبر - فبراير)، وكذلك مهاجراً عابراً نادراً (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر). قد تظل بعض الأفراد منه خلال فصل الصيف أيضاً. **الموئل:** مواقع الأراضي الرطبة الكبيرة المفتوحة، لا سيما تلك التي تتوافر بها برك تفتقر إلى الغطاء النباتي السطحي، مثل بحيرات الخزان، ونهر الرياض (مجرى وادي الحائر)، والبحيرات الاصطناعية. ويوجد في بعض الأحيان في البحيرات الساحلية المحمية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: النباتات الخضراء والبذور، مع كمية كبيرة من اللافقاريات، بما في ذلك الرخويات والفشريبات. ويقفز ليغطس حتى عمق 13 م، وبالتالي يتغذى في مياه أعمق، مقارنة بطيور البط الغاطسة الأخرى. كما أنه يتقلب ويلتقط من فوق سطح الماء. **النشاط:** نهاري.

يستطيع هذا الطائر الرائع ذو خصلة الرأس الطويلة الغوص حتى عمق 10 أمتار تحت سطح الماء، حيث يمكنه العثور على الرخويات.

يرعى في مجموعات تتكون من 4 - 10 أفراد، مع تسجيل مجموعات منه تصل إلى 50 فرداً، علماً أنه تم تسجيل 400 فرد منه مرة واحدة في الهفوف. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر صغير الحجم إلى حد ما، ويميل إلى السباحة بعيداً عن مصادر الخطر، حيث يضرب بجناحيه على صفحة الماء، ثم يطير، وهو يتميز بطيران قوي بفضل رفوفه جناحيه السريعة التي تُحدث صفيراً، والذي يُفترض بأنه تنبيه لأعضاء المجموعة حول وجود خطر ما يُحدق بهم. **باع الجناح:** 65 - 72 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



بط سماري	الاسم العربي:
سمارية	الاسم العربي الآخر:
<i>Mareca strepera</i>	الاسم العلمي:
Gadwall	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
46 - 58 سم / الوزن: 550 - 1,000 غم	الحجم والوزن:




أنثى بط سماري، والذكر (إلى اليسار)

النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في غرب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا، بينما تتكاثر التعدادات المهاجرة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي منطقة تمتد من وسط أوروبا حتى شمال شرق الصين، وهو يقضي فصل الشتاء في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وجنوب أوروبا وشمال غرب أفريقيا ووادي النيل والعراق، حتى الساحل الشرقي للصين. **حالته بالمملكة:** **زائر شتوي غير شائع.** يُعدُّ هذا الطائر المرقط زائراً شتوياً غير شائع للمملكة، رغم أن تعداده يتزايد كنتيجة متوقعة لتزايد الأراضي الرطبة في المملكة، لما كانت الطيور الشتوية غالباً ما تُرى في الأراضي الرطبة المجاورة للساحل. **الموائل:** مواقع المياه العذبة الضحلة، مثل البحيرات ذات الغطاء النباتي الجيد، والبرك الغنية بالمغذيات، والمساحات الهادئة من الجداول بطيئة التدفق. كما يوجد لكن بوتيرة أقل في البحيرات الساحلية، وضمن جداول المد والجزر ذات الغطاء النباتي. **سلوك البحث**

للمحافظة على طاقته خلال فصل الشتاء، يقضي البط السماري 80% من وقته نائماً، ولكن لتجنب الحيوانات المفترسة، فإنه يحتاج إلى التبدل بين الاستيقاظ والنوم كل 2 - 3 ثوان.

عن الغذاء: النظام الغذائي: البذور والبراعم والجذور وسيقان النباتات المائية. وغالباً ما يتناول هذا الطائر غذاءه عن طريق غمر أعلى الجسم وغمس الرأس. ومن حين لآخر، يبحث عن غذائه أيضاً فوق الأرض، حيث يتناول المحاصيل الزراعية والأعشاب، أو يلتقط الحبوب. وقد يسرق الطعام من الأنواع الأخرى متى أتبع له ذلك، بما في ذلك البط وطيور من فصيلة المرعات (Coots). **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يوجد في مجموعات صغيرة تصل إلى 10 طيور، غير أنه تم تسجيل وجود سرب يُعدُّ الأكبر في المملكة، ويتضمن 90 طائراً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باج الجناح:** 84 - 95 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج تاروت



أبو مجرف	الاسم العربي:
مجرفي منقار	الاسم العربي الآخر:
<i>Spatula clypeata</i>	الاسم العلمي:
Northern Shoveler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
43 - 56 سم / 470 - 800 غم	الحجم والوزن:




أنثى أبو مجرف مع صغارها


النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في معظم أنحاء شمال أوراسيا وأميركا الشمالية، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 6,000 كم إلى الجنوب من جنوب أوروبا، وفي أفريقيا وجنوب آسيا وأميركا الوسطى. **حالته بالمملكة:** **مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع.** يوجد هذا الطائر بمنقاره الكبير والتميز على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة خلال فصل الشتاء (أكتوبر - مارس). كما يمكن رؤيته أيضاً بوصفه مهاجراً عابراً. علاوةً على ذلك، يتم تسجيل تعداد متكاثر منه في أراضي القطيف الرطبة من حين لآخر، جنوب نطاق وجوده الرئيس، وربما يوجد في مناطق رطبة أخرى. **الموائل:** المياه العذبة الضحلة، والأراضي الرطبة منخفضة الملوحة المحاطة بأعواد القصب بشكل كثيف، وغيره من النباتات البارزة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات المائية والبذور وبقايا النباتات. **النشاط:** نهاري، ويلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يربى في مجموعات تتكون من 10 إلى 15 طائراً رغم تسجيل مجموعات تصل إلى 52 طائراً في الظهران. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج موسمياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحتضن البيض وترعى الفراخ في ظل حماية الذكر. **العش:** تجوف ضحل في الأرض، مبطن بالعشب والأوراق وحفنة من الريش الناعم للأنثى المعششة بالقرب من الماء، أو في أرض رطبة منخفضة (الهور)، أو مستنقع، أو سبخة خصبة. **البيض المحضون:** 8 - 12 بيضة. **الحضانة:** 22 - 23 يوماً. **الفراخ:** تعوم الفراخ بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد 40 - 45 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** يتمتع هذا الطائر بقدرة غير عادية في الكشف عن بول الثدييات، ما يساعده على تجنب بعض الكائنات المفترسة للأعشاش. **باج الجناح:** 70 - 85 سم.

غالباً ما يسبح هذا الطائر برأسه الزمردى في دوائر محكمة لتكوين دوائر مائية تدفع الطعام نحو السطح، ثم يجترفه بمنقاره الضخم الذي يشبه المجرفة.

في مجموعات تتكون من 10 إلى 15 طائراً رغم تسجيل مجموعات تصل إلى 52 طائراً في الظهران. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج موسمياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحتضن البيض وترعى الفراخ في ظل حماية الذكر. **العش:** تجوف ضحل في الأرض، مبطن بالعشب والأوراق وحفنة من الريش الناعم للأنثى المعششة بالقرب من الماء، أو في أرض رطبة منخفضة (الهور)، أو مستنقع، أو سبخة خصبة. **البيض المحضون:** 8 - 12 بيضة. **الحضانة:** 22 - 23 يوماً. **الفراخ:** تعوم الفراخ بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد 40 - 45 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** يتمتع هذا الطائر بقدرة غير عادية في الكشف عن بول الثدييات، ما يساعده على تجنب بعض الكائنات المفترسة للأعشاش. **باج الجناح:** 70 - 85 سم.



ذكر أبو مجرف




مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجري وادي الحائر)

خضاري	الاسم العربي:
<i>Anas platyrhynchos</i>	الاسم العلمي:
Mallard	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
50 - 70 سم / الذكر 870 - 1,800 غم؛ الأنثى 735 - 1,320 غم (أخف وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أفريقيا وغرب أوروبا واليابان، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في كندا وغرينلاند والدول الإسكندنافية وشرق أوروبا حتى شمال آسيا، أما فصل الشتاء فيقضي على بُعد 2,000 - 3,000 كم جنوباً في المكسيك، وشمال شرق أفريقيا والعراق حتى الصين. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد في جميع أنحاء المملكة بوصفه مهاجراً عابراً وزائراً شتوياً. إضافة إلى ذلك، شكّلت الطيور التي تم إدخالها لأغراض الزينة، مجموعات كبيرة في المملكة، وتم تسجيل تكاثرها للمرة الأولى في نهر الرياض (مجرى وادي الحائر) عام 1984. **الموئل:** يتكاثر في الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، مثل البرك الضحلة ذات الغطاء النباتي الكثيف، والأحواض الكبيرة المحاطة بالقصب، والجداول بطيئة التدفق. كما يقضي فصل الشتاء في مختلف الأراضي الرطبة، بما فيها الخلجان الساحلية والبحيرات وبرك مياه الصرف المعالجة والبحيرات الاصطناعية والجداول.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: 200
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)




صوابة	الاسم العربي:
<i>Mareca penelope</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Wigeon	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
45 - 51 سم / 500 - 1,000 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أوراسيا، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 6,000 كم جنوباً في غرب أوروبا، وحوض البحر المتوسط ووادي النيل، وامتداداً نحو الهند وجنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي غير منتظم. ينتشر هذا النوع من البط ذي الرأس الكستنائي في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة (مارس - أبريل، أكتوبر - نوفمبر). كما تم تسجيل وجوده في الغرب والشرق وحول الرياض خلال فصل الشتاء (نوفمبر - مارس)، بينما تم تسجيله صيفاً في ينبع. **الموئل:** المواقع الساحلية المحمية، مثل الخلجان والبحيرات، إلى جانب الأراضي الرطبة الداخلية ذات المياه العذبة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** سيقان النباتات والبراعم والأوراق، والجذور، والبيذور - حيث يرعى فوق سطح الأرض - والطحالب والأعشاب البحرية - حيث يرعى على ساحل البحر. كما يتناول اللافقاريات عندما تكون وفيرة، مثل أسراب الذباب والجراد والقشريات، ويتغذى هذا

على الرغم من تسجيل هذا الطائر في مجموعات صغيرة أحياناً، إلا أنه تم تسجيل أسراب مهاجرة منه تُقدر بنحو 1,000 طائر في الأراضي الرطبة على طول ساحل الخليج العربي في المملكة العربية السعودية.

الطائر فوق سطح الماء أيضاً، أو دونه بقليل من خلال التنقيب في الماء، أو غمس الرقبة، ولكنه يتغذى فوق سطح الأرض بشكل رئيس من خلال الرعي السطحي. **النشاط:** ناهري وليلي. **السلوك الاجتماعي:** نوع اجتماعي. عادةً ما تتم رؤيته بأعداد صغيرة تصل في بعض الأحيان إلى 30 طائراً، لكن تم تسجيل أسراب تتضمن 500 - 1,000 طائر في مناسبات عدة في الأراضي الرطبة بمنطقة الخليج العربي. وفي فصل الشتاء، تشكّل في بعض الأحيان أسراباً محكمة التنسيق، يضم بعضها أنواعاً أخرى من البط، لا سيما طائراً أبو مجرف ولبول شمالي. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باع الجناح:** 75 - 86 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي، زائر صيفي
الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



حذفة شتوية


الاسم العربي:	حذفة شتوية
الاسم العلمي:	<i>Anas crecca</i>
الاسم الشائع:	Common Teal
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	غير معروف
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	38 - 34 سم / 200 - 450 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء كندا، وشمال أوراسيا فوق الدائرة القطبية الشمالية، ويقضي غالبية فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 6,000 كم باتجاه الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والبحر الأبيض المتوسط، وشرق أفريقيا، وجنوب آسيا. بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي غير منتظم. ينتشر طائر البط الصغير هذا في جميع أنحاء المملكة بوصفه مهاجراً واسع النطاق (فبراير - مارس، سبتمبر - أكتوبر)، لا سيما خلال فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير). **الموئل:** الأراضي الرطبة الضحلة الكبيرة الغنية بالنباتات، كذلك البرك الصغيرة والبحيرات الساحلية المالحة، كما يعتمد إلى الراحة في البحر أحياناً. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على النباتات، مثل الأوراق والأعشاب والبذور والبراعم، فضلاً عن اللافقاريات، بما فيها الديدان

شأنه شأن عديد من الطيور المائية، يعاني هذا الطائر الصغير والأنيق، في كثير من الأحيان، من التسمم بالرصاص نتيجة تناوله الكثير من خراطيش الرصاص الفارغة التي يتركها الصيادون وراءهم.

والرخويات والقشريات. ويتغذى عن طريق غمر أعلى الجسم، أو غمس الرأس، أو النقر والاتقاط من السطح. يفضل البقاء بالقرب من حافة المياه العميقة في محاولة بحثه عن الغذاء. **النشاط:** ليلي ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في أسراب تتكون من 10 - 60 طائراً، ولكن لوحظت أعداد متفاوتة للغاية منه في معظم المواقع خلال فصلي الربيع والخريف، مع تسجيل نحو 2,000 طائر منه في مناسبة واحدة أثناء الهجرة بالقرب من الرياض. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هو أصغر طائر بط في المملكة وأكثرها قابلية للإزعاج، حيث ينطلق مسرعاً في الهواء، ثم يهرب في طيران غير منتظم ومنخفض. **باع الجناح:** 58 - 64 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

**بلبول شمالي**


الاسم العربي:	بلبول شمالي
الاسم العلمي:	<i>Anas acuta</i>
الاسم الشائع:	Northern Pintail
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	66 - 50 سم / 735 - 1,030 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أمريكا الشمالية وأوراسيا، وتقضي معظم فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 5,000 كم جنوباً حول المكسيك، والبحر الأبيض المتوسط، والكثير من مناطق شمال أفريقيا، والعراق، وبالاتجاه شرقاً نحو جنوب شرق آسيا، ثم جنوباً نحو شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع، زائر صيفي نادر غير منتظم. يُعَدُّ هذا الطائر ذو اللون البني الداكن أحد زوار المملكة في الشتاء (أكتوبر - مارس). ولكنه أيضاً مهاجر واسع النطاق قد يعبر المملكة بشكل مباشر، (حتى إنه يمر عبر الربع الخالي) في طريقه إلى أفريقيا. **الموئل:** بحيرات المياه

تتجمع أفراد هذا الطائر البديع في أسراب كبيرة خلال فصل الشتاء، حيث تم تسجيل المئات منه في المنطقة الشرقية وينبع، وما يزيد على 1,000 بالقرب من الرياض.

العذبة الضحلة والمستنقعات والجداول المائية ذات النباتات المائية والعائمة، وكذلك الأخوار والبرك الساحلية المنخفضة الملوحة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** المواد النباتية، منها الأوراق والأعشاب والبذور والحبوب والدرنات والجذور، ومحاصيل الخضراوات بشكل أساسي، فضلاً عن اللافقاريات المائية، والبرمائيات والأسماك. ويتغذى هذا الطائر عن طريق غمر أعلى الجسم وغمس الرقبة، ثم التنقيب في الماء، في حين يقوم بالنقر على الأرض، أو الالتقاط من السطح، أو الحفر بمنقاره. **النشاط:** نهاري وليلي بانتظام. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي، ويمكن أن يكون أحد أكثر أنواع البط عدداً في المملكة، إذ توجد منه مئات عدة بالمنطقة الشرقية وينبع، وما يزيد على 1,000 طائر منه بالقرب من الرياض. علماً أنه يختلط بطيور البط الأخرى عند التغذية، وفي رحلات الطيران القصيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** طائر أنيق طويل الذيل، يطير في تشكيل «رأس الرمح» الكلاسيكي، ويرتفع ريشه الدبوسي الأوسط عن بقية ريش الذيل حتى 10 سم. **باع الجناح:** 80 - 95 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)




غطّاس متوج كبير	الاسم العربي:
غطّاس قنبري	الاسم العربي الآخر:
<i>Podiceps cristatus</i>	الاسم العلمي:
Great Crested Grebe	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
46 - 61 سم / 596 - 1,490 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة في جميع أنحاء غرب أوروبا، وبشكل متقطع في جميع أنحاء أفريقيا ووسط أوروبا، وشرقاً عبر الشرق الأوسط حتى أستراليا ونيوزيلندا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر ضمن نطاق يمتد من شرق أوروبا حتى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 2,000 كم جنوباً في البحر المتوسط وجنوب آسيا (بما في ذلك شبه الجزيرة العربية). **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثر شديد الندرة، زائر شتوي غير شائع.** عادةً ما يتم العثور على هذا الطائر الملكي قبالة سواحل الخليج العربي (ونادراً ما يكون في البحر الأحمر) خلال فصل الشتاء (نوفمبر - يناير)، وقد تم توثيق تكاثر هذا الطائر في الظهران. **الموئل:** يتكاثر في بحيرات مياه الصرف المعالجة المليئة بالقصب والحشائش، كما يوجد قبالة السواحل خلال فصل الشتاء. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بشكل أساس الأسماك (التي يصل طولها إلى 22 سم)، إلى جانب بعض اللافقاريات المائية، وهو يصطاد فرائسه من خلال الغطس الذي يستمر مدة 20 - 30 ثانية. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يرضى منفرداً، أو في أسراب صغيرة، أو في مجموعات

يتميز غطّاس قنبري بتقديم واحدة من أكثر عروض التودد أنيقة وتميزاً في الطبيعة التي تتوّج بقيام الزوجين بالجري فوق سطح الماء في انسجام تام.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: خليج سلوى




غطّاس صغير	الاسم العربي:
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	الاسم العلمي:
Little Grebe	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
25 - 29 سم / 130 - 236 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جميع أنحاء أوروبا، وأجزاء كثيرة من أفريقيا وجنوب آسيا (بما في ذلك شبه الجزيرة العربية)، وحتى اليابان وغينيا الجديدة، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق أوروبا، وغرب آسيا، وشمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم جنوباً ضمن نطاق إقامته. **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثر نادر، زائر شتوي شائع.** يوجد هذا الطائر الغطّاس المحبوب بشكل متقطع في جميع أنحاء المملكة بوصفه مقيماً وزائراً شتوياً (سبتمبر - مارس). **الموئل:** يعيش في المناطق دون 2725 م، في الأراضي الرطبة التي تضم مياهاً عذبة وحشائش بارزة، بما في ذلك البرك الاصطناعية وبحيرات الري والخزانات وبحيرات معالجة مياه الصرف. كما يوجد أحياناً في المياه الساحلية منخفضة الملوحة، علماً بأنه يتكاثر على ارتفاعات دون 2,350 م. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بشكل أساس الحشرات واليرقات، فضلاً عن الرخويات والقشريات والبرمائيات والأسماك الصغيرة. ويتغذى عبر الغطس إلى عمق يراوح بين متر واحد إلى مترين لمدة تصل إلى 25 ثانية. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً بشكل فردي، أو في أسراب صغيرة، على الرغم من تسجيل 124 طائراً

منه مرة واحدة بالظهران. سلوك التكاثر: **نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً مع روابط زوجية طويلة الأجل. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. ويتميز هذا الطائر بتغطية البيض بمادة بناء العش قبل أن يغادر العش، وغالباً ما يحمل فراخه على ظهره أثناء السباحة. **العش:** عبارة عن كومة مصنوعة من النباتات المائية يعلوها تجويف، وتكون هذه الكومة إما مكدسة حتى ما فوق مستوى المياه (في المياه الضحلة)، أو عائمة مع تثبيتها بالنباتات النامية (في المياه العميقة)، وعادةً ما يتم إخفاؤها بين الحشائش والنباتات. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 20 - 21 يوماً. **الفراخ:** تسبح الفراخ وتغطس في غضون ساعات من الفقس، وتطير بعد 44 - 48 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,000
منطقة النشاط: بحيرة الأصفر



النحام الكبير

Phoenicopterus roseus
Greater Flamingo

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

غير معروف

120 - 145 سم / 2,100 - 4,100 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم، ومهاجر جزئي، ومهاجر؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا، وبشكل غير منتظم في جنوب غرب آسيا (بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وإيران)، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في كازاخستان، في حين تهاجر بعض الأفراد من معظم تعداداته حتى 3,000 كم لقضاء فصل الشتاء على سواحل شبه الجزيرة العربية، ومن سوريا حتى الهند. **حاليته بالمملكة:**

مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، مهاجر متكاثر محتمل. يوجد هذا الطائر الذي يُعدُّ أكثر الطيور أناقة، في جميع المناطق الساحلية بالمملكة بوصفه مهاجراً عابراً (مارس – أبريل، أكتوبر – نوفمبر)، وخلال فصل الشتاء أيضاً. وتعود معظم المشاهدات المسجلة في المناطق الوسطى لطيور غير ناضجة تتحرك

بين الخليج العربي والبحر الأحمر. وقد شوهدت بعض سلوكيات بداية موسم التكاثر لديه بالقرب من جدة والجبيل، ما يوحي بأنه قد يتكاثر أحياناً في المملكة. **الموئل:** المناطق الساحلية، بما في ذلك الخلجان الضحلة والبرك والبحيرات الضحلة الملوحة، أو

القلوية المتاخمة للسهول الطينية، ومناطق انتشار المانغروف. كما يوجد أحياناً في البر، حيث البحيرات الضحلة الغنية باللافقاريات

والبرك الرسوبية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات المائية والبحرية (بما فيها الحشرات واليرقات والديدان والرخويات والفشريات) التي يلتقطها عبر قلب رأسه تحت الماء، وتصفية الفرائس من خلال المرشحات في منقاره. ويقوم كذلك

بتصفية الطين وتناول مجموعة متنوعة من البذور وأجزاء من النباتات المائية، ويمشي أحياناً إلى الأمام أثناء غمر رأسه ومعظم رقبته تحت الماء، ثم يطأ على الأرض لتحريز

فريسته وتناولها. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أسراب، إذ يميل إلى الطيران وتناول الغذاء وأخذ قسط من الراحة ضمن مجموعات. وقد شوهدت أسراب رعي

تصل إلى آلاف عدة بشكل منتظم في الجبيل خلال فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **باع الجناح:** 140-165 سم.

النطاق العالمي: مهاجر جزئي، توجد التعدادات المقيمة في المكسيك، جنوب وشرق أفريقيا، وبشكل متقطع في جميع أنحاء جنوب أوروبا وغرب آسيا، أما التعدادات المهاجرة منه فتتكاثر في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، حتى كازاخستان وشمال شرق الصين، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم جنوباً في المكسيك، والبحر الأبيض المتوسط، وجنوب الصين، واليابان. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي محدود، زائر متكاثر محتمل. يُعدُّ هذا الطائر البديع بعينه الحمراويين الآسرتين زائراً شتوياً نادراً في المقام الأول. وقد شوهد يتكاثر في المرتفعات الجنوبية الغربية على ارتفاع يناهز 2,350 م عام 1985. كما شوهدت عروض التودد خاصته في الأراضي الرطبة بالقرب من الرياض والمنطقة الشرقية، ما يشير إلى أنها تتكاثر في المملكة أحياناً. **الموئل:** المياه الساحلية المحمية، وفي بعض الأحيان الأراضي الرطبة الداخلية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات المائية والبرية وبيقاتها بشكل رئيس، إلى جانب الفشريات والرخويات والبرمائيات والأسماك الصغيرة. وقد تكون الفشريات ذات أهمية خاصة لديه خلال فصل الشتاء في المملكة، علماً أنه يتغذى بشكل رئيس عن طريق الغوص مدة 10 - 20 ثانية. علاوةً على ذلك يتناول أوراق الشجر ويعتمد إلى التقاط الغذاء من السطح. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يُشاهد عادةً في أسراب صغيرة تتألف من 10 طيور تقريباً، على الرغم من شيوع

أسراب تتجاوز أعداده فيها 40 طائراً في خليج هاف مون باي (شاطئ نصف القمر). **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. الأدوار الأبوية: يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. وتقوم الطيور البالغة بتغطية البيض بالمواد التي تُستخدم في بناء العش قبل مغادرتها إياه، وغالباً ما تحمل صغارها على ظهورها أثناء السباحة. **العش:** منصة عائمة من الغطاء النباتي المثبت بالقصب. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 20 - 24 يوماً. **الفراخ:** تسبح وتغطس بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد 21 يوماً. **الحضنة:** أحادي الحضنات بوجه عام.

يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.

غطّاس أسود الرقبة

غطّاس أدرع

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

غير مهدد

غير معروف

-

-

28 - 34 سم / 265 - 450 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي، توجد التعدادات المقيمة في المكسيك، جنوب وشرق أفريقيا، وبشكل متقطع في جميع أنحاء جنوب أوروبا وغرب آسيا، أما التعدادات المهاجرة منه فتتكاثر في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، حتى كازاخستان وشمال شرق الصين، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم جنوباً في المكسيك، والبحر الأبيض المتوسط، وجنوب الصين، واليابان. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي محدود، زائر متكاثر محتمل. يُعدُّ هذا الطائر البديع بعينه الحمراويين الآسرتين زائراً شتوياً نادراً في المقام الأول. وقد شوهد يتكاثر في المرتفعات الجنوبية الغربية على ارتفاع يناهز 2,350 م عام 1985. كما شوهدت عروض التودد خاصته في الأراضي الرطبة بالقرب من الرياض والمنطقة الشرقية، ما يشير إلى أنها تتكاثر في المملكة أحياناً. **الموئل:** المياه الساحلية المحمية، وفي بعض الأحيان الأراضي الرطبة الداخلية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات المائية والبرية وبيقاتها بشكل رئيس، إلى جانب الفشريات والرخويات والبرمائيات والأسماك الصغيرة. وقد تكون الفشريات ذات أهمية خاصة لديه خلال فصل الشتاء في المملكة، علماً أنه يتغذى بشكل رئيس عن طريق الغوص مدة 10 - 20 ثانية. علاوةً على ذلك يتناول أوراق الشجر ويعتمد إلى التقاط الغذاء من السطح. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يُشاهد عادةً في أسراب صغيرة تتألف من 10 طيور تقريباً، على الرغم من شيوع

أسراب تتجاوز أعداده فيها 40 طائراً في خليج هاف مون باي (شاطئ نصف القمر). **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. الأدوار الأبوية: يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. وتقوم الطيور البالغة بتغطية البيض بالمواد التي تُستخدم في بناء العش قبل مغادرتها إياه، وغالباً ما تحمل صغارها على ظهورها أثناء السباحة. **العش:** منصة عائمة من الغطاء النباتي المثبت بالقصب. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 20 - 24 يوماً. **الفراخ:** تسبح وتغطس بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد 21 يوماً. **الحضنة:** أحادي الحضنات بوجه عام.

يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.


يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.

يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.

يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.

يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.

يأكل هذا النوع من الطيور ريشه في بعض الأحيان، ما يؤدي إلى إبطاء معدل مرور الطعام عبر قنوات الهضمية، الأمر الذي يمنح الطائر مزيداً من الوقت لهضم فرائسه من اللافقاريات المائية الصغيرة.




زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجل تكاثره (مع إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: خليج هاف مون

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5

منطقة النشاط: خليج جازان

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

استوائي أحمر المنقار*Phaethon aethereus*

Red-billed Tropicbird

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر (من المحتمل أن يتناقص)

90 - 105 سم / 700 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: شديد الانتشار؛ يتكاثر في الجزر الاستوائية شرق المحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي. كما يتجول في المياه الاستوائية بشكل عام على بُعد 1,500 كم من موقع تكاثره. وقد تم التعرف إلى ثلاثة أنواع فرعية منه، بما في ذلك *P. indicus* المتوطن في الخليج العربي وخليج عدن والبحر الأحمر وينتشر في بحر العرب. **حالته بالمملكة:** **مقيم متكاثر نادر جداً.** يوجد هذا الطائر البحري الأبيض الرائع، بريش ذيله القرمزي الاستثنائي الذي يمكن أن يبرز لأكثر من 50 سم عن بقية الذيل، في كل من البحر الأحمر والخليج العربي، غير أنه يتكاثر فقط في البحر الأحمر. **الموئل:** بحري؛ إذ يتغذى في البحر، ويتكاثر على الجزر الخالية من مصادر التهديد ذات المنحدرات، أو المرتفعات، أو الكهوف أو التجاويف، أو حتى الصخور وعلى السهول الشاطئية التي تقع فوق مستويات المد العليا، متجنباً المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف. **سلوك البحث عن الغذاء:** **النظام الغذائي:** يصطاد صغار الأسماك والحبار عبر الغطس السريع، بينما يصطاد الأسماك الطائرة أثناء طيرانه. وتكشف البيانات المستخلصة من أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، عن قدرته على الرعي على مدى آلاف الكيلومترات. وغالباً ما يرتبط وجوده بالدلافين وأسماك التونة وأسماك ماهي ماهي، لكونها تدفع الفرائس نحو السطح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** **نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً في مستعمرات حرة، أو منفردة مع نذرة النوع الأخير. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** عبارة عن تجويف في جرف، أو شق في سطح الأرض (بطول يصل إلى مترين) بين الصخور الشاطئية أو حواجز الأمواج الصخرية. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 42 - 44 يوماً. **مدة التعشيش:** 80 - 90 يوماً. **الحضنة:** قد تكون حضنة واحدة مفردة، وربما يتكاثر بشكل انتهازى على مدار السنة بناءً على توافر الغذاء. **باع الجناح:** 99 - 106 سم.

يؤدي هذا الطائر البحري الرشيق عرضاً جويًا مذهلاً، إذ يتميز بتحويم رشيق وطيوان عكسي، فيما تتمايل الأشرطة الذيلية الحمراء لديه وتتموج بفعل الرياح.



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 50

منطقة النشاط: جزر قزستان

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

النحام الصغير*Phoeniconaias minor*

Lesser Flamingo

شبه مهدد

يتناقص

-

-

80 - 90 سم / 1,500 - 2,000 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم وشديد الانتشار؛ يتكاثر في أسراب كبيرة في شرق وغرب وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الهند وباكستان، حيث تتجول تعداداته على نطاق واسع وغير منتظم بعد التكاثر في مناطق عدة، بما في ذلك جنوب شبه الجزيرة العربية، علماً أنه تم تسجيل ما يزيد على 10 آلاف طائر منه في مناسبة واحدة باليمن، إذ يحاول التكاثر بين الفينة والأخرى. **حالته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر، زائر صيفي غير منتظم، مهاجر متكاثر محتمل.** يُعدُّ هذا الطائر الوردي البديع زائراً نادراً وغير منتظم للمملكة، كثير التجوال، لا سيّما في الشتاء، بناءً على مشاهدات تعداده المتكاثرة حول الأخدود الأفريقي العظيم، ويدخل أحياناً المياه الإقليمية للسعودية جنوب البحر الأحمر. وقد التقطت الصور لبعض أفراده تجلس على أعشاش في شهر مارس 2019 بالقرب من جازان، ما يشير إلى أنه يحاول التكاثر في المملكة. **الموئل:** الخلجان، والأخوار شديدة الضحالة المحمية وذات الحواف الموحلة، أو العشبية، أو التي تحتضن أشجار المانغروف. **سلوك البحث عن الغذاء:** **النظام الغذائي:** مخصص للغاية، ويتألف بشكل رئيس من الطحالب الزرقاء - الخضراء المجهرية، ثم يعتمد إلى استكماله باللافقاريات الصغيرة للغاية أحياناً. كما يتغذى أيضاً، مثل النحام الكبير، غير أنه عادة ما يغمر جزءاً من منقاره فقط تحت الماء، لكونه يلتقط طعامه بالقرب من سطح الماء. كما أنه يمشي ويسبح بينما يتناول طعامه، وقد تتحرك مجموعات منه في انسجام تام محرّكة مناقيرها من جانب إلى آخر بحثاً عن الفرائس.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي للغاية، وقد تم تسجيل ما يصل إلى 110 منه ترعى معاً فوق السهول الطينية الساحلية بالقرب من جازان في يناير 2018، وشوهد أكثر من 400 في الموقع نفسه في جازان في ديسمبر 2018.

ديسمبر 2018. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر أصغر طيور النحام في العالم، وقد قُطع أحدها، استناداً إلى بيانات تتبع بالقمم الاصطناعي فوق ظهره، مسافة 1,069 كم في رحلة استغرقت 16 ساعة، من ساحل موزمبيق حتى الشواطئ الغربية لمدغشقر. **باع الجناح:** 95 - 100 سم.

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير



زائر شتوي، زائر غير منتظم

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجَل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: خليج جازان

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير


حمام الغابات	الاسم العربي:
ورشان	الاسم العربي الآخر:
<i>Columba palumbus</i>	الاسم العلمي:
Common Woodpigeon	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
41 - 45 سم / 284 - 690 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي، توجد التعدادات المقيمة منه في غرب أوروبا وحول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبتجاه الشرق نحو العراق وباكستان، ثم جنوباً إلى شمال سلطنة عُمان، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في شرق وشمال أوروبا حتى كازاخستان، وفي فصل الشتاء يصل حتى 3,000 كم جنوباً ضمن نطاق إقامته، أو أبعد من ذلك حتى المملكة العربية السعودية في بعض الأحيان. **حالته بالمملكة:** زائر نادر وغير منتظم. يُعدُّ هذا الحمام الضخم الذي لا تخطئه عين، زائراً غير منتظم لمنطقة الشمال الشرقي من المملكة، وهناك سجل استثنائي واحد لتكاثره بالقرب من الظهران في عام 2002. **الموئل:** موائل مختلطة من الأشجار الكبيرة والمروج، أو حقول المحاصيل. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: المواد النباتية الخضراء بشكل أساس، والأعشاب والبراعم والأوراق. وهناك أيضاً، التوت والبذور والحبوب،

يُعدُّ «ورشان» أطول وأثقل أنواع الحمام في المملكة العربية السعودية، حيث يصل طوله إلى 45 سم، ويقدَّر ورنه بنحو 700 غم.

بما في ذلك المحاصيل الخضراء (يفضَّل الكرنب) ومحاصيل الحبوب وبقايا الحبوب المحروثة، وهو يبحث عن غذائه أيضاً، على الأرض وبين الأشجار والشجيرات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون هذا النوع اجتماعياً، لكنه غالباً ما يتم تسجيله بالمملكة منفرداً، أو في مجموعة مكونة من أربعة طيور، على الرغم من أنه يوجد أحياناً في مجموعات أكبر تتألف من 50 طائراً. **سلوك التكاثر:** سُجِّل تكاثره بالمملكة في مناسبة واحدة فقط. **ملاحظة:** عند الاقتراب منه، يفزُّ هارباً فصيلاً فقعقة صاخبة متميزة من جناحيه. وعند الهبوط، عادةً ما يرفع ويخفض ذيله بأسلوب شبه طقوسي. ويمكننا الاستنتاج من ميله نحو تناول المحاصيل مع حجمه الكبير بأنه فضطهد وفطارد. وبالتالي فهو خجول للغاية، وغالباً ما يطير بعيداً عند الإحساس بالانزعاج والاضطراب.



زائر غير منتظم
الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: تبوك




حمام جبلي	الاسم العربي:
يمامة برية	الاسم العربي الآخر:
<i>Columba livia</i>	الاسم العلمي:
Rock Dove	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (احتمالاً)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
31 - 34 سم / 180 - 355 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ أصيل في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وعبر شبه الجزيرة العربية حتى منغوليا والهند. وقد تم تدجين هذا النوع بوصفه مصدراً للغذاء منذ 10 آلاف عام تقريباً، ثم أُدخِل لاحقاً على نطاق واسع. والآن توجد تعدادات هائلة منه في كل مدينة وقرية في شتى أنحاء العالم تقريباً، علماً أنه تم التعرف إلى تسعة طيور فرعية (تحت النوع Subspecies) منه، بما فيها *C. l. palaeatinae* وهو شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية ويمتد نطاق وجوده شمالاً نحو فلسطين. **حالته بالمملكة:** مقيم، متكاثر شائع جداً. يوجد هذا الطائر في جميع أنحاء المملكة باستثناء صحراء الربع الخالي والنفود الكبير، بالرغم من وجوده في الموائل الاصطناعية داخل تلك المناطق القاحلة شديدة الجفاف. تجدر الإشارة إلى أن التشكيلات البرية الخالصة منه تنتشر في ربوع المناطق النائية، فيما تستعمر المجموعات المتكاثرة بشكل هائل المناطق الحضرية. **الموئل:** كل المناطق بخلاف المناطق القاحلة شديدة الجفاف، ويتسع نطاق انتشاره على نحو خاص في المناطق الحضرية، حتى إنه شوهد أعلى قمة برج خليفة بدبي (الإمارات العربية المتحدة). **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحبوب والبقول والأعشاب. تتغذى المجموعات البرية بشكل انتهازي على فُتات بقايا الأطعمة. **النشاط:** نهاري.

السلوك الاجتماعي: إما في مجموعات صغيرة، أو أسراب رعي كبيرة في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثر أحادية الزواج اجتماعياً ضمن أسراب تضم حتى 100 زوج، أو منفردة. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر، فيما يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** منصة ضحلة مصنوعة من الأغصان والسيفان النباتية الموضوعة في كهف، أو شق بمنحدر، أو صخرة منبثقة، أو فوهة بئر، أو جسر، أو مبنى مهجور، أو تحت شجيرة في جزيرة خالية من الكائنات المفترسة أحياناً. **مواقع غير عادية:** الخطامات البحرية، والالات المهجورة. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 17 - 19 يوماً. **مدة التعشيش:** 35 - 37 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو متعددة. **ملاحظة:** لمشاهدة الحمام الجبلي الحقيقي، ننصح بزيارة محمية شدقم.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثر سنوياً: 750,000
منطقة النشاط: أي مدينة أو بلدة



القمرى الأوروبي*Streptopelia turtur*

European Turtle-dove

معرض للانقراض

يتناقص

غير مهدد

غير معروف

27 - 29 سم / 99 - 170 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر من أوروبا وشمال أفريقيا، شرقاً مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى غرب الصين، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 6,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي من منطقة الساحل الأفريقي. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع، مهاجر عابر شائع. يتكاثر هذا النوع من الحمام الرشيق ذو النداء الحزين في معظم المناطق الوسطى بالمملكة، وينتشر على نطاق واسع عبر جميع أنحاء المملكة خلال موسم الهجرة (أبريل - مايو، أغسطس - أكتوبر). **الموئل:** بشكل رئيس الأراضي المنخفضة (غير أنه يوجد على ارتفاعات تصل إلى 1000 م وسط شبه الجزيرة العربية)، لا سيما المواقع المحمية بتكتلات من الأشجار والغابات الصغيرة والمزارع والحدائق متناثرة



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,600
منطقة النشاط: سبخة الفصل

يتناقص هذا الطائر الحساس، ذو الذيل الجميل مروحي الشكل، بصورة مطردة في جميع أنحاء أوروبا. ولسوء الحظ، فإن حالة الحماية لديه غير معروف داخل شبه الجزيرة العربية.

بالرغم من أن عدداً منها قد تعيش على مقربة من بعضها البعض. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر، ويتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** مصنوع من الأغصان، ومبطن بالجذور أو الأغصان الدقيقة، أو الأعشاب، موضوع على ارتفاع 2 - 4 م فوق سطح الأرض وسط سياج نباتي أو شجيرة، وغالباً ما يوضع وسط النباتات الشائكة، مثل الطلم والأثل والنخيل. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 19 - 21 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية. **حالة الحماية:** هذا النوع فُصِّلَ على أنه معرض للانقراض عالمياً بسبب فقدان الموائل شبه الطبيعية والزراعية في أوروبا. كما أنه أخذ في الانخفاض بسبب الصيد الجائر في نطاقه الشتوي وموسم هجرته، بما في ذلك داخل شبه الجزيرة العربية.

حمامة زيتونية أفريقية*Columba arquatrix*

African Olive-pigeon

غير مهدد

يتناقص

مهدد بالانقراض

مستقر

38 - 41 سم / 269 - 429 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يُوجد بشكل متقطع (غير منتظم) في أفريقيا (من جنوب أفريقيا حتى إريتريا والصومال)، وفي جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. شوهد هذا الطائر المقيم النادر في موقعين فقط بمنطقة شبه الجزيرة العربية، وكلاهما يقعان في مرتفعات عسير؛ الأول في شمال غرب اليمن، والآخر كان في جبل السودة أقصى جنوب غرب السعودية. **الموئل:** الارتفاعات التي تتجاوز 2,000 م في غابات العرعر والزيتون البري فوق جبل السودة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: ثمار الزيتون البري والعرعر وغيرها من أنواع الأشجار والبذور، إضافة إلى الحشرات واليرقات التي تؤخذ في معظمها من ظلة الأشجار الكبيرة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يربى بشكل منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج

تمت مشاهدة هذا الطائر المقيم النادر والمهدد بالانقراض داخل المملكة فقط في جبل السودة ومحمية ريدة بمنطقة عسير. ولم يُعثَر على أي عش له في شبه الجزيرة العربية.

اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي. تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر. **العش:** قاعدة ضحلة مصنوعة من الأغصان ومبطنّة بالأوراق وألياف النباتات المتسلقة، وعادة ما يتم بناء العش على ارتفاع 6 - 9 م فوق سطح الأرض (أحياناً ما بين 1 - 15 م) في تشعب، أو فرع جانبي من شجرة مورقة. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 20 يوماً. **مدة التعشيش:** 19 - 20 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **حالة الحماية:** صُنِّفَ هذا الطائر على أنه مهدد بالانقراض داخل شبه الجزيرة العربية بسبب حجمه التعدادي الصغير جداً، ناهيك عن معرفتنا المحدودة جداً حول هذا النوع وسلوكياته، إذ شوهد فقط في موقعين منفصلين بالمنطقة، ولم تُسجَل له أي أعشاش في شبه الجزيرة العربية.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 80
منطقة النشاط: جبل السودة

يمام مطوق	الاسم العربي:
فاخنة أوراسية	الاسم العربي الآخر:
<i>Streptopelia decaocto</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Collared-dove	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
32-30 سم / الذكر 150 - 260 غم؛ الأنثى 112 - 196 غم (أخف وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا، وشرقاً مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى اليابان. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر واسع الانتشار. قبل عام 1960، تم العثور على اليمام المطوق الذي أصبح مألوفاً الآن، في شبه الجزيرة العربية في اثنتين أو ثلاث مجموعات معزولة فقط، لكنه منذ ذلك الحين، سرعان ما عمل على توسعة نطاقه في جنوب وشرق غرب الكويت حتى وصل إلى جدة بحلول عام 1987، واليمن بحلول عام 2004، وهو الآن أحد أكثر الطيور انتشاراً في شبه الجزيرة العربية، إذ يوجد في دولها كافة، علماً أن 1,5 مليون زوج تتكاثر سنوياً في المملكة العربية السعودية وحدها. **الموئل:** المعالم الحضرية البشرية، بما في ذلك المتنزهات والحدائق والمزارع. ويوجد أيضاً، في الوديان المعزولة التي تتوافر بها شجيرات الطلح

السميكة، بينما يختفي تقريباً في المرتفعات الغربية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور والحبوب والأعشاب وغيرها من المواد النباتية واللافقاريات الصغيرة الموسمية التي يجدها غالباً على سطح الأرض. كذلك يتغذى على بقايا طعام الإنسان. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي في غير

لأنه يعيش إلى جانب البشر،

فقد أخذ نطاق هذا الطائر


في التوسع بصورة مطردة

منذ عام 1960. وهو الآن من

الطيور الخمسة الأكثر شيوعاً

في المملكة.

أوقات التكاثر، إذ شهود بمناسبة عدة في أسراب تتألف من 500 طائر أو أكثر. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش بجمعها الذكر، ويتشارك الزوجان مسؤولية حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** مصنوع من الأغصان والجذور الدقيقة وسيقان النباتات على ارتفاع يراوح بين 0,4 و 4,5 م فوق سطح الأرض في شجرة أو شجيرة، أو فوق أحد الأبنية أحياناً، أو مواقع غير عادية على كومة من الأسلاك الشائكة، أو حطام سيارة. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 14 - 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 15 - 19 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية. **ملاحظة:** يُعدُّ هذا الطائر أكبر حجماً من اليمام المطوق الأفريقي، وذو ذيل أطول، وأجزاء سفلى رمادية وأجزاء عليا بنية. منطقة أسفل الجناح بلون أسود فقط في الفصائل الأولية والثانوية الأولى.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,5 مليون

منطقة النشاط: أي مدينة أو بلدة



قمري نواج	الاسم العربي:
أن	الاسم العربي الآخر:
<i>Streptopelia lugens</i>	الاسم العلمي:
Dusky Turtle-dove	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
28 سم / 120 - 205 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم مع هجرة راسية محلية؛ يوجد في المناطق الجبلية في شرق أفريقيا (من شمال ملاوي باتجاه الشمال حتى إريتريا والصومال)، والمملكة العربية السعودية واليمن. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يتكاثر هذا الحمام ذو اللون القاتم في المرتفعات الجنوبية الغربية جنوب الباحة، خاصة في الجبال القريبة من أبها، وربما تهاجر إلى سفوح تهامة للثمنية. **الموئل:** مهاجر رأسي محتمل، يتكاثر بشكل شبه حصري على ارتفاعات فوق 2,000 م في غابة العرعر الجبلية القريبة من المناطق الزراعية. وفي الشتاء، يُحتمل أنه يهبط إلى الوديان الخضراء على سفوح

جبال تهامة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور والحبوب والحشرات والرخويات الملتقطة

من الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يوجد منفرداً، أو في مجموعات صغيرة تتألف من

10 طيور كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يُحتمل

أن الأنثى تتولى بناء العش، ويتشارك الزوجان

مسؤوليات حضنة الفراخ ورعايتها. **العش:**

قاعدة عش مصنوعة من الأغصان، ومبطنة

جيداً بالجذور الناعمة، وعادةً ما يتم بناؤه في

شجرة على ارتفاع 2 - 3 م فوق سطح الأرض

(قد يصل إلى 7 م)، وغالباً على فرع جانبي

لشجرة عرعر ناضجة، وربما في شجر الطلح أيضاً، أو أنه يتخذ موقعاً غير عادي وذلك ضمن

غطاء نباتي كثيف في جدار بئر ما. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 20 يوماً. **مدة**


التعشيش: غير معروفة (14 - 16 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** ربما حضنة مزدوجة.

تفوق 2,000 م في غابة العرعر

في جبال عسير، وذلك قبل أن

يهبط لقضاء فصل الشتاء

في وديان سفوح تهامة.



زائر شتوي، مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 30,000

منطقة النشاط: محمية ريدة



يمام أحمر العين

اسم العربي:	الاسم العربي الآخر:
اسم العلمي:	اسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:	المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:	المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:	

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر

30 سم / 162 - 310 غم



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب غرب المملكة العربية السعودية واليمن. **حاليته بالمملكة:** **مقيم متكاثر شائع.** يقتصر وجود هذا اليمام في الطوق الدائري في المملكة على منطقة تهامة وسفوح الجنوب الغربي. **الموئل:** دون 2,100 م في المناطق جيدة التشجير ذات المياه الجارية، لا سيما الوديان في السفوح السفلية المتاخمة لمنطقة تهامة والتلال والحدائق والمناطق الزراعية بالأشجار والشجيرات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور والتوت والفاكهة وغيرها من المواد النباتية بشكل أساسي، فضلاً عن اللافقاريات على الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أزواج، أو في مجموعات صغيرة في مواسم أخرى غير موسم التكاثر. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر، ويتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** رقيق مصنوع من الأغصان، مبني عادةً على ارتفاع يراوح بين 3 و5 م فوق سطح الأرض (قد يصل إلى 18 م كما هو مسجل في أفريقيا) بين أوراق الشجر الكثيفة (شجرة الطلح عادة)، وفوق الماء في معظم الأحيان. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 14-15 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 17 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.

يمتلك كل من الحمام

واليمام عضلات طيران كبيرة


تمثل نحو 44% من إجمالي

وزن أجسامها (مقارنة بنسبة

14% في الغطاسيات)، وهو

ما يتضح في قدرتها المذهلة

على الطيران.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 20,000

منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

**يمام مطوق أفريقي**

اسم العربي:	الاسم العربي الآخر:
اسم العلمي:	اسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:	المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:	المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:	

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

26 - 26 سم / 130 - 166 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جميع أنحاء منطقة الساحل الأفريقي، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر على بُعد 700 كم شمال وجنوب نطاق وجوده الأفريقي الرئيسي، وإلى الشمال الغربي في جنوب وغرب شبه الجزيرة العربية، ويقضي فصل الشتاء في نطاق إقامته بأفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شائع جداً، زائر شتوي غير شائع. يهاجر هذا اليمام الشجاع عبر البحر الأحمر للتكاثر في جنوب تهامة والسهول الواقعة إلى الغرب من المرتفعات جنوب تبوك، مع تكاثر المئات منه في جزيرتي أم القماري وكذميل (قبالة القنفذة والقحمة على التوالي)، علماً أن بعض تعداداته تقضي الشتاء (نوفمبر - فبراير) في المملكة. **الموئل:** دون 1,500 م في غابات وشجيرات الطلح المفتوحة، وغالباً بالقرب من القرى أو المناطق الزراعية، كما يوجد أيضاً في المناطق النائية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور الصغيرة (خاصة الأعشاب)، وكذلك الحشرات والقواقع الصغيرة الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في مجموعات صغيرة، أو أسراب تتألف من 50 طائراً كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تتكاثر بشكل فردي، أو في مجموعات متفرقة، أو مستعمرات مدمجة. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي. ويتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** رقيق مصنوع من الأغصان، ومبطن بالعشب، أو قرون الطلح، ومبني إما على ارتفاع 1 - 3 م فوق سطح الأرض في شجرة أو شجيرة، أو 30 سم فقط فوق سطح الأرض، ويفصل بين تلك الأعشاش 30 سم في مستعمرات الجزر، وغالباً ما يُعاد استخدام العش في الحضنات التالية. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية. **ملاحظة:** أصغر حجماً من اليمام المطوق (فاخنة أوراسية)، ذيله أقصر ويمتاز باللون البني الرملي في المناطق العليا والرمادي المائل إلى الوردي في المناطق السفلية والرأس. كما أن بطن هذا الطائر والمنطقة السفلية للذيل لونهما أبيض، والجزء السفلي من الجناح باللون الأسود.

كل عام، يهاجر نحو مليون


من طائر اليمام المطوق

الأفريقي عبر البحر الأحمر

للتكاثر جنوب غرب المملكة

العربية السعودية.

استخدام العش في الحضنات التالية. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية. **ملاحظة:** أصغر حجماً من اليمام المطوق (فاخنة أوراسية)، ذيله أقصر ويمتاز باللون البني الرملي في المناطق العليا والرمادي المائل إلى الوردي في المناطق السفلية والرأس. كما أن بطن هذا الطائر والمنطقة السفلية للذيل لونهما أبيض، والجزء السفلي من الجناح باللون الأسود.



مهاجر متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500,000

منطقة النشاط: كذميل (قبالة القحمة)



يمام طويل الذيل

حمحم
Oena capensis
Namaqua Dove
غير مهدد
يتزايد
غير مهدد
يتزايد
28 سم / 28 - 54 غم


الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء الغابات الاستوائية) مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى لبنان والعراق وإيران. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. اقتصر وجود هذا اليمام المزخرف في السابق على جنوب غرب المملكة، وجنوب جدة حيث الأراضي المنخفضة في تهامة بشكل رئيس، والأطراف الشرقية من المرتفعات. وفي عام 1975 تقريباً، بدأ «يمام طويل الذيل» في توسيع نطاق وجوده بشكل كبير بفعل التنمية الزراعية، وأصبح موجوداً في معظم المناطق المأهولة بالسكان في وسط المملكة حتى المنطقة الشرقية، وشمالاً حتى تبوك، علماً أن بعضها

خلال الأربعين سنة الماضية، شهد نطاق وجود هذا اليمام الصغير توسعاً كبيراً في المملكة بفعل التنمية الزراعية.

يتجول ضمن نطاق واسع خلال فصل الشتاء. **الموئل:** يوجد هذا الطائر في الجنوب الغربي، ويتكاثر في غابات الطلع والمناطق الزراعية بالقرب من القرى، بينما يتكاثر في الأراضي الزراعية في المناطق الوسطى بشكل رئيس. **سلوك البحث عن الغذاء:** **النظام الغذائي:** بشكل أساس البذور الصغيرة من الحشائش والأعشاب الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً منفرداً، أو في أزواج، على الرغم من إمكانية وجود مئات منه بالقرب من مصادر المياه والغذاء. **الغنية:** **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة منطوقية أحادية اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** عش رقيق مصنوع من الأغصان والجذور الدقيقة، ومبطن بالجذور الدقيقة والأعشاب، ويوضع على ارتفاع 0.2 - 1.5 م فوق سطح الأرض في شجيرة ما. **مواقع غير عادية:** فوق بالة قش، أو جذور شجرة مقلوبة. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 13 - 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 35,000
منطقة النشاط: حرض

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

يمام النخيل

ديبسي
Spilopelia senegalensis
Laughing Dove
غير مهدد
مستقر
غير مهدد
يتزايد
27 سم / 71 - 92 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا، وشرقاً عبر شبه الجزيرة العربية حتى الهند، وشمالاً حتى كازاخستان. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. توسع نطاق تكاثر هذا اليمام المألوف بشكل كبير في المملكة منذ سبعينيات القرن الماضي، ربما نتيجة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية وقنوات الري، وهو يوجد الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية بالقرب من كل مستوطنة بشرية تقريباً. **الموئل:** أي منطقة تحوي أشجاراً وشجيرات، بما في ذلك المناطق القاحلة والمستوطنات البشرية بشكل عام، مثل الحدائق والمنتزهات وبساتين النخيل.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: بشكل أساس البذور الصغيرة، إلى جانب بعض الفاكهة والحشرات على الأرض بالقرب من الشجيرات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة بشكل فردي، أو في مجموعات تتكون من 3 - 4 طيور، على الرغم من تجمع مئات منه عند أحواض المياه. **سلوك**

التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة منطوقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر. ويتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** واه مصنوع من الأغصان أو

الجذور الدقيقة، ومبطن بالعشب وسيقان النباتات، وعادةً ما يكون مبنياً على ارتفاع 2 - 4 م فوق سطح الأرض في شجرة، أو شجيرة (ربما نجد أيضاً على ارتفاع 12 م فوق أي مبنى). وغالباً ما يُعاد استخدام بعض الأعشاش في حضنات تالية. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش وتتسلق الفروع القريبة في غضون 10 أيام، وتطير بعمر 14 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة، أو ثلاثية.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 800,000
منطقة النشاط: أي مدينة أو بلدة

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

قطا أسود البطن

الاسم العربي:	قطا أسود البطن
الاسم العربي الآخر:	جونية
الاسم العلمي:	<i>Pterocles orientalis</i>
الاسم الشائع:	Black-bellied Sandgrouse
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	مهدد بالانقراض
المنحى الإقليمي للمجموعة:	غير معروف
الحجم والوزن:	33 - 39 سم / الذكر 400 - 550 غم؛ الأنثى 300 - 460 غم (أخف وزناً بنسبة 20%)



أنثى وذكر (إلى اليسار) قطا أسود البطن


النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في كل من أيبيريا وشمال أفريقيا وشبه جزيرة سيناء، ومن تركيا حتى أفغانستان، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في كازاخستان وغرب الصين جنوباً حتى تركمانستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في فلسطين وصولاً إلى غرب الهند. **حاليته بالمملكة:** **زائر شتوي محدود.** أحياناً يصل طائر القطا المتميز في فصل الشتاء إلى أقصى الجنوب حتى شمال المملكة، خاصة في فصول الشتاء ذات الرياح الشمالية شديدة البرودة، وغالباً ما يُشاهد من محمية الملك سلمان (حرة الحرة) شرقاً إلى الدببة، وجنوباً إلى الثمامة. **الموائل:** المروج المفتوحة وسهول الطمي القاحلة الخالية من الغطاء الشجري أو الشجيري الكثيف، خاصة السهول الخالية من الأشجار في شمال المملكة. كما يوجد أيضاً في الحقول التي تم حرثها. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام

الغذائي: البذور والحبوب بشكل أساسي، إلى جانب الأوراق والبراعم والتوت، وعدد قليل جداً من اللافقاريات الملتقطة من الأرض أو من الغطاء النباتي. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما تأتي الأنواع الزائرة في الشتاء إلى المملكة ضمن مجموعات صغيرة تتألف من 30 طائراً كحد أقصى، وغالباً ما تختلط

يُعدُّ هذا النوع الأكبر والأكثر عرضة للانقراض بين طيور القطا في المملكة، علماً أنه يفضل الهجرة إلى شمال المملكة خلال فصول الشتاء ذات الرياح الشمالية شديدة البرودة.

بأسراب من القطا مسنن الذيل، وترتحل الأسراب إلى المياه في أوقات منتظمة كل يوم على بُعد كيلومترات عدة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** تحافظ الأزواج المتكاثرة على رابطة قوية خلال فصل الشتاء. وحتى عندما تطير الأسراب لأعلى، يمكن رؤية الأزواج المتكاثرة بوضوح؛

حيث تطير بشكل أقرب إلى بعضها، مقارنة بالطيور الأخرى في المجموعة. **باع الجناح:** 70 - 73 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر مدرج في قائمة الطيور المهددة بالانقراض إقليمياً، لكون التقديرات تشير إلى عدم احتواء أي تعداد فرعي منه على أكثر من 250 فرداً بالغاً. وقد يكون الصيد تهديداً كبيراً في شبه الجزيرة العربية، لما كان تمرّكه بأعداد كبيرة في مواقع الشرب التقليدية، ما يجعل منه هدفاً سهلاً نسبياً للصيادين.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الملك سلمان

**الحمامة الخضراء**


الاسم العربي:	الحمامة الخضراء
الاسم العربي الآخر:	رهطلى
الاسم العلمي:	
الاسم الشائع:	Bruce's Green-pigeon
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر (من المُرَجَّح)
الحجم والوزن:	28 - 30 سم / 251 - 268 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في منطقة الساحل الأفريقي، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة العربية (جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وغرب سلطنة عُمان واليمن)، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 500 كم على الأقل غرباً داخل نطاق إقامته في أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** **مهاجر متكاثر شائع، زائر شتوي نادر.** يهاجر هذا الحمام الجميل والغامض عبر البحر الأحمر ليتكاثر في منطقة صغيرة في جنوب غرب تهامة والسفوح والمرتفعات. **الموائل:** يوجد عند مستوى سطح البحر في تهامة، غير أنه غالباً ما يوجد في التلال على ارتفاع 1,000 - 2,700 م في المناطق المزروعة جيداً بأشجار الفاكهة والتين، لا سيما الوديان والحدائق والمزارع والتلال المشجرة، وبالقرب من مصادر المياه غالباً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام **الغذائي:** الفاكهة، خاصة التين الملتقطة من داخل ظلة الشجر. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي عند الأشجار

في كل عام، يطير قرابة 30,000 زوج من هذا الحمام ذي المنقار الذهبي عبر البحر الأحمر ليتكاثر في جنوب غرب المملكة.

الموفرة للطعام، لا سيما في فصل الشتاء، حيث يمكن العثور على مجموعات تتألف من 50 طائراً كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** نظام **التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي، مع العلم بأن الزوجين يتشاركان مسؤوليات الحضنة. **العش:** ضحل ورفيق وغير مبطن مصنوع من الأغصان، ومبني على ارتفاع 4 - 6 م فوق سطح الأرض في فرع شجرة خارجي مورق (أو في كثير من الأحيان بجوار جذع) من شجرة سنط، أو عرعر، أو ليلاب. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** غير معروفة (13 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (11 - 13 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزودة في بعض الأحيان.



مهاجر متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 30,000
منطقة النشاط: وادي ريدة




قطا مرقط	الاسم العربي:
كدرية ذنوب	الاسم العربي الآخر:
<i>Pterocles senegallus</i>	الاسم العلمي:
Spotted Sandgrouse	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
30 - 35 سم / 250 - 340 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم رخال؛ يوجد في شمال أفريقيا (امتداداً من الصحراء الغربية حتى الصومال والبحر الأحمر)، ومن شبه الجزيرة العربية حتى شمال غرب الهند، علماً أن بعض تعداداته ترحل شرقاً لقضاء فصل الشتاء في الهند وباكستان. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع وغير منتظم. لَمَّا كان هذا القطا ذو الألوان الدافئة طائراً رحالاً، فإن تعداداته قد تظهر على نحو غير منتظم

حيثما تتوفر الظروف المواتية. ورغم ذلك، يمكن أن يكون منتظماً وشائعاً بالقرب من حرض والهفوف. **الموئل:** السهول الرملية أو الحصوية الصلبة ذات النباتات المتناثرة بالقرب من مصادر المياه، لا سيما حقول الحبوب المروية بالقرب من حرض والهفوف. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور الصغيرة الصلبة وبعض النباتات الخضراء الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى، ويتغذى غالباً في الساعات الباردة



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 2,000

منطقة النشاط: الهفوف



يتميز هذا الطائر البديع بالترحال، ويظهر حيثما توافرت الظروف المواتية. ولسوء الحظ، فقد تقلص نطاق وجوده في شبه الجزيرة العربية بشكل ملحوظ خلال المائة عام الماضية.

الحبوب المروية في حرض. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، غير أن الكثير منها قد تعيش متقاربة في الموائل الجيدة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة فوق الأرض، وعادةً ما تكون في العراء أو بجانب صخرة منخفضة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 29 - 31 يوماً. **الفراخ:** تترك الفراخ العش بعد فترة قصيرة من الفقس وتتبع الأبوين، لكن عمر طيرانها غير معلوم (4 - 6 أسابيع في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان **باع الجناح:** 53 - 65 سم.

قطا كستنائي البطن	الاسم العربي:
غطاطة	الاسم العربي الآخر:
<i>Pterocles exustus</i>	الاسم العلمي:
Chestnut-bellied Sandgrouse	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
31 - 33 سم / 140 - 240 غم	الحجم والوزن:



أنثى غطاطة والذكر (إلى اليسار)

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أرجاء منطقة الساحل الأفريقي، مروراً عبر شبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى الهند، علماً أن اثنين من الطيور الفرعية الستة المعترف بها يعيشان في المملكة العربية السعودية، بما فيها *P. e. erlangeri* المتوطن في جنوب شبه الجزيرة العربية (جنوب غرب المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة واليمن). **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع.

يمكن العثور على هذا الطائر الصغير ذي الريش الذيلي المركزي الممتد، في جنوب تهامة، وعلى الجانب الشرقي من المرتفعات. **الموئل:** يوجد دون ارتفاع 1,000 م في الصحراء الرملية القاحلة أو السهول الحصوية

التي تتوافر بها الشجيرات، أو الأشجار المبعثرة غالباً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور الملتقطة من الأرض بشكل أساس. **النشاط:** نهارى، يتغذى خلال الساعات الباردة من الصباح المبكر وقبل المغرب، ويشرب في أول 2 - 3 ساعات بعد شروق الشمس، وأحياناً في فترة بعد الظهر خلال

الطقس شديد الحرارة. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي، وتوجد مئات أو حتى آلاف منه بالقرب من الأحواض والآبار المائية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضنة الصغار خلال النهار، والذكر خلال الليل. ويتشارك الزوجان رعاية الفراخ التي تبقى معهما حتى تكبر. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة فوق أرض رملية أو حصوية، إما في العراء أو بجانب صخرة أو شجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 22 - 23 يوماً. **الفراخ:** تترك الفراخ العش بعد فترة قصيرة من الفقس وتتبع الأبوين، لكن عمر طيرانها غير معلوم (4 - 6 أسابيع في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مفردة. **باع الجناح:** 48 - 51 سم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 20,000

منطقة النشاط: برك مياه الصرف في أبو عريش



قطاة نبطاء

Pterocles alchata
Pin-tailed Sandgrouse

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
يتناقص
31 - 39 سم / 207 - 408 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر




أنثى

النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وشبه جزيرة أيبيريا والشرق الأوسط وأفغانستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب كازاخستان وصولاً إلى تركمانستان، بينما يقضي فصل الشتاء حول بحر قزوين (في الجنوب)، وشمال غرب الهند وشمال شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مهاجر

متكاثر نادر جداً، زائر شتوي غير شائع. يوجد

هذا الطائر البديع في المملكة في فصل الشتاء، لا سيّما بعد هطول الأمطار الغزيرة، وربما يبقى تعداد رُحّال منه للتكاثر في بعض الأحيان. يمكن العثور عليه في معظم الأحيان في أقصى الشمال، لا سيّما داخل محمية الملك سلمان (حرة الحرة)، وعلى طول الحدود العراقية. **الموئل:** السهول الرملية، والحصوية المفتوحة، والمناطق الحجرية ذات الغطاء

النباتي المنتشر والمتناثر، والأراضي الزراعية أحياناً. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يعتمد بشكل أساسي على الحبوب والبذور والغلّال والبقوليات المزروعة الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى ويشرب عادةً في الصباح. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أزواج أثناء التكاثر، وعادةً ما يكوّن أسراباً من 15 - 30 طائراً في فصل الشتاء، على الرغم من تسجيل أسراب تتألف من مئات عدة أيضاً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، رغم احتمالية وجود عديد منها في تجمعات متفرقة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. كما يوفر الذكر الماء للفراخ بالعودة إلى العش بريش صدره وقد تشبّع بالمياه. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنّة فوق سطح الأرض، إما في العراء، أو محمية جزئياً بشجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 22 - 25 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة وتتبع أبويها، ثم تطير عند عمر 4 - 6 أسابيع. **الحضنة:** أحادي الحضنات عادةً. **باغ الجناح:** 54 - 65 سم.



مهاجر متكاثّر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 50

منطقة النشاط: محمية الملك سلمان

**قطا متوج**

كدرية شائعة
Pterocles coronatus
Crowned Sandgrouse

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
27 - 30 سم / 240 - 300 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال أفريقيا (من الصحراء الغربية حتى البحر الأحمر) مروراً بغرب شبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى باكستان. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثّر ونادر. سُجّل وجود طائر القطا البديع هذا سابقاً في جميع أنحاء المملكة، لكن ثمة القليل من السجلات المؤكدة - منذ عام 1984 - حول وجوده في وسط المملكة، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يُعَدُّ انخفاضاً في التعداد، أم انعدام دقة في العينات المأخوذة، نظراً للافتقار لتغطية المراقبين. يبدو بأن معقله في محافظة تبوك. **الموئل:** الصحارى الرملية، أو الحصوية المفتوحة ذات الشجيرات الصغيرة، مع مصدر لمياه الشرب على مسافة يستطيع الطائر قطعها يومياً. ومن المثير للاهتمام، أن لا أثر لهذا الطائر في حقول الحبوب المرورية وسط المملكة التي تُعَدُّ موئلاً مناسباً. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور الملتقطة من الأرض بشكل أساسي. **النشاط:** نهارى. يشرب قبل الساعة 9 صباحاً في فصل الصيف و10:30 صباحاً في الشتاء. وقد يشرب أيضاً، في المساء خلال الأجواء شديد الحرارة. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، وقد تشرب المئات معاً في أحواض المياه. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى

الأنثى الحضنة أثناء النهار والذكر أثناء الليل.

كما يرفع الزوجان الفراخ؛ حيث يوفر الذكر

الماء للفراخ وذلك عندما يعود إلى العش

بريش صدره وقد تشبّع بالمياه. **العش:** حفرة

ضحلة غير مبطنّة على أرض مفتوحة، وأحياناً


مع حلقة من الحجارة الصغيرة حول الحافة.

البيض المحضون: 2 - 3 بيوض. **الحضانة:**

غير معروفة (22 - 25 يوماً في الأنواع

المماثلة). **الفراخ:** تترك الفراخ العش بعد فترة

قصيرة من الفقس وتتبع الأبوين، لكن عمر طيرانها غير معلوم (4 - 6 أسابيع في الأنواع

المماثلة). **الحضنة:** أحادي الحضنات على الأرجح. **باغ الجناح:** 52 - 63 سم.

مقيم متكاثّر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500


منطقة النشاط: تبوك



اسم عربي:	سبد أوروبي
اسم علمي:	<i>Caprimulgus europaeus</i>
اسم شائع:	European Nightjar
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	25 - 28 سم / 51 - 101 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا حتى منغوليا، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 9,000 كم نحو الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع مرور نسبة كبيرة من تعداده العالمي عبر شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. ينتشر هذا الطائر المهاجر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة، وربما يكون أكثر شيوعاً في فصل الربيع، ما يشير إلى أنه يهاجر في دورة مغلقة. وتتمخض مشاهداته في معظمها عن طيور فردية، وغالباً ما تبدو متعبة للغاية وتطير على مضض، ولأنها نادراً ما تُرى في أيام متتالية، فإنها تستأنف هجرتها بسرعة بعد قضاء قسط من الراحة. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أي مكان على طول طريق الهجرة، بما في ذلك الكثبان الرملية القاحلة، والحدائق وفيرة الظلال في المناطق الحضرية، وبين الصخور على الساحل، وحتى على السفن في البحر. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات الطائرة، بما في ذلك العث والخنافس والجراد واليعسوب، حيث



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: كورنيلش جدة

تتعتمد السبديات على الرؤية الليلية في بحثها عن فرائسها من الحشرات، ومن ثم فإنها تميل إلى أن تكون أكثر نشاطاً (وأكثر صخباً) بحلول الشفق، وفي الليالي المقمرة. يعتمد السبديات على رؤيتها الليلية في بحثها عن فرائسها من الحشرات، ومن ثم فإنها تميل إلى أن تكون أكثر نشاطاً (وأكثر صخباً) بحلول الشفق، وفي الليالي المقمرة. يعتمد السبديات على رؤيتها الليلية في بحثها عن فرائسها من الحشرات، ومن ثم فإنها تميل إلى أن تكون أكثر نشاطاً (وأكثر صخباً) بحلول الشفق، وفي الليالي المقمرة.

النشاط: ليلي، ويهاجر ليلاً أيضاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتميز هذا الطائر بقدرته الكبيرة على التموه، ما يجعل من اكتشافه عندما يكون ساكناً أمراً غاية في الصعوبة، وعندما يتعرض للانزعاج فإنه يغادر بصمت في ظلام الليل. وبالنظر إلى أن طيور السبد عادةً ما تقف بلا حراك فوق سطح الأرض، فقد يتفاجأ كثيرون لدى علمهم بأنها تنتمي إلى رتبة *Caprimulgiformes* نفسها التي تنتمي إليها طيور السمامة والطنان، المعروفة بكثرة تنقلها وسرعة حركتها بشكل استثنائي.




اسم عربي:	قطا مخطط
اسم عربي الآخر:	كدرية حجازية
اسم علمي:	<i>Pterocles lichtensteinii</i>
اسم شائع:	Lichtenstein's Sandgrouse
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	22 - 26 سم / 175 - 250 غم



انثتان من الإناث، والذكر (في الوسط)

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أفريقيا (من الصحراء الغربية حتى كينيا والبحر الأحمر)، ومن شبه الجزيرة العربية حتى باكستان. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. تتسنى مشاهدة هذا الطائر شديد التفرد في كل من تهامة والسفوح الغربية والأطراف الشرقية من المرتفعات الغربية. **الموئل:** يوجد دون ارتفاع 1,800 م على سفوح التلال الجافة والصخرية والوديان والسهول الحصوية، لا سيما حيث توجد أشجار الطلح. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور الملتقطة من الأرض. **النشاط:** ليلي، وغسقي. يفضل الشرب قبيل شروق الشمس وعند غروبها. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في مجموعات صغيرة تتكون من 10 - 15 طائراً في مواسم أخرى غير موسم التكاثر. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج:

أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. كما يوفر الذكر الماء للفراخ بالعودة إلى العش بريش صدره وقد تشبع بالمياه. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة فوق سطح الأرض، بجوار صخرة أو شجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (22 - 25 يوماً في الأنواع المماثلة). **الفراخ:** تترك الفراخ العش بعد فترة وجيزة من الفقس وتتبع الأبوين، لكن عمر طيرانها غير معلوم (4 - 6 أسابيع في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** أحياناً حضنة مزدوجة. **ملاحظة:** نظراً لما يتمتع به هذا القطا من تمويه رائع وعادات ليلية، فإنه يُحتمل أن يكون أقل أنواع القطا شيوعاً في المملكة، رغم أنه من أكثرها عدداً. **بأج الجناح:** 48 - 52 سم.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 11,000
منطقة النشاط: برك مياه الصرف في أبو عريش



اسم عربي:	سبد نوبي
اسم علمي:	<i>Caprimulgus nubicus</i>
اسم شائع:	Nubian Nightjar
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر (احتمالاً)
الحجم والوزن:	21 - 21 سم / 46 - 55 غم



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق أفريقيا (من كينيا باتجاه الشمال نحو السودان)، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية حتى البحر الميت. وقد تم التعرف إلى ثلاثة أنواع فرعية منه، بما في ذلك *C. n. tamaricus* المتوطن إلى حد كبير في شبه الجزيرة العربية، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية واليمن، وربما سلطنة عُمان، وفي شمال الأردن وفلسطين. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. يوجد هذا الطائر بارح التمويه في سهول تهامة، وسفوح مرتفعات عسير والحجاز. **الموئل:** يفضل الأراضي الصحراوية الرملية والصخرية، أو شبه الصحراوية ذات حزم الأعشاب والشجيرات المنخفضة وأشجار الطلح المتناثرة. ويوجد أيضاً في الأجمات والغابات المفتوحة، بما فيها غابات الطلح والأثل والكافور.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 2,400

منطقة النشاط: برك مياه الصرف في أبو عريش

لأنها من الطيور الليلية، تستخدم طيور السبد أعينها الخارقة للبحث عن الحشرات ليلاً، وقدرتها الاستثنائية على التمويه للاختباء بين أوراق الأشجار المتساقطة نهاراً.


كما يتشارك الزوجان مسؤولية رعاية الفراخ. **العش:** يوضع البيض على الأرض مباشرة، وغالباً ما يكون ذلك عند قاعدة شجيرة صغيرة. **البيض المحضون:** من واحدة إلى بيضتين. **الحضانة:** غير معروفة (16 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **ملاحظة:** قد يكون الطائر الفرعي الموجود بالمملكة *C. n. tamaricus* في الواقع متميزاً، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا الأمر. وفي حال تأكيد حقيقة انفصال ذلك التعداد كنوع مستقل، فسيكون بمثابة نوع آخر شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية.

اسم عربي:	سبد مصري
اسم علمي:	<i>Caprimulgus aegyptius</i>
اسم شائع:	Egyptian Nightjar
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	24 - 26 سم / 68 - 93 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال غرب أفريقيا ودلتا النيل، ومن العراق حتى كازاخستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 - 4,000 كم نحو الجنوب والجنوب الغربي بشكل رئيس في منطقة الساحل الأفريقي، ويفضل تعداد صغير منه قضاء الشتاء في دول الخليج العربي. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محلي، زائر صيفي غير شائع، مهاجر متكاثر محتمل. يقضي طائر السبد الصغير فصل الشتاء محلياً في المنطقة الشرقية (أكتوبر - مارس)، وهو مهاجر عابر (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر) لمنطقة وسط المملكة. ثمة عديد من المشاهدات الصيفية من المنطقة الشرقية التي قد تكون طيوراً مهاجرة عابرة مبكرة. كما يمكن أن يُوجد في تلك المنطقة تعداد متكاثر غير مُسجّل، بما أنها تتكاثر بالقرب من الكويت والعراق وإيران. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أيّ مكان على طول طريق الهجرة، ويوجد أثناء الشتاء في المستنقعات والأراضي الرطبة ومكبات النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات الطائرة، بما فيها العث والنمل والأرضة وأسد المن التي يلتقطها أثناء الطيران. **النشاط:** ليلي وغسقي، ويكون أكثر نشاطاً عند شروق الشمس وغروبها. **السلوك الاجتماعي:** يفضل البقاء منفرداً، بالرغم

من أنه قد تم الإبلاغ عن اجتماع عشرة منه في طريق الهجرة، وعن أسراب رعي صغيرة في أماكن أخرى. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: زوج إحصائي يتكاثر إقليمياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الإناث مسؤولية الحضانة، ويتشارك الزوجان مسؤولية رعاية الفراخ. **العش:** يوضع البيض على الأرض مباشرة. **البيض المحضون:** من واحدة إلى بيضتين. **الحضانة:** 17 - 18 يوماً. **مدة التعشيش:** غير معروفة (16 - 18 يوماً في الفصائل المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **ملاحظة:** غالباً ما ينجذب هذا الطائر إلى الطرقات ليلاً، ويبقى ثابتاً لدى إضاءة المصابيح الامامية للسيارات. وخلال النهار، يجلس بهدوء بعيداً عن أشعة الشمس، معتمداً على قدرته المذهلة في التمويه لتجنب اكتشافه.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً: 10

منطقة النشاط: سبخة الفصل



اسبد السهول	الاسم العربي:
اسبد بهيم	الاسم العربي الآخر:
<i>Caprimulgus inornatus</i>	الاسم العلمي:
Plain Nightjar	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
22 - 23 سم / 32 - 61 غم	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أفريقيا (من موريتانيا إلى إريتريا والصومال) وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم كحد أقصى جنوب نطاق تكاثره، حيث تقضي جميع التعدادات العربية فصل الشتاء في أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر. يوجد «اسبد السهول» الذي يجيد أسلوب التمويه والتخفي في جنوب الطائف، ويهاجر عبر البحر الأحمر. **الموئل:** يوجد عادةً على ارتفاع 500 - 1,000 م (أحياناً يصل إلى 2500 م)، وغالباً فوق التلال الجافة والصخرية والعرارية، مع بعض الأشجار والشجيرات المتناثرة هنا وهناك. كما يوجد في المدرجات الزراعية، وغابات أشجار العرعر. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على العث والنمل الأبيض (الأرضة) والنمل والجنادب والخنافس، وغيرها من الحشرات الطائرة التي يلتقطها أثناء الطيران بعد هجوم مباغت وقصير انطلاقاً من الأرض، أو مجثم في مكان ما، أو بعد مطاردات طويلة.

عادةً ما يفقس بيض اسبد السهول بعد ولادة الهلال وقبل اكتماله بدرأ، وحين يحدث ذلك تكون الفراخ في أوج جوعها والصيد في أيسر حالاته.

النشاط: ليلي، وغسقي، أما في النهار فيعتمد على التمويه للتخفي بين أوراق الشجر، أو تلك المتساقطة. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، بالرغم من شيوع رؤيته محلياً ضمن مجموعات صغيرة في الموائل المثلى الغنية بالفرائس.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة (في الأنواع المماثلة، تتولى الأنثى حضانة البيض، ويتشارك الزوجان رعاية الفراخ). **العش:** يوضع البيض فوق الأرض مباشرة، وغالباً ما يكون ذلك بالقرب من شجيرة صغيرة، أو محمي نباتات حرجية. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** غير معروفة (17 - 19 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (16 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** من المرجح أن تكون حضنة مزدوجة.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 700
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر


اسبد الجبال	الاسم العربي:
اسبد أرمذ الرأس	الاسم العربي الآخر:
<i>Caprimulgus poliocephalus</i>	الاسم العلمي:
Montane Nightjar	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
22 - 24 سم / 37 - 50 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق أفريقيا (من تنزانيا باتجاه الشمال حتى إثيوبيا)، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. قد يكون التعداد العربي منه نوعاً فرعياً متميزاً (وبالتالي متوطناً)، رغم الحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذا الأمر. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر. يمكن العثور على هذا السبد داكن اللون في المرتفعات والسهوم الجنوبية الغربية، جنوب مدينة الطائف. **الموئل:** هذا الطائر المهاجر يخلق على مسافات مرتفعة، ففي الصيف يخلق لما يزيد على 2,000 م، بينما يخلق لما يراوح بين 1,200 - 1,900 م خلال فصول الشتاء ذات الرياح العاتية شديدة البرودة، وهو يفضل المنحدرات التي تضم غابات العرعر، والتنوعات الصخرية في محمية ريدة، أو المنحدرات الصخرية المفتوحة ذات الغطاء النباتي المتناثر وأشجار العرعر المتبقية في الجزء الشمالي من نطاق وجوده. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يضم غداؤه العث والخنافس والنمل الأبيض (الأرضة) والجراد، ويلتقطها بالانقضاض عليها في المناطق المفتوحة ذات الأشجار متوخيماً

يعدُّ طائر اسبد الجبال من أكثر أنواع الطيور براعة في التمويه، إذ يعتمد إلى تغيير لونه ليتلاءم مع الرمال، والأحجار، وأوراق الشجر المتناثرة.

الطيران السريع والرشيق. **النشاط:** ليلي، وغسقي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي، غير أن الأنثى تتولى الحضانة خلال النهار، والذكر في الليل. **العش:** يوضع البيض على الأرض مباشرة، أو بين أوراق الشجر، وغالباً ما يكون ضمن مساحة صغيرة عند قاعدة شجرة ما، أو شجيرة. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** غير معروفة (17 - 19 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (16 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة على الأرجح. **ملاحظة:** تكون البقعة البيضاء في الجزء الخارجي من الجناح (تكون مرئية أثناء الطيران) أكبر لدى الذكور.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,000
منطقة النشاط: تنومة



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

اسمها العربي:	سمامة الصرود
اسمها العلمي:	<i>Tachymarptis melba</i>
اسمها الشائع:	Alpine Swift
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر (من المحتمل)
الحجم والوزن:	20 - 22 سم / 104 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شرق وجنوب أفريقيا، ومدغشقر والهند، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، وبالاتجاه شرقاً مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى جبال الهيمالايا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع، مهاجر عابر محدود. يوجد هذا الطائر الاستثنائي، الأكبر من نوعه في المملكة، على نطاق واسع ضمن أعداد صغيرة على طول طريق الهجرة في جميع أنحاء المملكة. كما

يفضل جزء من تعداده البقاء في فصلي الربيع والصيف للتكاثر في المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الوسطى. **الموئل:** يتكاثر في المناطق الصخرية ذات المنحدرات، ويتغذى أثناء الطيران فوق كل الموائل بطول طريق الهجرة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الطائرة الصغيرة، بما في ذلك الذباب والخنافس والمن والديابري، إلى جانب العناكب والزبديات التي يلتقطها في الهواء حتى ارتفاع

يمكن لهذا الطائر المذهل

الطيران لما يزيد على 200

يوم وليلة من دون توقف،

وهو يبحث عن الغذاء ويتزاوج


وينام أثناء الطيران.

أو حول الأضواء، علماً بأنه يمكنه الهجرة ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يوجد في مجموعات صغيرة، أو في أسراب تتألف من 300 طائر كحد أقصى أحياناً. **سلوك**

التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثر أحادية الزواج اجتماعياً، وتعيش في مستعمرات تضم حتى 20 زوجاً. وفي بعض الأماكن، يمكن أن تستمر مواقع المستعمرات لقرون عدة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضان البيض ورعاية الفراخ. **العش:** وعاء ضحل مصنوع من بقايا النباتات والريش (يتم جمعها أثناء

الطيران، مع لصق أجزائه باستخدام اللعاب). وعادةً ما يُوضع في شق داخل منحدر غرانيتي شديد التحدّر (ربما أيضاً في مبنى طويل، أو جسر، أو أي هيكل آخر كما هو مسجل في مكان آخر). **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 17 - 23 يوماً. **مدة التعشيش:**

45 - 55 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 5,000

منطقة النشاط: بني مالك (إلى الشمال من

فيفاء)



سمامة نخيل أفريقية

اسمها العربي:	سمامة نخيل أفريقية
اسمها العلمي:	<i>Cypsiurus parvus</i>
اسمها الشائع:	African Palm-swift
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتزايد
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر (محتمل أن يتناقص)
الحجم والوزن:	16 سم / 10 - 18 غم



سمامة نخيل أفريقية أثناء التعشيش.

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومدغشقر وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. يمكن العثور على هذا الطائر الصغير بأنماط طيرانه الساحرة في تهامة والواديان في سفوح الجبال الجنوبية الغربية إلى الجنوب من الوسقة. **الموئل:** يوجد حيثما تنتشر أشجار نخيل الدوم بشكل واسع، لكونها تنطوي على الكثير من السعف المتدلي، ما يوفر مواقع تعشيش ومجاثم مثالية لطيور سمامة النخيل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** مجموعة كبيرة من الحشرات الطائرة، بما في ذلك الذباب والنمل الأبيض (الأرضة) والنمل

والخنفساء والبق الملتقطة في الهواء. علماً أنه يشرب أثناء الطيران عن طريق غمس


الرأس في المياه العذبة المفتوحة. **النشاط:** نهارى، وغسقي. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يربى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة متفرقة تتألف من 10 - 20 طائراً كحد أقصى.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثر أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مستعمرات صغيرة تضم أقل من 5 أزواج. **الأدوار الأبوية:**

يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضان البيض ورعاية الفراخ. **العش:** عبارة عن وسادة شبه عمودية من الريش ووبر النباتات (يتم جمعه أثناء الطيران، ولصقه فوق بعضه البعض)، مع حافة صغيرة في القاعدة لدعم البيض، ويوضع على ارتفاع فوق 3 أمتار فوق سطح الأرض في إحدى نخلات الدوم، ويكون موصولاً بسعفة متدلية جافة مخفياً بين

مجموعة من السعف. يُلصق البيض بالعش بواسطة اللعاب. ولحضانة البيض، يتعلق الطائر البالغ بالعش ويضغط بجسده على البيض، ومن ثم تحاكيه الفراخ في هذا التعلق العمودي الغريب. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 20 يوماً. **مدة التعشيش:**

32 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة على الأرجح. **ملاحظة:** هذا الطائر متميز للغاية في طيرانه، حتى في انعكاس ظله، إذ يغير اتجاهه بسرعة خاطفة برفرفة جناحيه فائقة السرعة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 7,500

منطقة النشاط: وادي بيش



اسمها العربي:	سمامة فاتحة
اسمها العلمي:	<i>Apus pallidus</i>
اسمها الشائع:	Pallid Swift
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	يتزايد
الحجم والوزن:	16 سم / 42 غم




النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مصر وتشاد والنيجر، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى جنوب إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بعد 3,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في غرب أفريقيا، من السنغال حتى جنوب السودان. **حالته بالمملكة: مهاجر متكاثر غير شائع.** يتكاثر هذا الطائر الغامض في المملكة العربية السعودية على نحو أساس شمالي الباحة، وهو يغادر مناطق تكاثره في يونيو على الأغلب، علماً أن تحركاته اللاحقة، بما في ذلك وجهاته الشتوية، غير معروفة. **الموئل:** يتكاثر على ارتفاع دون 2,000 م (أو ربما أعلى) بشكل رئيس في المناطق الحضرية، فضلاً عن المنحدرات والوديان.

كما يربى أثناء الطيران فوق جميع أنواع الموائل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الطائرة الصغيرة، بما في ذلك النمل والنمل الأبيض (الأرضة) والذباب والبعوض والخنافس التي يلتقطها في الهواء. ويشرب عبر غمس رأسه في أي بركة أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى، وغسقى. كما يمكن أن يهاجر ليلاً، أو نهاراً. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، وغالباً ما يربى مع أنواع من طيور سمامة أخرى. وقد شوهد

ما لا يقل عن 2,000 منه في بحيرة الأصفر في أوائل فبراير عام 2018. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً في مستعمرات تضم عادة نحو 10 - 12 زوجاً (تم تسجيل 200 زوج في مستعمرة

واحدة بالرياض). **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل وعاء ضحل مصنوع من الحشائش والريش وأنواع من الحطام المحمول جواً (يتم جمع المواد أثناء الطيران ولصقها باستخدام اللعاب)، ويوجد غالباً في شق أحد الأبنية (أسفل إطار سقف ما، أو بجوار وحدة تكييف هواء، أو في جدار غير مُكتمل)، وفي الجروف كذلك. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 21 - 22 يوماً. **مدة التعشيش:** 47 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مهاجر متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10,000
منطقة النشاط: الرياض




اسمها العربي:	سمامة صغيرة
اسمها العلمي:	<i>Apus affinis</i>
اسمها الشائع:	Little Swift
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتزايد
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	12 سم / 25 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أنحاء كثيرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي الهند وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال غرب أفريقيا، وأماكن متفرقة من فلسطين ووصولاً إلى باكستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بعد 2,000 كم جنوباً ضمن نطاق إقامته. **حالته بالمملكة: مهاجر متكاثر شائع، مهاجر عابر نادر.** يُعدُّ هذا الطائر مهاجراً متكاثراً، لا سيما في جنوب جدة، مع وجود مستعمرة بعيدة في أنبوب حمصي في حرة خيبر. ويصيح وجوده محدوداً بحلول نوفمبر، رغم أن بعض تعداداته تفضل البقاء بوصفها طيوراً مقيمة على مدار السنة، وهو أيضاً، مهاجر عابر نادر، لكن واسع الانتشار. **الموئل:** توجد أعشاشه على سفوح الجبال باتجاه الأعلى (ربما فوق جبال تهامة أيضاً)، في المنحدرات الصخرية والمدن والبلدات، ويتغذى هذا الطائر أثناء التحليق فوق الأراضي الرطبة والمزارع الغنية بالحشرات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الطائرة الصغيرة، بما في ذلك الذباب والنمل والنمل الأبيض (الأرضة) والخنافس والجراد التي يلتقطها في الجو، غالباً على ارتفاعات كبيرة فوق سطح الأرض، أو منخفضة فوق صفحة الماء. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي للغاية، فقد شوهدت أسراب منه مهاجرة تتألف من 500 طائر في تهامة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات صغيرة تضم عادة أقل من 15 عشاً

(تصل في بعض الأحيان إلى 50 عشاً)، أو في صورة منفردة أحياناً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل وعاء مغلق من الحشائش والريش (يتم جمع المواد أثناء الطيران ولصقها باستخدام اللعاب)، مع فتحة ضيقة، أو مدخل نفقي قصير، يجرى تعليقه على ارتفاع أكثر من 2 م فوق سطح الأرض في الجانب الداخلي من ظلة جرف، أو سقف كهف، أو سقف أحد الأبنية. وعادة ما يتم ربط عدة أعشاش معاً ككتلة واحدة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 22 - 24 يوماً. **مدة التعشيش:** 36 - 40 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 14,000
منطقة النشاط: المسجد الحرام بمكة المكرمة



وقواق أبيض الحاجب

صليقاع
Centropus superciliosus
 White-browed Coucal
 غير مهدد
 مستقر
 غير مهدد
 مستقر
 مستقر
 36 - 42 سم / 160 - 180 غم

الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء شرق وجنوب أفريقيا، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. تم العثور على هذا الطائر المذهل في جزيرة فرسان الكبير، وجنوب تهامة باتجاه الجنوب من القنفذة. **الموئل:** يعيش دون ارتفاع 1,400 م في الغطاء النباتي الكثيف، وغالباً في البيئات الرطبة أو القريبة من المياه، بما في ذلك

أطراف أحواض القصب والشجيرات الكثيفة بالقرب من الجداول والمحاصيل الزراعية الكبيرة، مثل مزارع الموز وبساتين النخيل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**


الحشرات والعناكب والقواقع وسرطان البحر والفقاريات الصغيرة، إلى جانب بيض وفراخ الطيور الصغيرة، بمعنى أشمل؛ أي شيء

يمكنه إمساكه، أو ابتلاعه. ويقضي هذا الطائر جزءاً كبيراً من وقته في التخفي تحت أي غطاء بحثاً عن فرائسه. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يربى منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً.

الأدوار الأبوية: يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضان البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل قبة غير مرتبة من الأعشاب والأغصان الجافة مع مدخل بالقرب من الأعلى وتكون مبطنة بعشب ناعم وأوراق خضراء. يتم بناؤه على ارتفاع 1 - 3 م فوق سطح الأرض (0 - 22 م في أفريقيا) في غطاء كثيف لشجرة أو شجيرة. **البيض**

المحضون: 4 بيوض. **الحضانة:** 14 - 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 18 - 20 يوماً. **الحضانة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية. **ملاحظة:** تشتهر فراخ وقواق أبيض الحاجب بسرعة فزارها من أعشاشها إذا ما تم الاقتراب منها كثيراً، أو لمدة طويلة. وفي حال حدوث ذلك، فإنها تموت.

فإنها تموت.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,000

منطقة النشاط: محمية ريدة

**سمامة شائعة**

الاسم العربي:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 غير مهدد
 مستقر
 غير مهدد
 مستقر
 16 - 18 سم / 31 - 52 غم

الاسم العربي:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر عبر شمال أفريقيا، وفي جميع أنحاء غرب أوروبا وصولاً إلى سيبيريا وشمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 - 11,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي نادر. وعند الأخذ بالاعتبار توزيعه العالمي، فإنه من المرجح مرور نسبة كبيرة من تعداده العالمي عبر المملكة العربية السعودية في كل عام، علماً أن أعداداً كبيرة منه تهاجر عبر المملكة على نطاق واسع (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر)، مع تسجيل أسراب تضم المئات في الربيع، وإن كانت أقل في فصل الخريف. وتشير التسجيلات المنتظمة في تهامة (جنوب جدة) إلى أن بعضها قد يقضي الشتاء (ديسمبر - فبراير) في الجنوب الغربي. **الموئل:** جوي بالكامل، ويمكن العثور عليه أينما توافرت الحشرات الطائرة، مثل الأراضي الرطبة والمزارع والمدن والبلدات. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على الحشرات الطائرة الصغيرة التي يلتقطها في الهواء، وعدد قليل من العناكب. أثناء موسم الهجرة، لا يهبط أبداً إلى الأرض أو يجثم، حتى يبدو وكأنه لا يجد الراحة أبداً. إذ


يُحكّم سيطرته الكاملة على وجوده في الجو بواسطة جناحيه، عبر الرفرفة القوية والسريعة والانزلاق، والاستدارة والغوص والتوقف المفاجئ، وحتى المماطلة التي يتحكم بها فيما يطارد فرائسه من الحشرات. فقد تجده على ارتفاع 100 م في الهواء، وبعد لحظات تجده على ارتفاع متر واحد فوق المروج، ويشرب

أيضاً أثناء الطيران عن طريق غمس رأسه في المياه المفتوحة. **النشاط:** نهاري وليلي. ويمكن أن يهاجر ليلاً أو نهاراً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُوجد في مجموعات صغيرة مهاجرة، رغم أنها تصل في بعض الأحيان إلى المئات، وربما مئات الآلاف. **سلوك التكاثر:**

لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عند مراقبة هذا الطائر سريع الحركة، سرعان ما ستدرك مدى تحكمه الكامل في بيئته الجوية بينما يتجول في السماء بسهولة مطلقة.

لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عند مراقبة هذا الطائر سريع الحركة، سرعان ما ستدرك مدى تحكمه الكامل في بيئته الجوية بينما يتجول في السماء بسهولة مطلقة.

لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عند مراقبة هذا الطائر سريع الحركة، سرعان ما ستدرك مدى تحكمه الكامل في بيئته الجوية بينما يتجول في السماء بسهولة مطلقة.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

وقواق أرقط كبير*Clamator glandarius*

Great Spotted Cuckoo

غير مهدد

مستقر

شبه مهدد

غير معروف

35 - 39 سم / 124 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه جنوبي الصحراء الكبرى وفي شرق أفريقيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب أفريقيا، ومن جنوب أوروبا باتجاه الشرق نحو العراق، وجنوباً إلى فلسطين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم في أفريقيا الاستوائية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، مهاجر متكاثر محتمل. يُحتمل أن يمر تعداد صغير من هذا الطائر الذي يتكاثر في العراق عبر المملكة العربية السعودية

في موسم هجرته، لا سيما في فصل الربيع. كما سُجّل عبوره في المناطق الغربية غالباً، وذلك من تهامة شمالاً وصولاً إلى تبوك. وقد سبق لهذا الطائر التطفل على أعشاش غراب دوري في خليج العقبة عند رأس البحر الأحمر بالقرب من حدود المملكة، لذلك فإنه من الممكن أن يتكاثر في الشمال الغربي، وعلى سفوح عسير (غير مؤكد). **الموئل:** في الغابات المفتوحة، وشجيرات الطلح والأثل المتناثرة، والتلال ذات الغطاء



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لم يُسجّل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: أراضي الأشجار الساحلية بجدة

على الرغم من أن تكاثره في

المملكة لم يتأكد حتى الآن،

إلا أن الوقواق المرقط الكبير

يستطيع إلقاء بيوضه في

أعشاش طيور العقعق والغربان

في المنطقة الغربية.

الشجيري، مثل سفوح الجبال الجنوبية الغربية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً ما يقتات فوق سطح الأرض، وفي الأدغال أيضاً، وهو يتغذى على اليرقات، خاصة الأنواع المستعمرة، فضلاً عن

مجموعة متنوعة من النمل الأبيض (الأرضة) والنمل والجنادب والخنافس وعدد قليل من السحالي، ومن المعروف عنه أيضاً، أنه يلتقط الحشرات الطائرة في الجو. **النشاط:** نهارى، ويمكن أن يهاجر ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** يمكن أن يكون اجتماعياً أثناء موسم هجرته، غير أنه لم تُسجّل في المملكة سوى طيور منفردة. **سلوك التكاثر:** لم يُسجّل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** يجيد هذا الوقواق

الاختفاء في الأدغال الحرجية، ثم يتسلل عبر أوراق الشجر بدلاً من الطيران، ما يقوّض إمكانية الحصول على رؤية جيدة له. وعندما يجثم، فإنه غالباً ما يجعل أجنحته مفتوحة جزئياً مع تدليتها.

الوقواق الرزين

وقواق أبقع

Clamator jacobinus

Jacobin Cuckoo

غير مهدد

مستقر

-

-

34 سم / 66 - 72 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وجنوب إيران، ومن الهند حتى ميانمار، في حين يقضي معظم فصل الشتاء حول خط الاستواء في أفريقيا، أو جنوب الهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر جداً. يصل عدد صغير من هذا الطائر الأبيض بلونه الأسود اللامع في الصيف للتكاثر في جنوب تهامة، قبل العودة إلى أفريقيا عبر البحر الأحمر لقضاء فصل الشتاء. **الموئل:** دون ارتفاع

1000 م في الوديان الجافة شديدة الانحدار ذات الشجيرات والأشجار المتناثرة في سفوح التلال، أو شجيرات الطلح في تهامة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات، خاصة اليرقات المشعرة والجنادب والنمل الأبيض (الأرضة) والقوقاع، وثمار التوت التي يلتقطها من الأشجار والشجيرات وفوق الأرض أيضاً. وفي بعض الأحيان يأكل بيض الطيور المضيفة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يربى منفرداً،

أو في مجموعات صغيرة تتألف من ستة طيور كحد أقصى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أعشاش طيور البلبيل أو الثرثرة التي تربي بدورها فرخ الوقواق كما لو كان أحد فراخها.

أو في مجموعات صغيرة تتألف من ستة طيور كحد أقصى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أعشاش طيور البلبيل أو الثرثرة التي تربي بدورها فرخ الوقواق كما لو كان أحد فراخها.

البيض فرادي في نحو 25 من أعشاش طيور البلبيل والثرثرة، وغيرها من الجوائم التي تقوم بحضن بيضة الوقواق مع بيوضها بعد وقوعها فريسة لخداع أنثى الوقواق. بعد ذلك، يعتمد فرخ الوقواق إما إخراج بيض المضيف من العش، أو احتكار الطعام لنفسه بكل بساطة. علماً أن بيض الوقواق ضخم نسبياً (ضعف حجم بيض البلبيل)، ويتميز بقشر سميك، ما يحول دون قدرة المضيف على إخراج بيضة الوقواق، أو حتى تدميرها. **الأدوار الأبوية:** لا يُوجد. **العش:** لا يُوجد. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 11 - 12 يوماً. **مدة التعشيش:** 17 - 18 يوماً. **الحضنة:** حتى 25 في الموسم الواحد.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ 100

منطقة النشاط: بحيرات الصرف الصحي بصبياء



وقواق أخضر الظهر*Chrysococcyx caprius*

Diederik Cuckoo

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

19 سم / 32 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أفريقيا حول خط الاستواء، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع تعدادات منعزلة في جنوب شبه الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان وغرب اليمن). بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم داخل نطاق إقامته في أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر جداً. تهاجر هذه الجواهر المتلاثة عبر البحر الأحمر للتكاثر في المرتفعات الواقعة جنوب الطائف. **الموئل:** يوجد فوق 1,500 م في الغابات المفتوحة، والأراضي شبه القاحلة التي تكثر بها أشجار الطلع والسافانا والأشجار الشوكية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات، خاصة اليرقات، فضلاً عن الجراد والنمل الأبيض (الأرضة)

تضع أنثى هذا الطائر البديع


الذي يزور المملكة في

الصيف، بيوضها في أعشاش

طيور النساج والعصافير قبل

أن يعود إلى أفريقيا لقضاء

فصل الشتاء.

والخنافس، والفراشات التي يلتقطها عادةً من ظلة الأشجار أو على الأرض. وأحياناً يأكل بيض الطيور المضيفة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يربى بشكل منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: متطفل، حيثتضع الأنثى بيوضها فرادى في نحو 25 عشاً من أعشاش الطيور الأخرى، لا سيما النساج والعصافير. وعادةً ما تفقس بيضة الوقواق بسرعة أكبر من بيض المضيف، ما يسمح للوقواق الصغير بالتخلص بسرعة من البيض المتبقي أو الفراخ. وغالباً ما يقوم المضيفان بتربية الوقواق الصغير عن غير قصد، وهو ينمو بسرعة ليصبح أكبر من المضيف الحاضر. **الأدوار الأبوية:** لا يُوجد. **العش:** لا يُوجد. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 12 يوماً. **مدة التعشيش:** 19 - 21 يوماً. **الحضانة:** حتى 25 في الموسم الواحد.

مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100

منطقة النشاط: تنومة

ديسمبر نوفمبر أكتوبر

سبتمبر أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

مارس فبراير

يناير

وقواق الكلاسي*Chrysococcyx klaas*

Klaas's Cuckoo

غير مهدد

مستقر

شبه مهدد

غير معروف

18 سم / 26 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أنحاء كثيرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب أفريقيا ومنطقة الساحل وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم داخل نطاق إقامته في أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر جداً. تم العثور على هذا الطائر الجميل المذهل في الجنوب الغربي وإلى الجنوب من محيط المجاردة، وهو يمر عبر البحر الأحمر خلال هجرته. **الموئل:** يوجد على ارتفاع يراوح بين 1,300 - 1,500 م في سفوح المرتفعات الجنوبية الغربية في الأراضي الحرجية، وغيرها من المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف. وربما يوجد أيضاً في سهول تهامة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات، خاصة اليرقات، فضلاً عن الفراشات والنمل الأبيض (الأرضة) والخنافس والجنادب

والصغيرة التي يلتقطها من أوراق الشجر، أو بعد مطاردة جوية في أحيان قليلة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** إلى جانب تميزه بخصوصيته، فإنه غالباً ما يربى بشكل منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام

تضع أنثى هذا الطائر خلصة

نحو 24 بيضة سنوياً

في أعشاش الطيور المغرّدة

الصغيرة التي تقوم

بعد ذلك إما بطرد فراخ

الوقواق، أو تربيتها.

التزاوج: طفيلي الحضانة، ومن المحتمل أن تكون الإناث فوضوية وتحب الاختلاط، مع روابط زوجية قصيرة. كما تعتمد الأنثى على إزالة بيضة واحدة من عش المضيف (خاصة طيور الدخلة والتّمير)، لتضع بيضة خاصة بها. علمياً أنها تضع نحو 24 بيضة في الموسم الواحد. في جميع الأحوال تفقس بيضة الوقواق عادة في وقت أبكر من بيض المضيف، ما يسمح للوقواق الصغير بالتخلص من البيض المتبقي أو الفراخ بسرعة. **الأدوار الأبوية:** لا يُوجد. **العش:** لا يُوجد. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 11 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 19 - 21 يوماً. **الحضانة:** حتى 25 في الموسم الواحد.

مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100

منطقة النشاط: أباها

ديسمبر نوفمبر أكتوبر

سبتمبر أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

أبريل


مارس فبراير

يناير

مرعة الماء	الاسم العربي:
<i>Rallus aquaticus</i>	الاسم العلمي:
Western Water Rail	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهديد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
25 - 28 سم / الذكر 88 - 190 غم؛ الأنثى 74 - 138 غم (أخف وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة من هذا الطائر في منطقة غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى الصين، مع وجود تعدادات قليلة تتكاثر في شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر ابتداءً من شرق أوروبا حتى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوب النيل، مروراً بشمال شبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى إيران والهند. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر جداً، زائر شتوي غير شائع. يتكاثر هذا الطائر الجذاب طويل الساق في المنطقة الشرقية من المملكة، وقريباً من تبوك، في حين يتجه شمالاً وعلى امتداد ساحل الخليج العربي ليقضي فصل الشتاء. **الموئل:** الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، أو قليلة الملوحة (عادةً ما تكون منشأة اصطناعية)، حيث الغطاء الكثيف من القصب والنباتات المائية الأخرى. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الديدان والعلق والرخويات والقشريات والعناكب والحشرات والفقاريات الصغيرة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المواد النباتية التي يلتقطها من الأراضي الجافة، أو الموحلة القريبة من الماء، سواءً من خلال القفز لالتقاط الحشرات من النباتات، أو عن طريق الخوض في المياه الضحلة. **النشاط:**



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 80
منطقة النشاط: الأراضي الرطبة في بقيق




وقواق شائع	الاسم العربي:
<i>Cuculus canorus</i>	الاسم العلمي:
Common Cuckoo	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
شبه مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
32 - 33 سم / 115 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء البر الأوراسي، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 - 12,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما يفضل تعداد قليل منه قضاء الشتاء في سريلانكا وجنوب

شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. يُعد هذا الوقواق مخطط الصدر مهاجراً عابراً واسع النطاق، وذلك في ظل سجل مشاهداته الحافل في كل جزء من أراضي المملكة، علماً أن وجوده يشيع في فصل الربيع، ومع ذلك، فإنه نادراً ما تتم رؤيته رغم أعداده الكبيرة التي يُفترض أنها تمر عبر المملكة. **الموئل:** يمكن أن يوجد في أي مكان على طول طريق الهجرة، ولكن يكثر وجوده في المواقع ذات الأشجار والشجيرات، بما في ذلك حدائق الزينة والمناطق المرورية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على اليرقات، إلى جانب اليعسوب والجنادب والخنافس والعناكب. كما يتغذى على بيض وفراخ الطيور الصغيرة والضفادع الصغيرة والعجوجم. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً بشكل أساسي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر جحول إلى حد ما، ويفضل البقاء متخفياً في الغطاء النباتي، وهو بمنقاره المنحني لأسفل وجناحيه المدببين وحركة جناحيه السريعة أشبه بالصقر، حتى إن ألوانه السطحية تشبه بعض الصقور. عديد من الطيور الصغيرة تعامله بوصفه كائناً مفترساً محتملاً، وتفر منه حالما تكتشف وجوده. مع العلم أنه يظهر في بعض الأحيان برفقة البوم الصيَّام الشرقي الذي من المرجح أنه يمر عبر المملكة من حين لآخر.

شروق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. يُعد هذا الوقواق مخطط الصدر مهاجراً عابراً واسع النطاق، وذلك في ظل سجل مشاهداته الحافل في كل جزء من أراضي المملكة، علماً أن وجوده يشيع في فصل الربيع، ومع ذلك، فإنه نادراً ما تتم رؤيته رغم أعداده الكبيرة التي يُفترض أنها تمر عبر المملكة. **الموئل:** يمكن أن يوجد في أي مكان على طول طريق الهجرة، ولكن يكثر وجوده في المواقع ذات الأشجار والشجيرات، بما في ذلك حدائق الزينة والمناطق المرورية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على اليرقات، إلى جانب اليعسوب والجنادب والخنافس والعناكب. كما يتغذى على بيض وفراخ الطيور الصغيرة والضفادع الصغيرة والعجوجم. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً بشكل أساسي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر جحول إلى حد ما، ويفضل البقاء متخفياً في الغطاء النباتي، وهو بمنقاره المنحني لأسفل وجناحيه المدببين وحركة جناحيه السريعة أشبه بالصقر، حتى إن ألوانه السطحية تشبه بعض الصقور. عديد من الطيور الصغيرة تعامله بوصفه كائناً مفترساً محتملاً، وتفر منه حالما تكتشف وجوده. مع العلم أنه يظهر في بعض الأحيان برفقة البوم الصيَّام الشرقي الذي من المرجح أنه يمر عبر المملكة من حين لآخر.




مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر
منطقة النشاط: محمية الثمامة



اسم العربي:	سلوى
اسم العربي الآخر:	مرعة رقطاع
اسم العلمي:	<i>Porzana porzana</i>
اسم الشائع:	Spotted Crane
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	22 - 24 سم / 57 - 147 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا وصولاً إلى منغوليا، وجنوباً حتى شمال غرب إيران، مع وجود القليل من الأزواج المعشّشة في شمال شرق شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال الهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر. ينتشر هذا النوع من الطيور على نطاق واسع في شتى أنحاء المملكة أثناء الهجرة (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، مع وجود أعداد قليلة منه لقضاء فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير)، لا سيما في المنطقتين الشمالية والوسطى. وأدت الزيادة في الأراضي الرطبة الاصطناعية بالمملكة خلال العقود الماضية إلى تكاثر عدد قليل من الأزواج بين الفينة والأخرى، خاصة في المنطقة الشرقية، وربما بالقرب من الرياض. **الموائل:** يتكاثر في الأراضي الرطبة الشاسعة والضحلة وفيرة الخضرة والغنية بأحواض القصب، فضلاً عن المستنقعات الموحلة والعشبية المكشوفة، كما يزور قنوات الصرف والبرك الصغيرة التي تنطوي على شجيرات نامية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات المائية الصغيرة، والنباتات المائية الملتقطة من المياه الضحلة جداً، أو الوحل. **النشاط:** نهارى، وشفقي، إذ ينشط في الصباح المبكر وبقيل الغروب. ومع ذلك، يمكنه الصيام طوال الليل. **السلوك الاجتماعي:**



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي الأزواج المتكاثر سنوياً: 5 منطقة النشاط: الجبيل




اسم العربي:	مرعة الحقل
اسم العلمي:	<i>Crex crex</i>
اسم الشائع:	Corncrake
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	27 - 30 سم / 129 - 210 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر من غرب أوروبا حتى غرب سيبيريا، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 8,000 - 12,000 كم في الجنوب والجنوب الغربي من جنوب غرب أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. يُعدُّ هذا الطائر الجميل

خريفى اللون أحد الطيور النادرة المهاجرة العابرة في شتى أنحاء المملكة. ولم يوثق وجوده سوى في شمال جدة والطائف. ولكونه يهاجر على ارتفاعات منخفضة، فإنه وبفضل الطريق الشمالي الذي يتخذه في مروره عبر المملكة، فإنه يتجنب الطيران عبر المرتفعات الجنوبية الغربية. **الموائل:** أي بيئة زراعية غنية بالنباتات، بما في ذلك حقول المحاصيل الزراعية والأعلاف وأطراف المستنقعات، علماً أنه يتجنب الأراضي الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، مثل الديدان والرخويات

والعناكب والحشرات (كاليعسوب، والخنافس، والجراد)، إلى جانب البذور والحبوب. يفضل الرعي فوق الأرض، وقد يقلب في النباتات المتناثرة بحثاً عن الطعام. **النشاط:** نهارى، مع أنه أحياناً ما يصيح طوال الليل أثناء موسم التكاثر، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد بوجه عام، في ظل وجود توثيق واحد استثنائي لما يقرب من 30 طائراً ضمن مجموعة متفرقة في حقول الأعلاف في حرض خلال سبتمبر. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** على الرغم من أن هذا الطائر غير خجول، لكنه يوجد منفرداً، ويميل للاختباء في غطاء من النباتات الكثيفة، وبالتالي يتم تجاهله. وعندما يطير يبدو ثقيلاً وفهقاً إلى حد ما مع ساقيين مُتدلّية، لكنه قادر على الطيران القوي والمباشر أثناء الهجرة، وإن كان على ارتفاعات منخفضة. **باغ الجناح:** 42 - 53 سم.



مهاجر عابر الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة منطقة النشاط: حرض



مرعة بيلونية*Zapornia pusilla*

Baillon's Crake

غير مهدد

غير معروف

17 - 19 سم / 17 - 55 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة منه في كل من جنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في أوراسيا من غرب أوروبا وصولاً إلى الصين، بينما تقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في أفريقيا، والهند وجنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، تشير الحالات الموثقة النادرة في المملكة لهذا الطائر صاحب الألوان الزاهية إلى أنه نادر ومهاجر عابر على نطاق واسع. كما تمتد

تحركاته لفترات طويلة. **الموئل:** يفضل الأراضي الرطبة الغنية بالغطية النباتية الكثيفة، مثل أحواض القصب الكثيفة والبرك الساحلية ذات المياه المالحة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: مجموعة متنوعة من اللافقاريات المائية البالغة وبقاها، بما في ذلك الديدان والقشريات والرخويات، والحشرات. إضافة إلى الأسماك الصغيرة وبعض البذور، علماً أنه يسير الوحل عند البحث عن الغذاء، ويفتش بمنقاره عبر السطح ليلتقط ما يمكنه

يتبع هذا الطائر المائي

الصغير استراتيجياً معقدة


ومرنة خلال موسم هجرته، إذ

تهاجر أعداد كبيرة منه على

غير المعتاد إلى مناطق نائية

في سنوات معينة.

بالقرب من أي غطاء كثيف، أو داخله. **النشاط:** شفقي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد في العادة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يفضل هذا الطائر الصغير المتهور البقاء متخفياً، لكنه أحياناً يظهر للعيان فيما يسير عبر رقعة صغيرة من الوحل، أو النباتات العائمة بين القصب. **باج الجناح:** 33 - 37 سم.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران

**مرعة صغيرة***Zapornia parva*

Little Crake

غير مهدد

مستقر

18 - 20 سم / 30 - 72 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر ابتداءً في وسط وجنوب أوروبا وصولاً إلى كازاخستان، مع وجود تعداد بسيط منه في شمال شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً من الكويت حتى باكستان، وعلى نحو غير مستقر في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر ونادر جداً، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد هذا الطائر الخاطف للأنظار في شتى أنحاء المملكة أثناء الهجرة وطوال الشتاء. وقد أدى إنشاء الأراضي الرطبة الاصطناعية إلى تكاثر بعضها في المملكة على مدار الصيف، فيما تم توثيق أول عش لها في عام 1989 بمنطقة تبوك، علماً أنها تعيش حالياً في الشمال بشكل رئيس، وربما في المنطقة الشرقية أيضاً. **الموئل:** الأراضي الرطبة الاصطناعية ذات المياه الراكدة أو بطيئة الجريان، وعلى رأسها برك مياه الصرف المعالجة ذات أحواض القصب الكثيفة، والنباتات الكثيفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بصفة رئيسية على الحشرات واللافقاريات الأخرى، والبيذور وبراعم النباتات المائية التي يلتقطها من المياه أثناء السباحة، أو الخوض في المياه، أو تلك في الوحل. **النشاط:** نهارى وشفقي. ويكون أكثر نشاطاً عند الفجر والغسق. **السلوك الاجتماعي:**

عادةً ما يربى منفرداً، ورغم ذلك تم توثيق وجوده بأعداد كبيرة في حقول الأعشاب المروية خلال موسم الهجرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج موسمياً (مع انفصال الزوجين بعد التكاثر). الأدوار الأبوية: تبني الأنثى العش، ويتشارك الأبوان في الحضنة ورعاية الصغار. **العش:** على شكل وعاء ضحل يتكون من سيقان وأوراق شجر الأسل أو نبات البردى، ومبطن بمواد نباتية دقيقة مع وجود سيقان نامية مقلتلة للتمويه. يبني العش فوق المياه بين النباتات الكثيفة، أو أسفل عيدان القصب، أو فوق حزمة من الأعشاب النامية. **حجم الحضنة:** 7 - 9 بيوض. **الحضنة:** 23 يوماً. **الفرخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير في سن 45 - 50 يوماً. **الحضنة:** مزدوجة الحضنات. **باج الجناح:** 34 - 39 سم.

مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي الأزواج المتكاثرة سنوياً: 30 منطقة النشاط: سبخة الفصل




دجاجة الماء	الاسم العربي:
فرفر شائع	الاسم العربي الآخر:
<i>Gallinula chloropus</i>	الاسم العلمي:
Common Moorhen	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
30 - 38 سم / الذكر 249 - 493 غم؛ الأنثى 192 - 343 غم (أخف وزناً بنسبة 30%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة من هذا الطائر في معظم أنحاء أفريقيا وغرب أوروبا والشرق الأوسط، ومن أفغانستان وصولاً إلى اليابان واندونيسيا. كما توجد تجمعات منعزلة منه في شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة منه فتتكاثر من شرق أوروبا حتى اليابان، وتقضي الشتاء على بُعد 2,000 كم إلى الجنوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع.** لكونه ينتفع من الأراضي الرطبة الاصطناعية، فقد تم توثيق رؤيته غالباً حول الرياض وتبوك والمنطقة الشرقية. **الموئل:** الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة الدائمة، وأماكن توافر القصب والنباتات الكثيفة، وأحياناً في المواقع ذات المياه المالحة. **سلوك البحث عن الغذاء:**

النظام الغذائي: النباتات المائية وشبه المائية والطحالب واللافقاريات والأسماك الصغيرة التي يلتقطها أثناء السباحة، أو السير فوق النباتات العائمة وغطس الرأس والانقلاب رأساً على عقب والرعي. **النشاط:** نهارى، وليلي جزئياً (لا سيما الليالي المقمرة). **السلوك الاجتماعي:** أزواج، أو أسراب عائلية، أو جماعات أكبر في أي موئل جيد، وقد تم توثيق المئات من هذا النوع في سبخة الفصل ونهر الرياض (مجرى وادي الحائر). **سلوك**



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,000
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)





سحنون	الاسم العربي:
فرفر أرجواني	الاسم العربي الآخر:
<i>Porphyrio porphyrio</i>	الاسم العلمي:
Purple Swamphen	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
38 - 50 سم / 520 - 1,000 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يُوجد هذا الطائر على نطاقٍ واسع في شتى أنحاء جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، وامتداداً من الهند حتى أستراليا. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر ونادر جداً.** تم توثيق وجود هذا الطائر للمرة الأولى في المملكة عام 1983، وانتشر تدريجياً في أنحاء الأراضي الرطبة في المنطقة الشرقية. ويُوجد نوعان فرعيان منه، أزرق ورمادي الرأس، رغم أن الأخير *P. p. poliocephalus* نوعاً مستقلاً. **الموئل:** الأراضي الرطبة ذات المياه

العذبة، أو قليلة الملوحة، عادةً بها أحواض من القصب وبعض المياه المكشوفة، أو أطراف من القصب المرتفع الكثيف المكسو بالأعشاب. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: المواد النباتية المائية أو شبه المائية، إلى جانب الفقاريات واللافقاريات صغيرة أحياناً، إذ تم رصد أسماك ميتة في سبخة الفصل. وعادةً ما يريعى هذا الطائر عند أطراف الغطاء النباتي، أو بالقرب منها، كما يتسلق القصب أحياناً للبحث عن البراعم،

رغم أنه يمكن رؤيته أيضاً في المراعي والأعشاب المجزوة. **النشاط:** نهارى وشفقي، وينشط جزئياً في الليل. **السلوك الاجتماعي:** يريعى منفرداً، أو في أزواج مع الفراخ. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: معقد؛ فهي طيور مناطقية، بعضها يشكل أزواجاً متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، والبعض الآخر يعيش بشكل جماعي مع طيور مساعدة غير متكاثرة، وأحياناً ما تقوم بمشاركة الشريك مع إناثٍ متعددة تستخدم عشاً واحداً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار، وتقوم الأنثى بمعظم دور الحضنة. **العش:** على شكل وعاء مكون من سيقان وأوراق نباتات مائية، وغالباً ما يوجد به منحدر ملطخ بالوحل نتيجة لتسلق الطيور البالغة من الماء إلى العش، مع وجود سيقان قريبة للتمويه، ويكون العش موضوعاً عند أسفل عيدان القصب، أو فوق حزمة من الأعشاب النامية، أو في أحيان أخرى فوق أرض جافة. **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض. **الحضنة:** 23 - 25 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بيومين اثنين، وتطير في سن 60 يوماً تقريباً. **الحضنة:** ثنائي الحضنة أحياناً. **باع الجناح:** 90 - 100 سم.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40
منطقة النشاط: سبخة الفصل

الرهو

Anthropoides virgo
Demoiselle Crane

غير مهدد

يتزايد

–

–

90 - 100 سم / 2,000 - 3,000 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر في السهوب امتداداً من أوكرانيا حتى شمال شرق الصين، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم في الجنوب والجنوب الغربي من أفريقيا (تشاد إلى إثيوبيا) والهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع.

يُعدُّ طائر الرهو الكبير جداً وبالوان ريشه المتناسقة، نادراً أو غير شائع عموماً، وهو مهاجر عابر للمملكة، مع إمكانية أن يكون شائعاً محلياً، لا سيما في أواخر مارس. ويتبع المئات منه مساراً مميزاً خلال موسم الهجرة، وذلك من خلال التحليق عبر البحر الأحمر إلى جدة، ثم

ينتقل شمالاً فوق حائل ليصل إلى الموصل (في العراق)، ومنها إلى آسيا الوسطى. وفي الخريف يتخذ مساراً مختلفاً، إذ لم يوثق سوى القليل منه في المملكة. **الموئل:** الصحراء الجرداء والمحاصيل المروية وحقول القش وحواف الأراضي الرطبة، حيث يتسنى له التقاط البذور واللافقاريات، إلى جانب أخذ قسط من الراحة قبل أن استئناف هجرته في اليوم التالي. **سلوك البحث عن الغذاء:**

النظام الغذائي: البذور والحبوب والمواد النباتية الأخرى، بما في ذلك المحاصيل. إضافةً إلى اللافقاريات والفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع والسحالي، علماً أنه يتغذى عبر السير ببطء في الأراضي العشبية. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يتكاثر هذا الطائر الرقيق والجميل في أزواج منفردة، وقد يكون اجتماعياً في موسم الهجرة وفصل الشتاء، وغالباً ما يشكّل أسراباً تضم مئات الطيور. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتمتع بصوت شبيه بصوت البوق يميزه خلال موسم الهجرة الذي يكشف غالباً عن وجوده في تشكيل على شكل حرف V، حتى عندما يطير على ارتفاعات عالية للغاية. **باع الجناح:** 150 - 170 سم.

تهاجر أسراب الرهو في تشكيلات على شكل حرف V في سماء المملكة محدثة جلبة وصخباً بأصواتها، وتعتبر البحر الأحمر حول جدة، ثم تنتقل شمالاً فوق حائل حتى تصل إلى الموصل، ومنها إلى آسيا الوسطى.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: كورنيش جدة

**غراء أوراسية**

Fulica atra

Common Coot

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

36-39 سم / 610-1,200 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم من هذا الطائر بشكل رئيس في شمال أفريقيا وغرب أوروبا وإيران، وصولاً إلى الهند وأستراليا، مع انتشار تعداد منه في أنحاء الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، في حين يتكاثر التعداد المهاجر من شرق أوروبا حتى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. ينتشر هذا الطائر المدهش، صاحب القدمين الكبيرتين، على نطاق واسع في أنحاء المملكة طوال فصل الشتاء (أكتوبر - مارس)، بينما تتكاثر الطيور المقيمة على مدار العام في مواقع متفرقة من أرجاء المملكة. **الموئل:** مواقع المياه العذبة المكشوفة المحاطة بالنباتات المائية الكثيفة، وقد يظهر في أي مكان خلال موسم الهجرة، بما في ذلك جزر الخليج العربي والبرك الموجودة في تهامة وخزانات المرتفعات، وحتى الصحارى القاحلة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً النباتات المائية، إلى جانب القليل من الفقاريات واللافقاريات الصغيرة، والنباتات الأرضية التي يلتقطها عبر مجموعة متنوعة من أساليب الرعي. **النشاط:** نهارى،

وليلي جزئياً (أحياناً يرعى في الليالي المقمرة). **السلوك الاجتماعي:** في أسراب شتاءً، وعادةً ما يُوجد في جماعات يقل عددها عن 10 طيور، علماً أنه تم توثيق أسراب تضم نحو 500 طائر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وفي أسراب غالباً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كل من الأبوين في بناء العش والحضانة والاعتناء بالصغار والدفاع بصرامة عن منطقة سيادتهما. **العش:** على شكل وعاء كبير يُبنى من أوراق النباتات وسيقانها بين النباتات المائية، أو أنه جاهز، حيث تكون قاعدته في المياه الضحلة، أو في أحيان قليلة في موقع مكشوف. **البيض المحضون:** 6 - 10 بيوض. **الحضانة:** 21 - 26 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش وتسبح مع الأبوين بعد مرور ما يراوح بين 3 إلى 4 أيام، وتطير في سن 55 - 60 يوماً. **الحضنة:** ثنائي الحضنات. **باع الجناح:** 70 - 80 سم.

تُعدُّ كل من طيور غراء أوراسية ودجاجة الماء التي يتميز جبينها ببقع أكبر حجماً وأكثر سماكة وإشراقاً، أكثر صحة وأقوى مناعة.

مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200
منطقة النشاط: سبخة الفصل



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200
منطقة النشاط: سبخة الفصل



حبارى شرقية*Chlamydotis macqueenii*

Asian Houbara

معرض للانقراض

يتناقص

مهدد بالانقراض بشكل حرج

يتناقص بوتيرة كبيرة

55 - 75 سم / الذكر 1,800 - 3,200 جم؛ الأنثى 1,200 - 1,700 جم (أخف وزناً بنسبة 40%)

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يوجد التعداد المقيم منه في شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية وبالاتجاه شمالاً وصولاً إلى باكستان وطاجكستان، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في بحر قزوين حتى شمال الصين، ويوجد شتاءً على بُعد 2,500 كم في الجنوب والجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى الهند، قاطعاً 270 كم يومياً. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر جداً، **زائر شتوي نادر.** الموئل: الوديان الرملية الضحلة، والمنخفضات في محمية الملك سلمان (حرة الحرة). وقد جرت عمليات إعادة توطين في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز (محاذاة الصيد). **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: المواد النباتية، واللافقاريات (الجراد والجنادب والخنافس)، وربما الثعابين والسحالي الصغيرة التي يجدها فوق سطح الأرض، أو بالقرب منه. يُذكر أن هذا الطائر لا يشرب. كما تبين من بعض الطيور التي تم تعقبها لاسلكياً أنها تطوف 60 كم في اليوم الواحد بحثاً عن الطعام. **النشاط:** شفقي، ونهاري وليلي جزئياً (أحياناً يري في الليالي المقمرة). **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: ميدان مغازلة جماعي، حيث تتجمع الذكور بشكل طليق في مواقع استعراض تقليدية، ويدافع كل ذكر عن منطقة سيادة صغيرة، بينما تختار الإناث ذكراً للتزاوج، ثم تغادر لبناء عش في منطقة قريبة، دون أن يكون موجوداً بالضرورة في منطقة سيادة الذكر. وقد تحتوي الحضنة على فراخ من نسل ذكور عدة مختلفة.

تعرضت طيور الحبارى المعروفة للتناقص بوتيرة حادة في شبه الجزيرة العربية، وذلك بسبب الإفراط في صيدها، وفي محاولة لمعالجة ذلك، يُطبق الآن برنامج الإكثار بالأسر في محاولة لاستعادة تعداد هذا النوع.

الأدوار الأبوية: تبني الأنثى العش وتحضن البيض وتعتني بالصغار. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة في أرض مكشوفة، وغالباً ما تكو بالقرب من شجيرة قصيرة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضنة:** 23 - 24 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير في سن 35 يوماً تقريباً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **حالة الحماية:** كان هذا الطائر قبل عام 1930، منتشرراً ومقيماً شائعاً وزائراً شتوياً، غير أنه شهد تناقصاً حاداً لسبب رئيس، وهو الإفراط في صيده، وتعمل برامج إعادة التوطين في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل دؤوب لعكس مسار منحى التناقص المأساوي.



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 30

منطقة النشاط: محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز (محاذاة الصيد)

**كركي شائع***Grus grus*

Common Crane

غير مهدد

يتزايد

-

-

115 سم / 4,500 - 6,100 جم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة منه في تركيا، أما التعدادات المهاجرة فتوجد في شمال أوراسيا (جنوب الدائرة القطبية الشمالية)، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 4,000 كم جنوباً في غرب البحر الأبيض المتوسط، ووادي النيل والعراق والهند وجنوب شرق الصين، وقد تقضي بعض أفراد الشتاء في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، **زائر شتوي نادر.** يوجد هذا الطائر الضخم بصفة دورية في المملكة بوصفه مهاجراً عابراً (مارس، سبتمبر)، وأحد الطيور الشتوية (نوفمبر - فبراير)، على الرغم من بعض التوثيق له هنا وهناك خلال فصلي الربيع والخريف التي تُثبت وجوده في جدة وتعامه والرياض، وحرص. **الموئل:** الأراضي الرطبة الاصطناعية، أو المناطق

يُعَدُّ هذا الطائر أحد أكبر الطيور المهاجرة في المملكة، فعندما يقف يزيد طوله على متر واحد، بينما يصل وزنه إلى 6 كغم، وطول جناحه إلى 2 م.

المزروعة بالبقوليات والحبوب. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غالباً المواد النباتية، مثل الحبوب والجزور والبيذور والتوت والثمار والخضراوات، ولكنه يقطن أيضاً على اللافقاريات والفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع والثعابين والسحالي والأسماك والقوارض التي يلتقطها أثناء السير عبر التنقيب بمنقاره وسير النباتات والأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد في موسم التكاثر، وفي أسراب خلال فصل الشتاء وموسم الهجرة، علماً أنه لم يتم التعرف بشكل قاطع إلى أي أسراب كبيرة منه، لذا تم توثيق وجوده في كل مكان بالمملكة وفي أقصى الجنوب الغربي فقط في فصل الشتاء. كما شوهدت أسراب تتألف من 40 - 50 طائراً في بحيرة ملاكي وبالقرب من حاكمة أبو عريش (شمال شرق جازان). ولوحظت أيضاً أسراب تضم 12 طائراً في الشتاء فوق الأراضي الرطبة جنوب الرياض. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هو طائر طويل جداً تبدو عليه الرصانة والهيبة أكثر من نظيره الرهوي، ولديه أسلوب طيران هادف يتميز برفرفة الجناحين بانتظام وبسطهما أثناء الهبوط. **باغ الجناح:** 180 - 200 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: بحيرة ملاكي




Wilson's Storm-petrel	Wilson's Storm-petrel	الاسم العربي:	نوء ويلسوني
غير مهدد	Wilson's Storm-petrel	الاسم العلمي:	<i>Oceanites oceanicus</i>
مستقر	Wilson's Storm-petrel	الاسم الشائع:	Wilson's Storm-petrel
-	Wilson's Storm-petrel	حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
-	Wilson's Storm-petrel	المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
-	Wilson's Storm-petrel	حالة الحماية الإقليمية:	-
-	Wilson's Storm-petrel	المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
15 - 20 سم / 8 - 50 غم	Wilson's Storm-petrel	الحجم والوزن:	15 - 20 سم / 8 - 50 غم



النطاق العالمي: بحري، وبالغ التشتت؛ يتكاثر في القارة القطبية الجنوبية والجزر المجاورة، ويرعى في مناطق قريبة من جميع المحيطات الكبرى (شمالاً إلى كندا، على بُعد 12,000 كم من نطاق تكاثره)، ويُعدُّ زائراً في جميع أنحاء البحار العربية، وهو شائع قبالة جنوب شبه الجزيرة العربية، بينما يندر في مناطق أخرى. **حاليته بالمملكة:** زائر صيفي نادر. تم توثيق وجود هذه الطيور البحرية الصغيرة ذات الريش الناعم شديد السواد في أشهر الصيف في مياه المملكة جنوب البحر الأحمر والخليج العربي. كما تم توثيق بعض أفرادها شمالاً حتى إيلات في منطقة رأس خليج العقبة. **الموئل:** بحري تماماً في المملكة، ورغم تفضيله للبحر، إلا أنه يقترب أحياناً من الشواطئ؛ حيث المياه الهادئة والضحلة نسبياً. **سلوك**

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: العوالق من القشريات لا سيما الكريل (Krill)، والأسماك الصغيرة والحبار وبطنيات الأقدام والجيوف. ويتغذى بشكل رئيس أثناء الطيران من خلال ضرب منقاره، أو غمسه في الماء، ثم الركض يخطى سريعة خفيفة الوقع على صفحة الماء، أو يحط على فريسته مباشرة، ونادراً ما يغطس. ولكونه لا يزور البر أبداً، فإنه يعتمد للاستراحة فوق الماء.



زائر صيفي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: عبارة جزيرة فرسان

يُعدُّ هذا الطائر أحد أكثر الطيور واسعة الانتشار على وجه الأرض، ومع ذلك لا يراه سوى القليل من الأشخاص. يرعى عن طريق الرقص فوق الماء، وينقر سطح الماء بقدميه لتحريك الطعام.

غالباً ما يرعى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة متفرقة، رغم توثيق وجوده في أماكن أخرى ضمن أسراب من آلاف الطيور البحرية تتناوب في تناول الغذاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يُعدُّ هذا الطائر أحد أكثر الطيور واسعة الانتشار في العالم، إذ من المحتمل أن يتجاوز تعداده المليار، ولكونه يتكاثر على الجزر النائية حول القارة القطبية الجنوبية، ويقضي الشتاء بعيداً عن الشواطئ إلى الشمال من المحيط الأطلسي، فلا يراه سوى قلة من الأشخاص. عادةً ما يرفرف جناحيه ويرقص فوق الماء، حيث ينقر سطح الماء بقدميه لتحريك الطعام. **باع الجناح:** 34-42 سم.


Ardeotis arabs	Ardeotis arabs	الاسم العربي:	حبارى عربية
Arabic Bustard	Ardeotis arabs	الاسم العلمي:	<i>Ardeotis arabs</i>
قريب من التهديد	Arabic Bustard	الاسم الشائع:	Arabic Bustard
يتناقص	Arabic Bustard	حالة الحماية العالمية:	قريب من التهديد
مهدد بالانقراض بشكل حرج	Arabic Bustard	المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
يتناقص بوتيرة كبيرة	Arabic Bustard	حالة الحماية الإقليمية:	مهدد بالانقراض بشكل حرج
75 - 100 سم / الذكر 5,700 - 10,000 غم؛ الأنثى 4,500 غم (أخف وزناً بنسبة 40%)	Arabic Bustard	المنحى الإقليمي للمجموعة:	يتناقص بوتيرة كبيرة
	Arabic Bustard	الحجم والوزن:	75 - 100 سم / الذكر 5,700 - 10,000 غم؛ الأنثى 4,500 غم (أخف وزناً بنسبة 40%)



النطاق العالمي: مقيم؛ يُوجد في جميع أرجاء منطقة الساحل شبه القاحلة بأفريقيا، ومنطقة تهامة الساحلية جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شديد الندرة، أو ربما انقرض. **الموئل:** الهضاب الحجرية والوديان الصغيرة التي تضم أشجار الطلح والأعشاب في سهل تهامة الساحلي، وربما يُوجد في حقول الذرة أو البذر الرفيعة (كما تم توثيقه في اليمن). **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الجراد والجنادب والخنافس واللافقاريات الأخرى، والزواحف الصغيرة والقوارض، والطيور المعشوشة. ويقف غالباً من سطح الأرض، أو بالقرب منه. **النشاط:** نهارى، وشفقي،

وليلي جزئياً. يقضي هذا الطائر 67% من يومه بحثاً عن الطعام، لا سيما في الصباح المبكر وقبل الغروب، وهو يرعى أيضاً في الحقول المفتوحة ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: غير معروف جيداً، وربما يتوخى أسلوب ميدان المغازلة، حيث تجتمع الذكور لتستعرض بشكل جماعي قدراتها وتتزاوج مع إناث عدة (كما يحدث في الأنواع المماثلة). **الأدوار الأبوية:** غير معروفة جيداً. على الأرجح تؤدي الأنثى جميع مهام العش. **العش:** حفرة ضحلة في الأرض غير مبطنة. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 25 يوماً. **فترة التعشيش:** غير معروفة (تغادر الصغار من أنواع مماثلة العش بعد الفقس بفترة قصيرة،

وتطير بعد 35 يوماً). **الحضنة:** غير معروفة. **حالة الحماية:** في أوائل القرن العشرين، كان هذا الطائر شائعاً في ربوع شبه الجزيرة العربية، ولكن مع فقدان الموائل وممارسات الصيد وجمع البيض، أصبح عدد الإناث المتكاثرة قليلاً جداً، مع وجود غالبيتها في اليمن. أما في المملكة، فقد تم العثور عليه في اثني عشر موقعاً في دراسة استقصائية استمرت من عام 1987 حتى عام 1990، ومنذ ذلك الحين لم يوجد سوى توثيق واحد فقط لهذا النوع في المملكة، وهو طائر منفرد شوهد في جزيرة فرسان عام 2017. وبالتالي، فإن هذا النوع قد يكون في واقع الأمر منقرضاً داخل المملكة.



مقيم متكاثر (ربما منقرض)

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجَل تكاثره (مع إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: جزر فرسان



لقلق عابديني*Ciconia abdimii*

Abdim's Stork

غير مهدد

يتناقص

قريب من التهديد

يتناقص

الحجم والوزن: 75 - 81 سم / 1,300 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر بشكل رئيس في المناطق الساحلية بأفريقيا، مع وجود تعداد صغير منه في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي غالبية تعداده على بُعد 800 - 5,000 كم جنوباً في شرق وجنوب أفريقيا (رغم أن بعض الطيور العربية، لا سيما شبه البالغة، تفضل الشتاء في اليمن). **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر ونادر جداً. غالباً ما يتكاثر هذا الطائر الرائع البزاق كبير الحجم في أقصى جنوب تهامة حول القنفذة وجنوب الشقيق (جازان)، في حين يهاجر عبر البحر الأحمر نحو أفريقيا. **الموئل:** يفضل عادةً أن يكون قريباً من المياه بمسافة لا تتجاوز 500 م في القرى، وغالباً بالقرب من المناطق الزراعية ومكبات النفايات. **سلوك**

أثناء السير، **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يُوجد في مجموعات تتكون من 5 - 30 طائراً. **سلوك التكاثر:** نظام الزواج: أزواج متكاثرة منفردة وأحادية الزواج اجتماعياً (ربما تشكل أحياناً مستعمرات صغيرة تقل عن 6 أعشاش، وفقاً لحالة موثقة في اليمن). **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين في بناء العش والحضانة، ورعاية الصغار. **العش:** كبير (قطره 100 سم وعمقه 17 سم) مبني من العيدان ومبطّن بالعشب، ويوجد فوق برج مرتفع، أو برج كهرياء (ربما يوضع أيضاً فوق شجرة، أو مبنى، وفقاً لحالة موثقة في اليمن)، علماً أن الأعشاش تُستخدم لسنوات عدة ويجري ترميمها سنوياً. **البيض المحضون:** 2 - 5 بيوض. **الحضانة:** 28 - 29 يوماً. **فترة التعشيش:** 8 أسابيع. **الحضنة:** أحادي الحضنات.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40

منطقة النشاط: أحد المسارحة

**لقلق أسود***Ciconia nigra*

Black Stork

غير مهدد

غير معروف

-

-

الحجم والوزن: 95 - 100 سم / 3,000 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يتكاثر التعداد المقيم منه في إسبانيا وجنوب أفريقيا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا حتى شمال الصين وسيبيريا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند وفي جنوب الصين. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، زائر شتوي نادر. يوجد هذا اللقلق الأسود كبير الحجم في المملكة بوصفه مهاجراً عابراً (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر) مروراً بالمرتفعات الغربية نحو الجنوب، وبشكل رئيس في أكتوبر (على الأغلب مع هجرة الطيور الجارحة المحلقة) قبل عبور مضيق باب المندب في الطريق من اليمن إلى أفريقيا. كما أنه زائر شتوي نادر (نوفمبر - فبراير) لجنوب تهامة، والمنطقة المتاخمة للرياض في أحيان قليلة. كما تم توثيق زيارته في أشهر الصيف في أحيان أخرى.

الموئل: يفضل المجاري المائية سريعة الجريان، والارتفاعات الأقل من 1,500 م في سفوح تلال المرتفعات الجنوبية الغربية، أو المجاري المائية وبرك المياه في تهامة، أو المستنقعات الساحلية. كما يوجد في مزارع الألبان والمناطق المروية والأراضي الرطبة جنوب الرياض. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غالباً ما يتناول الأسماك في أي مجرى مائي، وما عدا ذلك أي كائن صغير يمكنه تناوله، بما في ذلك الزواحف والبرمائيات والطيور الصغيرة والقوارض، والحشرات والرخويات، والقشريات التي قد يطاردها في المياه الضحلة، أو بالقرب منها. ويختلف هذا النوع عن غيره من طيور اللقلق الموجودة في المملكة، إذ يميل إلى تجنب البشر ومواقعهم، كمكبات النفايات مثلاً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** هذا اللقلق ليس اجتماعياً كسائر الأنواع الأخرى، وغالباً ما يوجد منفرداً، أو في مجموعات صغيرة تتكون من 3 - 5 طيور، رغم أنه شوهد ضمن مجموعة تضم 12 طائراً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 144 - 155 سم.

يمكن لهذه الطيور الرائعة أن تقطع مسافة 488 كم يومياً فوق الموائل الصحراوية من دون أن تفرغ جناحيها ولو مرة واحدة، إذ تستخدم التيارات الحرارية في الهواء للتخليق عالياً في سماء المملكة أثناء مرورها في موسم الهجرة.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: بحيرة ملاكي




أبو ملقعة

ملعقي منقار أوراسي <i>Platalea leucorodia</i> Eurasian Spoonbill	الاسم العربي: الاسم العربي الآخر: الاسم العلمي: الاسم الشائع: حالة الحماية العالمية: المنحى العالمي للمجموعة: حالة الحماية الإقليمية: المنحى الإقليمي للمجموعة: الحجم والوزن:
غير مهدد غير معروف غير مهدد مستقر (على الأرجح) 95 - 70 سم / 1,130 - 1,960 غم	



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه على امتداد سواحل البحر الأحمر في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، أما التعداد المهاجر فيتكاثر بشكل متفاوت في جميع أنحاء أوروبا، ومن بحر قزوين حتى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء حول البحر الأبيض المتوسط وفي شمال الهند والصين. **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثر نادر، مهاجر عابر محدود، زائر شتوي نادر.** هذا الطائر المحب نادر الوجود، وهو مهاجر عابر منتشر وزائر شتوي (سبتمبر - أبريل)، كما يتكاثر على الجزر في البحر الأحمر، وغالباً جنوب جدة. **الموائل:** يفضل السواحل في البحيرات الضحلة المحمية والمساحات الطينية والسبخات ومصارف المياه المستعملة، ووجوده في الأراضي الداخلية محدود باستثناء نهر الرياض (مجرى وادي الحائر). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**

الخنفس المائية البالغة ويرقاتها واليعسوب والذباب والجراد، وغير ذلك من الحشرات والقشريات والرخويات والضفادع والأسماك الصغيرة، وهو يخوض المياه الضحلة مستخدماً منقاره الخاص للتمشيط المنتظم من جانب لآخر على أمل أن يجد فريسة هنا، أو هناك. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** عادة ما يرعى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة تتكون من 2 - 6.



مقيم، متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 150

منطقة النشاط: كورنيش جازان

يُعرف هذا الطائر في اللغة

العربية باسم «أبو ملقعة»

لمنقاره الشبيه بالملقعة الذي

يلوّم به في المياه لخلق دوّامات

تساعده في كشف الفريسة

المختبئة أسفل الطين.

أنواع البلسون). وغالباً ما تكون أعشاشه متقاربة من بعضها، أو متلاصقة، وتضع إناث المستعمرة البيض بصورة متزامنة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** منصة خشنة من العيدان، ومبطّنة بسويقات وأوراق النباتات، تُشيد فوق سطح الأرض، أو فوق فرع شجرة، أو على ارتفاع يقل عن 6 م فوق الأرض في شجرة ما، علماً أن ارتفاع الأعشاش الأرضية قد يصل إلى 1.5 م (لكن عادةً ما يكون أقل من 0.5 م).

البيض المحضون: 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 24 - 25 يوماً. **الفراخ:** تهجر الصغار العش في سن 4 أسابيع، وتطير في سن 7 أسابيع. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باج الجناح:** 115 - 135 سم.

لقلق أبيض غربي

<i>Ciconia ciconia</i> White Stork	الاسم العربي: الاسم العلمي: الاسم الشائع: حالة الحماية العالمية: المنحى العالمي للمجموعة: حالة الحماية الإقليمية: المنحى الإقليمي للمجموعة: الحجم والوزن:
غير مهدد يتزايد قريب من التهديد مستقر 102 - 100 سم / 2,300 - 4,400 غم	



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أفريقيا مروراً بغرب أوروبا ووصولاً إلى إيران وكازاخستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 - 6,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر محدود، زائر شتوي محلي.** يُعدُّ هذا اللقلق الشهير بلونيه الأبيض والأسود مهاجراً عابراً ينتشر على نطاق واسع (أبريل، سبتمبر - نوفمبر)، وزائراً شتوياً منتظماً (ديسمبر - مارس) لجنوب تهامة، وأحياناً تبوك والرياض، وربما بقيق. **الموائل:** يفضل الموائل المفتوحة، مثل الأراضي العشبية والمستنقعات والحقول الزراعية، ولسوء الحظ مكبات النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بصفة أساس، أي حيوان صغير يمكنه اصطياده، بما في ذلك اللافقاريات الكبيرة والزواحف والبرمائيات والأسماك والطيور الصغيرة والثدييات. كما يتغذى على الجيف، وبقايا طعام الإنسان، وهو يلاحق أو يطارد الفريسة أحياناً ويخطفها بمنقاره. ما يثير الدهشة، أنه يقضي قسطاً كبيراً جداً من وقته كل يوم دون

حركا مُرتكزاً على ساق واحدة. **النشاط: نهاري.**

السلوك الاجتماعي: اجتماعي بصفة عامة

في الشتاء، وعادةً ما يُشاهد في أعداد صغيرة،

رغم توثيق مجموعات يصل عددها إلى 70

طائراً في الرياض وبقيق، ومجموعات أخرى من

مائة طائر في مكب نفايات أبو عريش، وحتى

300 طائر بالقرب من ينبع. **سلوك التكاثر:**

لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** نظراً لأنه


يتكاثر في مواقع قريبة جداً من المناطق التي

يسكنها البشر في معظم أجزاء نطاقه، فإنه معتاد على وجود البشر أثناء قضاة فصل

الشتاء في المملكة، وقد يسمح بالاقتراب الشديد منه أثناء الرعي في مكبات النفايات

والتجمعات الأخرى. لكن ولسوء الحظ، تصبح أفرادها متسخة جداً في تلك الأماكن، إذ تبدو

أحياناً باللونين الأسود والرمادي الداكن. **باج الجناح:** 155 - 165 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: برك مياه الصرف المعالجة

في أبو عريش




أبو منجل اللامع

أُنوق لمامع	الاسم العربي:
<i>Plegadis falcinellus</i>	الاسم العربي الآخر:
Glossy Ibis	الاسم العلمي:
غير مهدد	الاسم الشائع:
يتناقص	حالة الحماية العالمية:
غير مهدد	المنحى العالمي للمجموعة:
يتزايد	حالة الحماية الإقليمية:
49 - 66 سم / 350 - 840 غم	المنحى الإقليمي للمجموعة:
	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه في معظم أنحاء أفريقيا وأستراليا وشرق أميركا الشمالية، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في مواقع متفرقة في أرجاء جنوب أوروبا وآسيا الوسطى، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً، بشكل رئيس في أفريقيا والهند. **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثراً شديداً، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع.** ينتشر هذا الطائر المدهش والبراق على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء هجرته، وتتزايد وتيرة وجوده على مدار الشتاء، علماً أن أول توثيق لتكاثره في المملكة كان في جنوب تهامة عام 2010، وذلك في أراضٍ رطبة مستعمرة بالقرب من صبياء وأبو عريش. **الموئل:** الأراضي الرطبة الضحلة ذات المياه العذبة، أو قليلة الملوحة، ومن ذلك بحيرات

معالجة مياه الصرف، بما فيها المستنقعات والمجاري المائية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات البالغة ويرقاتها، بما في ذلك الخنافس المائية واليعسوب والجنادب والذباب واللافقاريات الأخرى، مثل الديدان والقواقع والمحار والقشريات وبعض الفقاريات الصغيرة التي يلتقطها عن طريق سير الوحل، أو الانتقاء من السطح. كذلك تم توثيق أسراب في المملكة أثناء تناولها الطعام في حقول الذرة السكرية المغمورة بالماء. **النشاط:** نهارى، **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يربى في أسراب صغيرة، رغم توثيق مجموعات يصل عددها إلى 40 فرداً أثناء الهجرة. **سلوك**



مقيم، متكاثراً، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5

منطقة النشاط: بحيرات معالجة مياه الصرف في صبياء

**أبو منجل الأصلع**

أُنوق أصلع شمالي	الاسم العربي:
<i>Geronticus eremita</i>	الاسم العربي الآخر:
Northern Bald Ibis	الاسم العلمي:
مهدد بالانقراض	الاسم الشائع:
مستقر	حالة الحماية العالمية:
مهدد بالانقراض بشكل حرج	المنحى العالمي للمجموعة:
يتناقص	حالة الحماية الإقليمية:
70 - 80 سم / 1,350 - 1,540 غم	المنحى الإقليمي للمجموعة:
	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم (يتألف من 147 زوجاً متكاثراً فقط) في موقعين صغيرين غرب المغرب، وربما لا يزال يتكاثر تعداد مهاجر منه في موقع صغير في سوريا (بالقرب من تدمر)، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,800 كم جنوباً وسط إثيوبيا. وللأسف، تم توثيق طائر واحد فقط في سوريا أثناء الإحصاء الأخير في عام 2013. لذا، قد يكون هذا النوع منقرضاً حالياً. **حالته بالمملكة: زائر شتوي شديد الندرة، ربما منقرض.** في فصل الصيف (يوليو - أغسطس)، يطير التعداد السوري جنوباً على طول المرتفعات الغربية وساحل البحر الأحمر (كان هناك ما يصل إلى خمسة في منطقة الشقيق والبرك في يوليو عام 2010)، بينما يقضي الشتاء في الأراضي الرطبة في الجنوب الغربي، أو يعبر مضيق باب المندب (اليمن) إلى أفريقيا، ثم يعود بعد ذلك عبر البحر الأحمر إلى جدة (مارس - أبريل) في طريقه نحو الشمال. **الموئل:** يفضل الأراضي

الرطبة والمستنقعات، مثل السدود والخزانات وبرك معالجة مياه الصرف في جنوب سهل تهامة الساحلي. كما يُوجد في برك المياه المؤقتة المجاورة للأراضي الزراعية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات الكبيرة، مثل الخنافس والجنادب واليرقات، واللافقاريات الصغيرة، مثل السحالي والبرمائيات والثدييات الصغيرة والأسماك التي يتحصل عليها عن طريق فحص أشجار الأعشاب والشقوق الصخرية والحطام المائي وسبر النباتات والأراضي الرخوة. **النشاط:** نهارى، **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يكون

سابق لهذا النوع التكاثر في كل من تركيا وسوريا قبل أن يهاجر إلى المملكة وإثيوبيا. ومع ذلك، فقد تمخضت آخر الدراسات الاستقصائية حول تكاثره في عام 2013، عن وجود طائر واحد... واحد فقط!

في أسراب، حيث يبحث عن الغذاء بصحبة غيره، ويجثم ويهاجر في مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 125 - 135 سم. **حالة الحماية:** تناقص هذا النوع بشكل حاد؛ فقد أظهرت أجهزة تتبع الأقمار الاصطناعية لصغار الطيور أن التهديد الرئيسي للتعداد الشرفي كان هو الصيد في شبه الجزيرة العربية، لما كان الاقتراب من هذا الطائر واصطياده أمراً سهلاً.



مهاجر عابر، زائر شتوي (ربما منقرض)

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جنوب تهامة



واق صغير

Ixobrychus minutus
Common Little Bittern
غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
يتزايد
27 - 38 سم / 59 - 150 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



ذكر واق صغير




أنثى واق صغير

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه في مختلف أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في غرب أوروبا، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة شرقاً، ووصولاً إلى كازاخستان وشمال الهند، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 7,000 كم في الجنوب والجنوب الغربي من أفريقيا، حيث التعداد المقيم هناك. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع.** يُوجد هذا البلشون الجميل في جميع أنحاء المملكة باعتباره مهاجراً عابراً، ويتكاثر بصفة رئيسة في المنطقة الشرقية، وبالقرب من الرياض وينبع وتبوك.

الموئل: يفضل الأراضي الرطبة التي تضم أحواض القصب الكثيفة الناضجة، والتي غالباً ما تتسم بالنمو الثانوي لنبات الطرفاء. كذلك في البحيرات المحاطة بالقصب والمصارف والمجاري المائية بطيئة الجريان وأشجار المانغروف الكثيفة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات والضفادع والأسماك التي يلتقطها عند حافة الماء، أو بين النباتات الكثيفة، وهو يقف بلا حراك، أو يتحرك ببطء لالتقاط فريسته

من السطح، أو النباتات الناشئة. كما تتوخى بعض أفرادها استراتيجيات الطعم لاستدراج الفريسة. **النشاط:** شفقي، ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة منفردة وأحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** منصة ضحلة تتكون من سيقان جافة ومبطنة بأوراق القصب الجافة، وموضوعة على ارتفاع يقل عن متر واحد فوق الماء بين مجموعة كثيفة من أعواد القصب الناضجة (أو ربما فوق كومة من النباتات العائمة، أو فرع شجرة منخفض ونام بين القصب، وفقاً للحالات الموثقة في أوروبا). **البيض المحضون:** 5 - 6 بيوض. **الحضانة:** 17 - 19 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد 9 أيام، وتطير في سن 30 يوماً تقريباً. **الحضنة:** أحادي الحضنات. **باغ الجناح:** 40 - 58 سم.

يتعمد هذا الطائر الذكي أحياناً إسقاط يعسوب، أو حشرة ميتة فوق سطح الماء حتى يتمكن من التغذي بعد ذلك على عديد من الأسماك الصغيرة التي استدرجت إلى الطعم.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 400
منطقة النشاط: بحيرات الأحساء

**واق أوراسي**

Botaurus stellaris
Eurasian Bittern
غير مهدد
يتناقص
-
-
80 - 64 سم / 750 - 2,060 غم


الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر بشكل رئيس ضمن خطوط العرض الوسطى في أوراسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 1,000 - 6,000 كم جنوباً في أفريقيا، والعراق والهند وجنوب الصين واليابان. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، ربما مهاجر متكاثر. يتميز هذا الطائر الذي يجيد التخفي بندرته، وهو مهاجر عابر ينتشر على نطاق واسع في ربوع المملكة. وأشارت آخر الحالات الموثقة في أواخر ديسمبر من عام 2020 إلى أن بعض هذه الطيور يقضي الشتاء في المملكة. كما سُمع نداء التكاثر «المدوّي» والمميز لهذا الطائر مراراً عدة في بركة خفرة (جنوب الجبيل) في مارس، ما يدل على أنه ربما يتكاثر في المملكة أحياناً. **الموئل:** الأراضي الرطبة ووفرة الخضرة والغنية بأحواض القصب الشاسعة ذات مستويات المياه الضحلة والمستقرة، وبرك المياه المحمية، حيث يتسنى له الرعي في الخفاء، بما في ذلك البرك الاصطناعية والمجاري المائية وبحيرات معالجة مياه الصرف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الأسماك والبرمائيات والسحالي والثعابين والقوارض وصغار الطيور والفراخ، إضافة إلى الحشرات والقشريات والرخويات. وعند البحث يمشي ببطء قاصداً هدفاً محدداً من خلال القصب، أو يقف من

دون حراك مترصداً فريسته. **النشاط:** شفقي وليلي، ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد غالباً، ولم يُشاهد أكثر من ثلاثة منه معاً. **سلوك التكاثر:** لم يُوثق تكاثره في المملكة ولكنه محتمل. **ملاحظة:** يتميز هذا الطائر بأنه من أكثر الأنواع التي يصعب رؤيتها، لكونه بلشوناً قصيراً وبديناً يجيد التخفي ويجنّب التسلل، فضلاً عن نمط نشاطه الليلي وفي وقت الشفق، وما يعيق المراقبة أكثره تجمده في مكانه ووقوفه منتصب العنق، ما يجعل ريشه المبقع غير مرئي تقريباً في بيئته المليئة بالقصب، غير أن الأمر يستحق العناء. **باغ الجناح:** 125 - 135 سم.

في مكانه ووقوفه منتصب العنق، ما يجعل ريشه المبقع غير مرئي تقريباً في بيئته المليئة بالقصب، غير أن الأمر يستحق العناء. **باغ الجناح:** 125 - 135 سم.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجل تكاثره (مع إمكان حدوثه)
منطقة النشاط: بركة خفرة (جنوب الجبيل)

بلشون أخضر الظهر

بلشون محرز
Butorides striata
Green-backed Heron
غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
يتزايد (على الأرجح)
35 - 48 سم / 125 - 260 غم


الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يوجد التعداد المقيم منه في معظم مناطق أميركا الجنوبية وأستراليا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في كل من الولايات المتحدة وشرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً داخل نطاق التعداد المقيم. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر. ينتشر هذا البلشون المعروف بجرأته على نطاق واسع في المناطق الساحلية. **الموئل:** ساحلي بالكامل تقريباً. ويتكاثر بشكل أساس في غابات المانغروف الأسود على امتداد البحر الأحمر، وأحياناً في الأراضي الرطبة الداخلية. كما يوجد حيث توفر الصخور والشعاب المرجانية المكشوفة غطاءً وظلاً، وفي المرافئ أحياناً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام

الغذائي؛ الأسماك الصغيرة والبرمائيات والزواحف وبيض الطيور وفراخها، ومجموعة متنوعة من الحشرات المائية والأرضية واللافقاريات الأخرى، وهو يتغذى بشكل رئيس عن طريق الانتظار بلا حراك، ثم التقاط الفريسة العابرة. **النشاط:** ليلي، وشفقي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام

التزاوج؛ أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، عادةً ما تعشش منفردة رغم أنها تكون أحياناً ضمن جماعات طليقة، أو بين أنواع أخرى من البلشون. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن فنجان ضحل يتكون من الأغصان والمواد الليلية المستخلصة من المانغروف، ويبنى على ارتفاع يقل عن متر واحد فوق سطح الماء بين أشجار المانغروف، أو الصخور. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 22 - 24 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش وتتسلق الفروع القريبة في سن يراوح بين 14 - 30 يوماً، وتطير عندما تبلغ 40 يوماً تقريباً. **الحضنة:** ربما يكون ثنائي الحضانة. **باج الجناح:** 52 - 60 سم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,000
منطقة النشاط: مرفأ قَرْسَان

**بلشون ليل رأس**

Nycticorax nycticorax
Black-crowned Night Heron
غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
يتزايد
56 - 65 سم / 278 - 1,100 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



فرخ بلشون ليل رأس

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه في معظم مناطق أميركا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويتكاثر التعداد المهاجر عبر أميركا الشمالية مروراً بأوروبا ووصولاً إلى الصين، وجنوباً إلى شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً مع التعداد المقيم في أفريقيا وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محدود. يوجد هذا البلشون المذهل في المملكة على نطاق واسع خلال الهجرة (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، ويتزايد وجوده على مدار الشتاء (ديسمبر - فبراير) وفي الصيف، وذلك بفعل تأسيس أراضٍ رطبة اصطناعية، علماً أن أول توثيق لتكاثره كان في عام 1991. **الموئل:** يعشش فوق الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، أو قليلة الملوحة، بما في ذلك برك المياه والخزانات وبحيرات معالجة مياه الصرف وقنوات التصريف والمجاري المائية، وعادةً بوجود الأشجار في منطقة متاخمة لتلك الأماكن يستخدمها للجنوم، ويمكن له أيضاً، أن يجد موئلاً ما مناسباً أثناء الهجرة بأي مكان، حتى في الصحاري الرملية. **سلوك البحث عن**


الغذاء: النظام الغذائي؛ انتهازي، وبقات على اللافقاريات والفقاريات الصغيرة التي يلتقطها خلال مجموعة متنوعة من أساليب الرعي، وغالباً ما يقف وينتظر الفريسة حتى تمر. **النشاط:** شفقي ويلي، ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، رغم إمكانية العثور عليه ضمن مجموعات صغيرة أثناء هجرته. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج؛ أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش عادة في مستعمرات مختلطة تضم أنواعاً أخرى من البلشون. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (بالمواد التي يجمعها الذكر) وتتولى معظم واجبات الحضانة، بينما يتشارك الأبوان في رعاية الصغار. **العش:** منصة ضحلة من الغصينات أو القصب، وأحياناً تكون مبطنه بمواد نباتية دقيقة، موضوعة بين أغصان شجرة طرفاء ميتة بجوار المياه (ربما توضع بين أعواد القصب، وفقاً لما تم توثيقه في أماكن أخرى). **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 21 - 22 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش في سن 3 أسابيع، وتطير في سن 6 - 7 أسابيع. **الحضنة:** ثنائي الحضانة غالباً. **باج الجناح:** 105 - 112 سم.

يتجلى جمال هذا الطائر الليلي عند التكاثر، حيث يكتمل نمو ريش رأسه الطويل ذي اللون الأبيض، وتتحول ساقاه إلى اللون الأحمر. كما يضيء تاجه الأسود بلون أخضر لامع مائل إلى الزرقة.

يتجلى جمال هذا الطائر الليلي عند التكاثر، حيث يكتمل نمو ريش رأسه الطويل ذي اللون الأبيض، وتتحول ساقاه إلى اللون الأحمر. كما يضيء تاجه الأسود بلون أخضر لامع مائل إلى الزرقة.



بلشون ليل رأس بالغ



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 50
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

أبو قردان

بلشون بقر غربي

Bubulcus ibis

Cattle Egret

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

يتزايد

46 - 56 سم / 250 - 510 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



بلشون بقر غربي بالغ جاهز للتزاوج



فرخ بلشون بقر غربي

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه في المكسيك وأميركا الجنوبية وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية والهند حتى أستراليا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في أميركا الشمالية، وعلى نحو متقطع من شرق أوروبا حتى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً داخل نطاق التعداد المقيم. **حالته بالمملكة:** مقيم، متكاثر غير شائع، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع.

يوجد على نطاق واسع أثناء الهجرة وعلى مدار الشتاء، مع وجود تعداد تكاثر كبير في جنوب سهول تهامة. **الموئل:** يبحث عن الغذاء في مستنقعات المياه العذبة وقنوات التصريف والمواقع المعدلة بواسطة البشر، بما في ذلك المروج ومحاصيل

الأعلاف وحظائر الماشية ومكبات النفايات، وأحياناً على السواحل. غالباً ما يتكاثر

بين فروع الأشجار على مقربة من الأراضي الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: الحشرات، إلى جانب الفقاريات الصغيرة الضرورية بعد الفقس التي يلتقطها

من سطح الأرض خلال السير والتنقيب، وعادةً ما يكون ذلك خلف ماشية وجمال، وحيوانات

عاشبة أخرى، أو من فوق جسمها، الأمر الذي

يؤدي إلى أن يتعد عن عشه لأكثر من 30 كم. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:**

في أسراب، وغالباً ما تكون أسراباً طليقة يصل عددها إلى 30 سرباً، أو في مجامع

تضم مئات عدة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثر أحادية الزواج اجتماعياً،

أو مختلطة جنسياً، تعشش في المستعمرات الكثيفة التي تتكوّن عادة من 200 -

400 زوج (أحياناً يصل عددها إلى 1,500 زوج)، وفي أحيانٍ أخرى تختلط مع أنواع من

طيور البلشون الأخرى. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش بجمعها الذكور،

ويتشارك كلا الأبوين في حضانة ورعاية الصغار. **العش:** منصة من العيدان، وأحياناً تكون

مبنيّة بالعشب، وموضوعة على ارتفاع يفوق مترين فوق الأرض بين فروع شجرة ما (أو

ربما منصة من النباتات المائية بين القصب، وفقاً للحالات الموثقة في أماكن أخرى).

البيض المحضون: 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 21 - 26 يوماً. **الفرافخ:** تغادر الصغار العش

وتتسلق الفروع القريبة في سن 20 يوماً، وتطير عندما تبلغ 30 يوماً تقريباً. **الحضنة:**

حضنة مفردة، أو ثنائي الحضانة. **باغ الجناح:** 88 - 96 سم.

في الربيع، ينمو لدى كلا


الجنسين ريش تكاثر منمق

على الرأس والصدر والظهر،

ولا تتزاوج الأنثى سوى مع

الذكر الذي يمتلك ريشاً أطول

من ريشها.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً: 6,000

منطقة النشاط: بحيرات معالجة مياه الصرف

في صيباء

**واق أبيض صغير**

بلشون مذهب

Ardeola ralloides

Squacco Heron

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

مستقر

42 - 47 سم / 230 - 370 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



فرخ بلشون مذهب



بلشون مذهب بالغ

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه في مختلف أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أما التعداد المهاجر فيتكاثر حول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى أفغانستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم في جنوب وشرق غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكلٍ أساس. **حالته بالمملكة:**

مهاجر متكاثر ونادر جداً، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد هذا البلشون الجميل على نطاق واسع أثناء الهجرة وخلال فصل الشتاء، وهو يتكاثر على امتداد نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)، وربما في المنطقة الشرقية. **الموئل:** الأراضي

الرطبة ذات المياه العذبة، أو قليلة الملوحة المحاطة بالنباتات الكثيفة، بما في ذلك قنوات التصريف والمجاري المائية وبحيرات معالجة مياه الصرف وبرك المياه والمستنقعات، إضافة إلى غابات المانغروف. كما يعشش في الأشجار على امتداد نهر

الرياض (مجرى وادي الحائر)، وربما في أحواض القصب الكثيفة والكبيرة في المنطقة الشرقية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يرقط الحشرات إلى جانب الأسماك والبرمائيات واللافقاريات التي يلتقطها أثناء الاختباء بين النباتات والوقوف

بلا حراك، ثم الانقضاض على الفريسة أثناء عبورها. **النشاط:** شفقي، وليلي ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد بصفة عامة، رغم توثيق مجموعات تتكون من 40 طائراً أثناء الهجرة. كما تمت مشاهدة 400 منه في بحيرة ملاكي خلال أكتوبر في

إحدى السنوات. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:**

أزواج متكاثر أحادية الزواج موسمياً (تتشكل

الروابط الزوجية في مناطق التكاثر، ومنطقة

أعشاش صغيرة، وعادةً في مستعمرات

مختلطة مع طيور بلشون ليل أراس، وبلشون

أرجوان. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران

البالغان في بناء العش ورعاية الصغار، بينما

تقوم الأنثى بمعظم واجبات الحضانة. **العش:**

منصة مكوّنة من غصينات، وتُبنى عادةً على

ارتفاع يقل عن 4 م فوق سطح الأرض (يصل أحياناً إلى 20 م) بين أغصان شجرة طرفاء ميته،

أو مكونة من القصب ونبات البردي على ارتفاع متر واحد فوق سطح الماء بين القصب.

البيض المحضون: 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 22 - 24 يوماً. **الفرافخ:** تغادر الصغار العش بعد

32 يوماً تقريباً، وتطير في سن 45 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 80 - 92 سم.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً: 20

منطقة النشاط: سبخة الفصل

بلشون رأس

Ardea melanocephala
Black-headed Heron

غير مهدد
يتزايد
-
-
92 - 96 سم / 710 - 1,650 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يُوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويتجول بعض التعدادات منه في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** زائر نادر وغير منتظم، مقيم متكاثراً محتملاً. أسس هذا البلشون الصغير النجيل مجموعات له في شبه الجزيرة العربية خلال العقود الأخيرة قادماً من أفريقيا، وقد تم توثيقه في اليمن للمرة الأولى عام 1962، وفي المملكة عام 2010، علماً أنه يتكاثر حالياً في اليمن وربما سلطنة عُمان، وقد يتكاثر بالمملكة في المستقبل القريب. أما وجوده في المملكة، فيقتصر حالياً على تهامة والسهول الساحلية في الجنوب الغربي. **الموائل:** أراضي المستنقعات ذات المياه العذبة والمزارع المروية لا سيما أحواض ترسيب مياه الصرف، وأحياناً داخل اليابسة بكيلومترات عدة. ويندر وجوده على الأراضي الرطبة الساحلية، ويُعدُّ أقل ارتباطاً بالأراضي الرطبة من معظم طيور البلشون الأخرى. **سلوك البحث عن الغذاء:** غالباً الأسماك الصغيرة، إلى جانب القوارض والطيور الصغيرة والسحالي والثعابين والضفادع، إضافة إلى اللافقاريات التي تشمل الحشرات والعناكب والديدان والقشريات، علماً أنه ليس صياداً نشطاً، وإنما يصطاد فريسته عبر مطاردتها خلسة، أو الوقوف بلا حراك وصددها ثم الانقضاض عليها. كما يتغذى بالمثل في الموائل الأرضية وشبه المائية، وقد يقطع مسافة تتعدى 30 كم بين أراضي رعيه ومجتمه. **النشاط:** نهارى، وليلي بشكل منتظم. **السلوك الاجتماعي:** منفرد بصفة عامة. **سلوك التكاثر:** لم يُوثق تكاثره في المملكة، ولكنه قد يفعل ذلك في المستقبل القريب.



زائر طوال العام

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: بحيرات معالجة مياه الصرف

في صيباء

**مالك الحزين**

بلشون أرم

Ardea cinerea

Grey Heron

غير مهدد

غير معروف

قريب من التهديد

مستقر (ربما يتزايد)

90 - 98 سم / 1,020 - 2,073 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يُوجد التعداد المقيم منه في معظم أنحاء أفريقيا وغرب أوروبا وجنوب شرق آسيا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر من وسط أوروبا حتى سيبيريا ووصولاً إلى شمال الصين، بينما يقضي الشتاء على بُعد 1,000 - 2,000 كم جنوباً في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية والهند. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثراً نادر جداً، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يوجد هذا البلشون البهتي على نطاق واسع في الشتاء وأثناء الهجرة، وقد أصبح هناك تعداد صغير مقيم طوال السنة للتكاثر؛ وذلك بعد اتخاذ من الأراضي الرطبة الاصطناعية حول نهر الرياض (مجرى وادي الحائر) موطناً له بشكل رئيس. **الموائل:** بالقرب من المياه الضحلة، بما في ذلك السواحل والأراضي الرطبة التي تضم بحيرات معالجة مياه الصرف وأحواض القصب والمجاري المائية والسدود والبحيرات الاصطناعية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى غالباً على الأسماك، إلى جانب سائر الفقاريات واللافقاريات الصغيرة التي يلتقطها عادةً أثناء السير، أو خلال رصد أي فريسة، وهو انتهازى للغاية، حتى أنه يلتقط الجراد في المملكة أثناء الهجرة الجماعية. **النشاط:** شفقي، ليلي ونهاري

جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يعرعى منفرداً، رغم توثيق أسراب تضم مئات منه خلال موسم الهجرة في الجبيل. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج موسمية، تعشش في مستعمرات صغيرة، وأحياناً مع أنواع أخرى، منها البلشونيات. يجدر التنويه بأن التكاثر خارج نطاق الزوجية أمراً ليس مألوفاً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** منصة من العيدان، أو القصب، ومبطنة بالأغصان الدقيقة، أو أوراق الشجر، أو الأعشاب، وتبنى في شجرة، أو حوض قصب، أو فوق سطح الأرض، أو في فرع شجرة منخفض فوق إحدى الجزر. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 23 - 28 يوماً. **فترة التعشيش:** 42 - 55 يوماً (تظل الصغار بالقرب من العش لفترة أخرى تراوح ما بين 10 - 20 يوماً). **الحضنة:** حضنة مفردة. **باع الجناح:** 175 - 195 سم.

بالرغم من أن هذا البلشون الجميل عادةً ما يصطاد السمك الذي قد يصل طوله إلى 25 سم، فإنه يتغذى في المملكة أيضاً على الجراد، لا سيما أثناء غزو الجراد.



مقيم متكاثراً، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 15

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

بلشون أرجوان*Ardea purpurea*

Purple Heron

يتناقص

يتزايد

مهدد بالانقراض

مستقر

79 - 90 سم / 525 - 1,218 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يوجد التعداد المقيم منه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن باكستان حتى جنوب شرق آسيا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر من أوروبا إلى كازاخستان، وجنوباً إلى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً داخل نطاق التعداد المقيم. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. ينتشر هذا البلشون بديع الزخرفة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء هجرته (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، ويتكاثر على امتداد نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)، وفي المنطقة المتاخمة لنيبع، وربما في المنطقة الشرقية أيضاً. **الموئل:** يفضل الأراضي الرطبة وافرة الخضرة ذات المياه العذبة، بما في ذلك برك المياه المحاطة بالقصب والمجاري المائية وبحيرات معالجة مياه الصرف وأحواض القصب، وكذلك أشجار المانغروف، إضافة إلى ساحل البحر الأحمر الجنوبي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً الأسماك والضفادع والقشريات والحشرات المائية، إلى جانب الفقاريات الصغيرة الأخرى. ويتغذى بشكل رئيس عبر الوقوف بلا حراك يترصد أي فريسة تمر أمامه،

أظهرت أجهزة التتبع بالأقمار

الصناعية إمكانية هجرة

هذا الطائر الكبير مسافة


4,000 كم في 5 - 7 أيام

فقط، بل إن بعضه يمكنه

الطيران من دون توقف

مسافة 5,600 كم.

أو عبر السير ببطء. **النشاط:** شفق، ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات صغيرة (غالباً ما يتم الخلط بينه وبين بلشون ليل رأس وواق أبيض صغير)، أو في صورة منفردة، أو مجموعات متفرقة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش ورعاية الصغار، بينما تقوم الأنثى بمعظم واجبات الحضنة. **العش:** منصة مكونة من العيدان، ومبنية فوق شجرة أو فرع شجرة، أو مكونة من القصب ومبنية فوق المياه في حوض قصب ما على ارتفاع يصل إلى متر واحد. **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض. **الحضانة:** 25 - 27 يوماً. **فترة التعشيش:** 45 - 50 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 120 - 150 سم.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 80

منطقة النشاط: سبخة الفصل

**بلشون عملاق***Ardea goliath*

Goliath Heron

غير مهدد

مستقر

مهدد بالانقراض

مستقر (على الأرجح)

135 - 150 سم / 4,310 - 4,468 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يُوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى ساحل البحر الأحمر في مصر، مع وجود تجمعات صغيرة منه في شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر جداً. يتكاثر طائر بلشون عملاق الذي اكتسب اسمه هذا عن جدارة، على جزر وسواحل البحر الأحمر في المملكة. **الموئل:** يفضل المجموعات الشاسعة من النباتات الساحلية التي تسودها أشجار المانغروف. كما يُوجد أحياناً في الموائل المرجانية المكشوفة غير الموحلة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً الأسماك والضفادع والسحالي والتعابين والقوارض وسرطان البحر والروبيان، والجيف العائمة، وهو غير نشط إلى حد بعيد، إذ يقضي معظم يومه بلا حراك، جُل ما يفعله هو الانتظار حتى تمر فريسة ما أمامه، أو أنه يبحث عن الطعام عن طريق المشي ببطء. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:**

منصة غير فحمة (قطرها لا يزيد على متر

واحد) تتكون من عيدان، ومبطنة بغصينات

دقيقة، أو أوراق شجر المانغروف، وتبنى إما

فوق الأرض، أو على ارتفاع يقل عن 3 م فوق

سطح الأرض على فرع شجرة ما (لا سيما

أشجار المانغروف)، أو على الجذور المكشوفة

لشجر المانغروف (أو ربما بين القصب، وفقاً

لحالات موثقة في أفريقيا)، أو يعيش في مواقع غير عادية وذلك فوق عش عقاب نساري


مهجور. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 24 - 30 يوماً. **فترة التعشيش:** 40 -

60 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 210 - 230 سم. **حالة الحماية:** هذا النوع

مدرج ضمن الفئة المهددة بالانقراض إقليمياً نظراً لحجم تعداده الصغير الذي يضم أقل

من 250 طيراً ناضجاً في شبه الجزيرة العربية. وقد تأثر التعداد بالصيد والارتطام بأسلاك

التيار الكهربائي العلوية.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 60

منطقة النشاط: جزر قرسان



بلشون أبيض صغير


الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:

غرنوق أبيض صغير
Egretta garzetta
Little Egret
غير مهدد
يتزايد
غير مهدد
مستقر
55 - 65 سم / 280 - 710 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يوجد التعداد المقيم منه في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن الهند حتى أستراليا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في جنوب أوروبا حتى كازاخستان شرقاً وإلى العراق جنوباً. بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم حول أطراف البحر الأبيض المتوسط، وشبه الجزيرة العربية وإيران.

حاليته بالمملكة: مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، مهاجر متكاثر محتمل. يعبر هذا الطائر الأبيض الصغير الذي يتسم بالرقعة والنشاط المملكة (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر) ضمن نطاق واسع من أراضيها، لا سيما المنطقة الغربية، بينما يقضي بعض أفراده فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير) في الأراضي الرطبة الكبرى. ويبقى أحياناً خلال فصل الصيف في الأراضي الرطبة بالقرب من ينبع وسبخة الفصل، مع ظهور ريش التكاثر لدى بعض أفرادها. ما يشير إلى احتمالية تكاثره هناك. **الموئل:** على بُعد أقل من 2,000 م في الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، أو قليلة الملوحة وقنوات التصريف وأحواض ترسيب مياه الصرف والمناطق المرورية والمواقع الغنية، مثل مزارع الألبان التي تقام بالقرب من المياه. كما يوجد أحياناً في الخلجان المحمية الغنية بأشجار المانغروف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الأسماك والبرمائيات والزواحف وأنواع عديدة من اللافقاريات، بما في ذلك القشريات والرخويات. وغالباً ما يرعى هذا الطائر ضمن مجموعة تتراقص بنشاط، جبهة ونهاياً في المياه الضحلة مع رفع أجنحتها لأعلى، وذلك لإخراج الفريسة، أو إرباعها لإظهار نفسها، كما يحرك قدميه في الماء لإزعاج الفريسة، وقد يخوض المياه حتى مستوى ارتفاع جسمه. **النشاط:** نهاري، **السلوك الاجتماعي:** يمكنه الرعي منفرداً رغم أنه عادة ما يتجمع في مجموعات متفرقة، ويحتم على الأشجار مع البلشونيات الأخرى. **سلوك التكاثر:** لم يُوثق تكاثره في المملكة، مع احتمالية حدوث ذلك، **باج الجناح:** 86 - 104 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجَل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: سبخة الفصل

**بلشون أبيض كبير**

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:

بلشون كبير غربي
Ardea alba
Great White Egret
غير مهدد
غير معروف
-
-
80 - 104 سم / 700 - 1,700 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ يوجد التعداد المقيم منه في المكسيك وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا، أما التعداد المهاجر فيتكاثر في الولايات المتحدة الأمريكية وشرق أوروبا، ومن أفغانستان وصولاً إلى الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً داخل نطاق التعداد المقيم. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محتمل، مهاجر متكاثر محتمل. يوجد هذا البلشون الطويل الرشيقي جداً في أنحاء كثيرة من المملكة بوصفه مهاجراً عابراً (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، وزائراً شتوياً شائعاً محلياً (نوفمبر - فبراير)، ولعله الأكثر تعداداً على ساحل الخليج العربي، وفي الأراضي الرطبة المجاورة. ويقضي بعض أفراده الشتاء بالقرب من الرياض، وربما في جنوب تهامة أيضاً. ولما كان هناك تعداد قليل متكاثر على سواحل إيران، فإنه قد يتكاثر أيضاً في المنطقة الشرقية. **الموئل:** الأراضي الرطبة والمجاري المائية والبحيرات وبرك المياه والخزانات والأحواض وأشجار المانغروف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً ما يتكون من الأسماك، ويقتات أيضاً على الفقاريات واللافقاريات الصغيرة الأخرى. لا يعتمد هذا الطائر إلى التخفي، إذ غالباً ما يفضل الوجود في العراء، لا سيما على امتداد أطراف الأراضي الرطبة، حيث يتسنى له رصد فرائسه، أو مطاردتها خلسة وتلقفها بمنقاره. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** تم الإبلاغ عن أسراب تتكون من 30 طائراً مهاجراً عابراً عند ساحل البحر الأحمر. كما تم الإبلاغ عن وجود 250 منه في سبخة الفصل خلال فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** لم تُوثق حالات تكاثر في المملكة، مع احتمالية حدوث ذلك. **ملاحظة:** على الرغم من كبر حجمه، إلا أنه لا يزال الخلط بين هذا الطائر وطيور البلشون البيضاء الأخرى في المملكة أمراً ممكناً، خاصة عندما يكون منفرداً، أو لدى رؤيته من مسافة بعيدة. **باج الجناح:** 140 - 170 سم.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.


أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.

أثناء بحثه عن فريسته، يتهدى هذا الطائر الطويل ناصع البياض على نحو أيق، ما يخوله بالتأكيد أن يوصف بطائر البلشون الأكثر أناقة.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجَل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: سبخة الفصل



مطريقي الرأس*Scopus umbretta*

Hamerkop

غير مهدد

مستقر

معرض للانقراض

يتناقص

50 - 56 سم / 415 - 430 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




طائر بالغ



أحد الأعشاش

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** يمكن العثور على هذا الطائر الاستثنائي والفريد في سفوح المرتفعات والأجزاء الجنوبية الغربية (جنوب الطائف). **الموئل:** يوجد فوق 250 م في موائل المياه العذبة، بما في ذلك المستنقعات ومجاري المياه الجبلية والخزانات والمناطق المغمورة بالمياه وقنوات تصريف الري. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتضمن الضفادع وصغارها والأسماك الصغيرة، مدعومة بالقشريات والديدان واللافقاريات الأخرى التي يلتقطها بمنقاره أثناء الخوض في المياه الضحلة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُشاهد في أزواج، أو مجموعات صغيرة، رغم أنه قد يشكل أسراباً تضم أقل من 30 في الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** يُبنى على شكل قبة ضخمة (بارتفاع 150 سم، وقطر 150 سم)، مع مدخل جانبي منخفض ومنحدر نحو الأسفل، ويتكوّن من العيدان والمواد النباتية والورق والخيزق المخلوطة بالطين. وتكون الغرفة الداخلية مطلية بالطين، في حين تكون القاعدة مبطنة بالأعشاب وأوراق الشجر. ويتم وضع العش على ارتفاع 3 - 8 م فوق سطح الأرض فوق شجرة، أو حافة منحدر صخري، وبالقرب من المياه. وغالباً ما تبني الأزواج أعشاشاً متعددة، قد لا يُستخدم بعضها أبداً، فيما يُستخدم البعض الآخر لسنوات عدة، أو قد يُبنى بعضها سنوياً، وأحياناً تكون متاخمة، أو ملتصقة بأخرى قديمة. **البيض المحضون:** 2 - 5 بيوض. **الحضانة:** 30 يوماً. **فترة التعشيش:** 50 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** يُعدّ هذا الطائر العضو الوحيد في عائلته. **حالة الحماية:** تم إدراجه في قائمة الفئات المعرضة للانقراض في شبه الجزيرة العربية لعدم وجود أيّ تعداد فرعي منه يضم أكثر من 1,000 طائر بالغ، ناهيك عن احتمالية تناقص أعداده بفعل تدهور موائله، وتزايد معدلات الإزعاج في الأراضي الرطبة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,500
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

بلشون الصخر

غرنوق صخر هندي

Egretta gularis

Western Reef-egret

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

55 - 65 سم / 280 - 710 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




بلشون الصخر أبيض

النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ توجد التعدادات المقيمة منه على طول المناطق الساحلية في غرب وشرق أفريقيا ومدغشقر وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى الهند، أما التعدادات المشتتة فتتقضي الشتاء على بُعد 1,000 كم شرق أفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب الهند حتى سريلانكا، علماً أنه يوجد على نطاق واسع حول سواحل شبه الجزيرة العربية، وسبق له التكاثر أيضاً في جميع بلدانها. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر ونادر.** يتكاثر بلشون الصخر الأنيق، الأبيض أو رمادي اللون، على طول سواحل وجزر الخليج العربي والبحر الأحمر. **الموئل:** يفضل موائل المياه المالحة، بما في ذلك الجزر والخلجان الموحلة أو ضحلة المياه، والأشرطة الرملية وغابات المانغروف. كما يوجد أحياناً على اليابسة في مياه المجاري والبرك المائية والبحيرات وأحواض القصب. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل رئيس على اللافقاريات المائية والأرضية، والقشريات والأسماك الصغيرة، وهو يصطاد بنشاط، حيث يحزق المياه الضحلة بقدميه غالباً لطرد الفرائس إلى السطح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يربى منفرداً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وتعشش في مستعمرات تضم حتى 150 زوجاً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش، وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** منصة مكونة من العيدان (وأحياناً الأعشاب البحرية أو الطحالب)، ومبنية أحياناً على ارتفاع يراوح بين 1 و3 م فوق سطح الأرض فوق شجيرة ما، أو فوق الأرض، أو منحدر صخري، أو بناية مهجورة. وعادةً ما تكون الأعشاش الأرضية أكثر متانة من تلك المبنية فوق الأشجار. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 26 - 28 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش وتتسلق الفروع المجاورة في غضون 4 أسابيع، وتطير بعمر 7 أسابيع. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باع الجناح:** 86 - 104 سم.



بلشون الصخر رمادي



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 600
منطقة النشاط: ساحل الخليج العربي

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر


بجعة بيضاء	الاسم العربي:
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	الاسم العلمي:
Great White Pelican	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
148 - 175 سم / الذكر 9,000 - 15,000 غم؛ الأنثى 5,400 - 9,000 غم (أخف وزناً بنسبة 40%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال غرب الهند، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر بشكل متفاوت من جنوب شرق أوروبا حتى كازاخستان، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في أفريقيا وشمال الهند، وحول البحر الأحمر. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، زائر شتوي محلي. يُعدُّ هذا الطائر العملاق مهاجراً نادراً الوجود، وهو أكثر شيوعاً في الخريف (سبتمبر - نوفمبر)، علماً أنه تم تسجيله في جميع أنحاء المملكة تقريباً، باستثناء الربع الخالي، وهو يقضي الشتاء بانتظام في جنوب تهامة حتى داخل اليابسة بمسافة تصل إلى 30 كم. كما تم توثيق زيارته للمملكة مرات عدة في أشهر الصيف. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أي مكان تقريباً أثناء موسم الهجرة، غير أنه يفضل الأراضي الرطبة على وجه الخصوص. كما يقضي فصل الشتاء في الوديان والسدود والخزانات والخلجان وأشجار المانغروف. **سلوك**

يُعدُّ هذا البجع الضخم أكبر طائر قادر على الطيران في المملكة، وهو رابع أثقل طائر في العالم. كما يحل في المرتبة الثانية بالنسبة لطول جناحيه. إنه طائر هائل الحجم!

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى على الأسماك (حتى وزن 600 غم) التي يصطادها في المياه الضحلة بضربة عنيفة من منقاره الكبير، وهو يتغذى في مجموعات بانتظام، وغالباً ما يلجأ إلى أسلوب التعاون لزيادة فرص الصيد. **النشاط: نهاري.** **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً، أو في مجموعات صغيرة جداً، رغم تسجيل سربين منه، ضم أحدهما 81 طائراً في تبوك، والآخر 275 طائراً في محمية الملك سلمان (حرة الحرة). **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 226 - 360 سم. **ملاحظة:** يتميز هذا الطائر بأكثر طول جناحين، وهو قريب ليكون صاحب أكبر طول جناحين بين طيور العالم (قد يأتي فقط بعد القرطاس الجوال (*Diomedea exulans*). ويمكن تمييز الطائر البالغ من هذه الفصيلة عن طائر البجع الرمادي، من اللون الأبيض تحت جناحيه عند الطيران، إذ يمتزج بشكل بارز مع الريش الأسود (تظهر هذه المنطقة باللون الأبيض، أو الرمادي لدى البجع الرمادي).



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي




بجعة وردة ظهر	الاسم العربي:
<i>Pelecanus rufescens</i>	الاسم العلمي:
Pink-backed Pelican	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
معرض للانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
125 - 132 سم / 3,900 - 7,000 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم، متكاثر ونادر. يتكاثر هذا الطائر ذو المنقار الكبير ضمن 10 - 16 مستعمرة في الجزر، وعدد قليل من مواقع البر الرئيسى قبالة المملكة (جنوب الليث)، واليمن. **الموئل:** يوجد في جزر الخلجان والضحلة والبحيرات الواقعة على طول جنوب البحر الأحمر، بينما يتكاثر في غابات المانغروف الكثيفة. ويوجد أحياناً داخل اليابسة بمسافة تصل إلى 100 كم في الوديان والسدود. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على الأسماك الأقل من 300 غم عادةً، وقد تصل إلى 400 غم في بعض الأحيان. وغالباً ما يتغذى بالتعاون مع طيور أخرى، حيث تعمل جميعها في انسجام تام لحشر الأسماك في حلقة ضيقة محاطة بطيور البجع التي تغمر مناقيرها في الماء لصيدها. **النشاط: نهاري.** **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يعرى منفرداً، أو في أسراب صغيرة متفرقة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات تضم 12 - 100 زوج، وبين كل عش وآخر مسافة تراوح بين 1 و3 م. **الأدوار**

الأبوية: تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر، بينما يتشارك كلا الأبوين في حضنة ورعاية الصغار. **العش:** منصة مكوّنة من العيدان، ومبطّنة بالفصينات وأوراق الشجر، ومبنية على ارتفاع 3 - 4 م فوق سطح الأرض، فوق شجرة مانغروف أو شجيرة منخفضة أحياناً. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 30 يوماً. **فترة التعشيش:** 84 يوماً. **الحضنة:** أحادي الحضنات. **باغ الجناح:** 216 - 290 سم. **حالة الحماية:** تم إدراجه ضمن قائمة الفئات المعرضة للانقراض في شبه الجزيرة العربية، لعدم وجود أيّ تعداد فرعي منه يضم أكثر من 1,000 طائر بالغ. وقد تتناقض أعداده بفعل عمليات إزالة أشجار المانغروف لمشروعات التطوير الساحلي. كما أنه عرضة للتراكم الحيوي للسموم في أنسجة جسمه، ما قد يضر بعملية تكاثره.

يعشش هذا الطائر الضخم فوق قمم أشجار المانغروف ضمن مستعمرات تضم حتى 100 زوج، ويفصل بين كل عش وآخر أقل من ثلاثة أمتار.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 400
منطقة النشاط: كورنيش جازان



الغاق الكبير

Phalacrocorax carbo
Great Cormorant

غير مهدد
يتزايد
-
-
100 - 80 سم / 1,810 - 2,810 غم
الحجم والوزن:

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:


حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب وشرق أفريقيا والهند وأستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في كل من أميركا الشمالية وغرينلاند وأوراسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً حول غرب أوروبا، والبحر الأبيض المتوسط وجنوب آسيا، فضلاً عن جزء كبير من شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** **زائر شتوي شائع، زائر صيفي غير شائع.** يشيع هذا الغاق اللامع في الخليج العربي والأراضي الرطبة المتاخمة خلال الشتاء، مع وجود أعداد صغيرة في الأراضي الرطبة الداخلية وعلى طول ساحل البحر الأحمر، وغالباً ما تبقى أعداد قليلة منه في فصل الصيف. **الموئل:**

يوجد حيث المياه الشاطئية، لا سيما الخلجان والمضائق المحمية، كذلك حطام السفن البحرية والمنصات النفطية، ويوجد أيضاً، في الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة والمائلة للملوحة بالقرب من السواحل، خاصة لأغراض الشرب والاستحمام، كما يُوجد بشكل متزايد في الأراضي الرطبة الداخلية التي تحتوي على مخزون سمكي. **سلوك البحث عن الغذاء:**

النظام الغذائي: الأسماك (بطول 10 - 15 سم عادةً، ويحد أقصى 40 سم) التي يلتقطها من خلال الغطس في الماء ومطاردها. وعادةً ما يغطس إلى عمق يراوح بين 10 - 12 م (الحد الأقصى للعمق المسجل 30 م) ويظل تحت الماء لنحو 45 ثانية في المتوسط، رغم أن البعض قد يتجاوز في الغطس دقيقتين ونصف. ويقنات أيضاً، على القشريات والبرمائيات في المياه العذبة. **النشاط:** نهارى، ويلي جزئياً (يصطاد أحياناً في الليل). **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون هذا النوع اجتماعياً، حيث تم تسجيل المئات منه في الجبيل وسبخة الفصل، كما تم الإبلاغ عن مجامع تضم أكثر من 1,000 طائر في الأشجار بالقرب من الظهران، ومع ذلك فإنه يصطاد الأسماك منفرداً، ولم يتم تسجيله وهو يتغذى بشكل جماعي في شبه الجزيرة العربية. علاوةً على ذلك، لا يرتبط بالأنواع الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** لا يبني هذا الطائر في أفضل حالاته فوق اليابسة ولدى جثومه فوق الأشجار، إذ تمثل المياه شريان الحياة بالنسبة له، وهو في الوقت ذاته طيار بارع يتميز برفرفة أجنحته البطيئة والقوية. **باع الجناح:** 130 - 160 سم.

بعد البحث عن الطعام في البحر، يجلس هذا الطائر على مجثم بارز باسطاً جناحيه لتجفيفهما، وتسخين السمكة الكبيرة الباردة التي ابتلعها للتو.



زائر شتوي، زائر صيفي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج القطيف

**أطيش بني**

Sula leucogaster
Brown Booby

غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
مستقر
64 - 74 سم / 724 - 1,550 غم. الذكر 1,077 غم؛ الأنثى 1,491 غم (أثقل وزناً بنسبة 40%)
الحجم والوزن:

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مشتت؛ يتكاثر في الجزر المنتشرة على نطاق واسع في المحيطات والبحار الاستوائية، بما في ذلك المناطق المحيطة بشبه الجزيرة العربية، حيث يتغذى في المياه المحيطة بها أيضاً. **حاليته بالمملكة:** **مقيم متكاثر غير شائع.** يتكاثر هذا الطائر البحري المذهل في البحر الأحمر، وقد تم تسجيل وجوده في الخليج العربي رغم ندرة حدوث ذلك. **الموئل:** يُفضل الموائل البحرية، فيتغذى في البحر ويتكاثر فوق الجزر التي تخلو من مصادر التهديد في البحر الأحمر، والتي يتشكل بعضها من تلال رملية مرتفعة، والبعض الآخر من منصات صخرية مرجانية مرتفعة ومسطحة إلى حد ما، وأخرى من تلال منحدره نسبياً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على صغار الأسماك (بما في ذلك الأسماك الطائرة)، حيث يصطاد الأسماك الطائرة في الجو بالقرب من السطح، والحبار الذي يلتقطه عن طريق الغطس السريع في البحر. وعادةً ما تنطلق هذه الطيور البحرية في رحلات بحث عن الغذاء يمكن أن تستمر حتى 14 ساعة، فتتوغل في البحر بعيداً عن الشاطئ بمسافة تتجاوز 100 كم. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش بشكل منفرد، أو في مستعمرات متفرقة تضم نحو 130 عشاً في كثير من الأحيان، مع تباعد الأعشاش عن بعضها بعضاً، إما بمسافة 3 - 7 م (على سبيل المثال، في الجزر الصغيرة)، أو بمسافات

واسعة ضمن صفٍ يقع فوق أعلى مستوى للمد مباشرة (في الجزر الكبيرة). **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** حفرة فوق الأرض، محاطة بحافة ضحلة من الانقراض المرجانية، وقطع العشب البحري أو بقايا حطام السفن. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 43 يوماً. **فترة التعشيش:** 85 - 105 أيام. **الحضنة:** أحادي

الحضنات. **ملاحظة:** عادةً ما تضع الأنثى بيضتين تفقسان بشكل غير متزامن، حيث يقوم الفرخ الأول بقتل الفرخ الأصغر عمراً مباشرةً بعد خروجه من البيضة، وهذه نوعاً ما سياسة ضمان البيضة، بحيث إذا لم تُكتب النجاة للبيضة الأولى، ستتمكن البيضة الثانية من العيش. **باع الجناح:** 132 - 150 سم.



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,000
منطقة النشاط: جزر قرسان




كروان أوراسي	الاسم العربي:
<i>Burhinus oedicephalus</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Thick-knee	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
40 - 44 سم / 290 - 535 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في شتى أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وباكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في غرب أوروبا حتى كازاخستان وإيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في شمال وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر محدود، زائر شتوي نادر. يوجد هذا الطائر ذو العينان الواسعتان باللون الرملي على نطاق واسع في المملكة بوصفه مهاجراً عابراً (فبراير - أبريل، سبتمبر - نوفمبر)، وزائراً شتوياً (نوفمبر - فبراير)، ومقيماً

متكاثراً. **الموائل:** الأراضي المكشوفة، بما في ذلك الصحارى التي قد تكون صخرية، أو التي توجد فيها زرع حجرية، وأحياناً شجيرات قصيرة متناثرة. قد يُعثر عليه أيضاً في مزارع الألبان أحياناً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات وبعض الفقاريات الصغيرة، مثل السحالي والثعابين، ومنها الحية المقرنة العربية السامة التي يلتقطها من الأرض أثناء المشي ببطء. **النشاط:** ليلي وشفقي، ونهاري جزئي (يمكن أن يكون نشيطاً في ظل الشجيرات نهاراً مستخدماً قدرته على التمويه والتخفي للحيلولة دون اكتشافه). **السلوك الاجتماعي:** يكون منفرداً أثناء البحث عن الغذاء، رغم تسجيل ما يقرب من



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100
منطقة النشاط: صحراء الدهناء




الغاق السقطري	الاسم العربي:
<i>Phalacrocorax nigrogularis</i>	الاسم العلمي:
Socotra Cormorant	الاسم الشائع:
معرض للانقراض	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
معرض للانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
76 - 84 سم / غير معروف	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية ويتكاثر فقط في جزر الخليج العربي، قبالة جنوب شبه الجزيرة العربية وسقطري. كما يتغذى في المياه على مسافة 200 كم من مواقع التعشيش. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. ويتكاثر نحو ثلث طائر الغاق السقطري في المياه الإقليمية السعودية بالخليج العربي، وهو يُعدُّ أحد الأنواع الشاردة في البحر الأحمر. **الموائل:** بحري، إذ يتغذى في البحر، ويتكاثر فوق الجزر التي تخلو من مصادر التهديد والمفترسات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على الأسماك الصغيرة من خلال الغطس في الماء ومطاردها (حتى عمق 24 م، ويستمر تحت الماء مدة 76 ثانية). **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يتغذى ضمن أسراب كبيرة من البحر وبشكل تعاوني في مياه الشواطئ. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات كثيفة تضم عادة 1,000 - 37,000 زوج، بنسبة ازدحام قدرها 1.5 عش لكل متر مربع. ويضع بيوضه بصورة متزامنة في بعض، أو كل المستعمرة. كما تنتقل مستعمراته بين الجزر، غالباً بعد استخدام الموقع ذاته لسنوات عدة. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي. وفي الأنواع المماثلة، تبني الأنثى العش بمواد يجمعها الذكر، بينما يتشارك الزوجان مسؤوليات حماية العش

وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة في أرض مكشوفة. **البيض المحضون:** 2-3 بيوض. **الحضانة:** غير مؤكدة (نحو 30 يوماً في الأنواع المماثلة). **الفراخ:** تهجر الصغار العش بعمر 10 أيام تقريباً، ثم تكون رياض عدة لتطير بعد ذلك عندما تبلغ 53 يوماً تقريباً. وأحياناً تاكل الفراخ الكبيرة شقيقاتها الأصغر. **الحضانة:** أحادي الحضانة. **باغ الجناح:** 102 - 110 سم. **حالة الحماية:**

هذا الطائر معرض للانقراض عالمياً، إذ لم يتبق منه سوى 13 مستعمرة. علماً أن التعداد السعودي قد تناقص بنسبة 75% بين عامي 1980 - 1992. مع استمرار فقدانه بسبب تنمية الجزر، وإزعاج المستعمرات، وجمع البيض، والصيد، والقطف الوحشية، وابتلاع المواد البلاستيكية الموجودة بالبحر.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 35,000
منطقة النشاط: خليج سلوى

آكل المحار

محاري أوراسي
Haematopus ostralegus
Eurasian Oystercatcher
قريب من التهديد
يتناقص
-
-
الحجم والوزن: 40 - 48 سم / 425 - 820 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أوراسيا، من آيسلندا حتى كازاخستان وشرق الصين وروسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً على طول شواطئ أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، والهند والصين، وهو زائر شتوي شائع وواسع الانتشار في جميع مناطق شبه الجزيرة العربية.

حالته بالمملكة: زائر شتوي غير منتظم. يوجد هذا الطائر الصغير الجذاب فوق سواحل البحر الأحمر، لا سيما في جهة الشمال، بينما يهاجر بعضه فوق أراضي شبه الجزيرة العربية البرية، أقلية منه تبقى خلال الصيف. **الموئل:** يُفضل المسطحات الطينية والسبخات، والشواطئ الرملية، أو الصخرية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على المحار وغيره من الأصداف، لكنه يقنات أيضاً على البطلينوس وأنواع الحلزون البحري والديدان وسرطان البحر. ويلجأ لمجموعة متنوعة من الأساليب للعثور عن فريسته

يفضل آكل المحار تناول المحار الذي يراوح طوله بين 30 - 45 ملم، بكل بساطة لصعوبة كسر المحار الأكبر حجماً، وسهولة كسر المحار الأصغر حجماً الذي لا يتطلب حتى عناء طرقة.

ويخرجها وأكلها، بما في ذلك الطرقة، والتقدير، والتقصي، والطعن بمنقاره. ولأن الأصداف تكبر وتصبح أقسى مع تقدم العمر، فإن أفراد آكل المحار يتعلم كيفية انتقاء فرائسه التي تكون كبيرة بما يكفي لتكون وجبة مشبعة، ولكن ليست كبيرة للغاية بحيث تتطلب الكثير من الجهد لفتحها. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يوجد في أسراب بالمملكة. بشكل عام، يوجد هذا الطائر في مجموعات صغيرة متفرقة، على الرغم من تسجيل 214 طائراً مرة واحدة في عنك (بالقرب من جزيرة تاروت) عام 1991. كما يرتبط هذا الطائر ارتباطاً حراً بالطيور المخوفة أثناء البحث عن الغذاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج جازان

**كروان أرقط**

Burhinus capensis
Spotted Thick-knee

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
37 - 44 سم / 375 - 610 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء حزام الغابات الاستوائية)، وجنوب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر جداً. يوجد هذا الطائر الأرقط طويل الساقين واسع العينين في جنوب تهامة والسفوح السفلية جنوب جدة. **الموئل:** يوجد بشكل رئيس على ارتفاع دون 1,000 م (لكن قد يصل أحياناً إلى 2,000 م) في المناطق المسطحة، أو الممزوجة قليلاً بالأراضي

الفاحلة المتموجة ذات الشجيرات الخفيضة، لا سيما أراضي أشجار الطلح المفتوحة ذات الأدرج المنخفضة، ومناطق الحشائش والأعشاب ذات البقع الرملية، أو الحصى الجرداء. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غير معروف جيداً. ولكن يُرجح أنه يتغذى بشكل رئيس على الحشرات الملتقطة من الأرض أثناء مشيه ببطء. **النشاط:** ليلي، ونهاري جزئي (يكون نشطاً أحياناً حتى في الأيام التي يكون النهار فيها غائماً). **السلوك الاجتماعي:** عادة يتغذى منفرداً، أو في أزواج، رغم أنه قد يجثم بشكل جماعي مع نحو 50 طائراً (وفقاً لما تم تسجيله في سلطنة عُمان). **سلوك**

تمنح العينان الكبيرتان المنتفختان في جانبي رأس الكروان رؤية بانورامية شبه شاملة، تاركة بقعة عمياء بمقدار 15 درجة خلف الرأس.

التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين في حضانة ورعاية الصغار. **العش:** حفرة ضحلة فوق سطح الأرض، غير مبطن أو مبطنه بالقليل من بقايا المواد النباتية، ومخفية بين الحشائش والأعشاب، وغالباً ما تكون تحت شجيرة تبسط ظلها في جزء من النهار أو في معظمه. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 24 يوماً. **الفرار:** تهجر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير في سن 4 - 5 أسابيع. **الحضنة:** من المحتمل أن تكون حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي




أبو المغازل

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تنتشر التعدادات المقيمة منه عبر الأمريكتين وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، ومن الهند حتى نيوزيلندا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جنوب أوروبا حتى اليابان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في نطاق التعداد المقيم. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يشيع وجود طائر «أبو المغازل» ذي الساقين القرمزيتين أثناء عبوره المملكة (مارس - أبريل، أغسطس - سبتمبر)، وعلى مدار الشتاء. وقد أسس مجموعات له في شبه الجزيرة العربية قرابة عام 1952، فيما تزايد انتشاره بصورة مطردة منذ ثمانينيات القرن الماضي مع تزايد الأراضي الرطبة الاصطناعية. **الموائل:** الأراضي الرطبة الضحلة ذات المياه العذبة، أو قليلة الملوحة، لا سيما بحيرات مياه الصرف المعالجة بأحواض الترسيب المفتوحة، أو المستنقعات شبه المفتوحة.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,500
منطقة النشاط: الأراضي الرطبة في بقيق

**نكات أبقع**

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شرق وجنوب أفريقيا، وبشكل متفاوت يمر عبر أنحاء شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى باكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من غرب أوروبا مروراً بآسيا الوسطى ووصولاً إلى شمال شرق الصين، ويقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق الصين. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد على نطاق واسع في المملكة أثناء هجرته (مارس - أبريل، أغسطس - أكتوبر)، وخلال الشتاء (نوفمبر - فبراير)، ويتكاثر في المنطقة الشرقية. **الموائل:** يتكاثر في مواقع مياه الصرف الضحلة المفتوحة ذات التلال الجرداء، أو السبخات الرطبة. ويقضي الشتاء في المواقع الساحلية المحمية الضحلة، لا سيما البحيرات المالحة، علماً أن الطيور المهاجرة قد تستريح في أي أرض رطبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات المائية التي يلتقطها من المياه الضحلة، أو عبر تحريك منقاره المعقوف لأعلى في المياه وتحسُّس الفريسة. **النشاط:** نهارى، وليلي غالباً. **السلوك الاجتماعي:** يتغذى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة يصل عددها إلى 10 أفراد أحياناً، رغم تسجيل المئات منه بالجيبيل في الشتاء، وتسجيل أسراب يصل عدد أفرادها إلى 40 طائراً أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج موسمياً (تتشكل الروابط الزوجية في أواخر الشتاء)،

تعشُّش في مستعمرات صغيرة يصل عددها إلى 120 زوجاً، رغم أنها غالباً ما تضم أقل من 4 أزواج. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطن، أو مبطنة بالعشب وسيقان النبات فوق سطح الأرض، وتُشيد في منطقة مفتوحة من الطين، أو الرمل العاري الجاف، أو فوق جزيرة منخفضة، أو بين شجيرات قصيرة متناثرة، أو فوق سبحة. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:** 22 - 24 يوماً. **الفراخ:** تجري الفراخ وتطعم نفسها في غضون ساعات من الفقس، وتطير بعد 32 - 35 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

تتبنى هذه الطيور ما يزيد على 10% من فراخها، ويتكبد الأبوان بالتبني تكاليف تربية الفراخ الضالة من أجل الحد من خطورة افتراس صغارها، علماً أن الأرقام تثبت معدّل السلامة الذي يحققه هذا السلوك.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200
منطقة النشاط: سبحة الفصل



زقزاق مذهب أوراسي*Pluvialis apricaria*

Eurasian Golden Plover

غير مهدد

يتزايد

26 - 29 سم / 157 - 312 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال غرب أوروبا والمناطق العليا في القطب الشمالي، من آيسلندا حتى روسيا الوسطى، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً إلى الغرب من أوروبا، والبحر الأبيض المتوسط وجنوب بحر قزوين. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. تقع المملكة جنوب نطاق التشتية الطبيعي بالنسبة له، ولذلك فإن هذا الزقزاق المذهب الأوراسي ما هو سوى زائر نادر للمملكة، علماً أن السجلات المتوافرة تمت في سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر. كما تبين وجود هذه الطيور في اليابسة أحياناً، وذلك وفقاً للسجلات في كل من الرياض والثمامة، إذ بقيت بعض تلك الطيور أسابيع عدة فيها. **الموئل:** يفضل المسطحات الطينية الساحلية والبحيرات المالحة. كما يوجد في الموائل حيث المياه العذبة، بما في ذلك البرك الضحلة الغنية بالمغذيات والأطراف الموحلة للمجاري المائية بطيئة الجريان. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي:

مجموعة متنوعة من اللافقاريات، ومنها الحشرات والديدان والعناكب والرخويات والقشريات التي يصطادها عبر التقاط الطعام من السطح، أو سبر الوحل، أو الجري في مطاردة فريسة سريعة الحركة. **النشاط:** نهاري، وليلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يرضى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة جداً. وغالباً ما يتم الخلط بينه وبين الطيور المخوذة الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمتلك هذا الطائر منقراً أدق وأقل متانة من طائر زقزاق أرمد. يُعدُّ طائراً خجولاً، ولدى استشعار الخطر يقف منتصباً دون حراك. وفي حال إزعاجه، فإنه يطير مسرعاً وبقوة، وقد لا يتخذ أي منطقة قريبة مجدداً لتوطنها. **باغ الجناح:** 67 - 76 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: خليج القطيف

**زقزاق أرمد***Pluvialis squatarola*

Grey Plover

غير مهدد

يتناقص

27 - 31 سم / 174 - 320 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



زقزاق أرمد يستعد للتكاثر


النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر على امتداد الأقطاب القطبية لأمريكا الشمالية وأوراسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 - 12,000 كم جنوباً على طول معظم سواحل العالم الاستوائية والمعتدلة مناخياً. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي غير منتظم. يُعدُّ هذا الطائر المرقط متوسط الحجم أسود الإبطين مهاجراً عابراً شائعاً ومنتشراً (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، وزائراً شتوياً (أكتوبر - مارس) في أنحاء المملكة، ويمكن العثور عليه في جميع المناطق الساحلية، لا سيما أثناء الهجرة. ويُحتمل أنه يهاجر عبر شبه الجزيرة العربية على نطاق عريض، رغم قلة السجلات التي توثق وجوده داخل اليابسة. وقد تقضي بعض أفراد الصيف على أحد السواحل. **الموئل:** المناطق الساحلية، خاصة المسطحات الطينية الناتجة عن المد والجزر والخلجان الرملية وغابات المانغروف وبرك المياه الضحلة. ويوجد أحياناً على اليابسة، حيث المياه الراكدة وأحواض مياه الصرف، وغير ذلك من الأراضي الرطبة.

من اللافت للنظر أن هذا الطائر يقضي صيفه في أماكن تكاثره في القطب الشمالي، ويقضي شتاءه في مناطق الرعي الاستوائية والمعتدلة مناخياً حتى 12,000 كم جنوباً.

فوق السواحل. إضافة إلى الحشرات وغيرها من اللافقاريات داخل اليابسة. ويتغذى عن طريق سبر الوحل أو الرمل، فيلتقط طعامه من السطح ويحفر بمنقاره. كما يخوض المياه الضحلة، ويسبح أحياناً. **النشاط:** نهاري، وليلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في مجموعات صغيرة تتألف من 30 طائراً بعد أقصى. وفي حال اجتمعت أعداد أكبر في موقع معين، تقيم الأفراد مناطق رعي وتدافع عنها خلال الشتاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عادة ما يكون خجولاً وحذراً، وعندما يشعر بالانزعاج يطير مسرعاً وبقوة. ويمكن للمراقبين الحريصين العثور على عديد من هذه الطيور، أثناء الربيع، وهي تكتسي بريش التكاثر الأسود والرمادي الفضي الجميل أثناء توجهها نحو الشمال إلى أراضي تعشيشها القطبية. **باغ الجناح:** 71 - 83 سم.



فرخ زقزاق أرمد



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: خليج جازان



زقزاق أغبر	الاسم العربي:
<i>Eudromias morinellus</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Dotterel	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
20 - 22 سم / الذكر 86 - 116 غم؛ الأنثى 99 - 142 غم (أثقل وزناً بنسبة 20%)	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر فوق قمم الجبال الجرداء وتندرا أوراسيا، من الجزر البريطانية حتى ألاسكا. بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 10,000 كم في الجنوب والجنوب الغربي في شمال أفريقيا مروراً بسيناء وصولاً إلى العراق وشمال شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر وغير منتظم.** يمكن أن يكون هذا الـ «زقزاق» الضخم بديع الزينة شائعاً محلياً لكونه يجوب السهول الشمالية في المملكة خلال الشتاء. وربما يكون طائراً رحالاً يفتش عن مناطق تغذية مناسبة. كما قد يغيب في بعض السنوات، وتوجد المئات منه في سنوات أخرى. وقد يرتبط ظهوره بالسنوات الرطبة، حيث تكون فرائسه من اللافقاريات وفيرة. **الموئل:** السهول الجرداء ذات النباتات المتناثرة القصيرة.

في هذا النوع، يقدم الذكر الرعاية الأبوية كاملة، بينما تتنافس الإناث على جذب اهتمام الذكور. يُذكر أن الأنثى أكبر حجماً، وأكثر إشراقاً من الذكر.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات، بما في ذلك الخنافس ويرقات الذباب، والفرشاشات والعت والجنادب، إلى جانب القواقع والقشريات. **النشاط:** نهاري، ويلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** عادةً

ما يوجد في أسراب في فصل الشتاء، وقد تم تسجيل نحو 400 طائر في أحد شهور ديسمبر بالدبدبة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يكون هذا الطائر المخوض أليفاً جداً في بعض الأحيان، وعادةً ما يكون غير ظاهر حتى في موائله الطبيعية الجرداء. كما يتميز بعدم طيرانه بمجرد إزعاجه؛ إذ يظل ساكناً أو يمشي بعيداً بشكل تدريجي، ثم ينطلق فحلقاً بسرعة وعلى ارتفاع منخفض في سرب صغير، ليستقر بعد ذلك عادةً على بُعد مئات الأمتار. وتتميز أنثى هذا الطائر بـكبر حجمها وإشراق وزخرفة ريش التكاثر لديها، مقارنة بالذكر. **باغ الجناح:** 57 - 64 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الدبدبة




زقزاق مذهب سيبيري	الاسم العربي:
<i>Pluvialis fulva</i>	الاسم العلمي:
Pacific Golden Plover	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
23 - 26 سم / 100 - 228 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر فوق الدائرة القطبية من روسيا الوسطى إلى ألاسكا، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 7,000 - 13,000 كم جنوباً من القرن الأفريقي مروراً بالهند ووصولاً إلى أستراليا وجزر المحيط الهادئ. **حالته بالمملكة:** **مهاجر عابر محدود، زائر نادر وغير منتظم.** يوجد هذا الـ «زقزاق» الذي يبدو لطيفاً ورشيقاً للغاية، في المملكة أثناء الهجرة، ربما على طول امتداد كلا الساحلين بالكامل (بما في ذلك جزر قُرسان)، ونادراً ما يوجد في اليابسة. وقد يوجد أيضاً في جميع الشهور بوصفه زائراً نادراً وغير منتظم. **الموئل:** السواحل الطينية المفتوحة والبحيرات المالحة وبحيرات المياه العذبة الموجودة داخل اليابسة والبحيرات ذات الشواطئ الطينية. كما يوجد أحياناً في الحقول الزراعية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، ومنها الحشرات والرخويات

والقشريات والديدان، وأحياناً البذور، حيث يلتقط الفريسة من السطح، أو يسر الوحل بينما يتهدى، وقد يجري أحياناً لملاحقة فريسة أسرع في الخطى. **النشاط:** نهاري، ويلي جزئياً. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** خجول، وعادةً ما يلزم المجموعات الصغيرة عند التحرك أو الجنوم، ولكن أقصى تجمعاته تسجلاً وصل إلى 30 طائراً بالقرب من الدمام. كما يندر وجوده في اليابسة، حيث لم يُسجَل أكثر من واحد أو اثنين معاً. كما أنه لا يتردد في الرعي مع الطيور المخوضة الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 60 - 72 سم.



مهاجر عابر، زائر غير منتظم

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: ينبع



زقزاق مطوق صغير*Charadrius dubius*

Little Ringed Plover

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتزايد

17 - 14 سم / 53 - 26 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة منه في نطاق يمتد من باكستان وصولاً إلى غينيا الجديدة، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أفريقيا ومعظم أوراسيا (تحت الدائرة القطبية الشمالية) وصولاً إلى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند وجنوب شرق آسيا واندونيسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر شائع. يوجد هذا الـ «زقزاق» الصغير الرائع بشكل رئيس بوصفه مهاجراً عابراً شائعاً (فبراير - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، رغم استقرار بعض الأزواج داخل المملكة للتكاثر. **الموئل:** مواقع المياه العذبة الداخلية، ويتكاثر في المناطق المفتوحة ذات التلال الرملية، أو كثرة الحصى بالقرب من المجاري المائية وبحيرات المياه العذبة ومياه الصرف المعالجة والسدود والمحاجر الرملية، أو الحصى بالقرب من المجاري المائية وبحيرات المياه العذبة يتغذى بشكل أساسي على الحشرات الملتقطة من الأسطح الجافة، أو الرطبة، وأحياناً في المياه الضحلة. **النشاط:** نهاري، ويلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً، أو في أزواج، أو ضمن أسراب مهاجرة صغيرة تتكون من 5 - 6 طيور.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثر سنوياً: 250
منطقة النشاط: الظهران

**زقزاق مطوق شائع***Charadrius hiaticula*

Common Ringed Plover

غير مهدد

يتناقص

-

-

20 - 18 سم / 78 - 42 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء السواحل الشمالية لأوراسيا وجرينلاند، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 12,000 كم إلى الجنوب والجنوب الغربي في كل من شرق أوروبا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. هذا الطائر الصغير كثير النشاط شائع وينتشر في جميع أنحاء المملكة بوصفه مهاجراً واسع النطاق (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، وزائراً شتوياً (نوفمبر - مارس). **الموئل:** الأراضي الرطبة، بما في ذلك المسطحات الطينية الساحلية والشواطئ الرملية والصخرية والبحيرات المالحة وبرك تخير مياه الصرف في اليابسة والمجاري المائية، من ناحية أخرى، قد تعتمد هذه الطيور المهاجرة العابرة إلى أخذ قسط من الراحة في الخزانات والمناطق المغمورة بالفيضانات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، مثل الديدان والقشريات والرخويات والحشرات. وعند بحثه عن الطعام، فإنه يتقدم للأمام باتباع أساليب متنوعة، كأن يمشي ببطء شديد، أو يركض خطوات قليلة ثم يتوقف بشكل مفاجئ مؤقتاً للنظر حوله والإصغاء جيداً، وهو يلتقط الطعام من السطح، أو يسبر الوحل، أو

أثناء الشتاء، لا تستطيع هذه الطيور العثور على ما يكفيها من الغذاء في ساعات النهار، لذلك تضطر إلى مواصلة البحث عن الطعام ليلاً وإلا فإنها ستتضور جوعاً.

أنه يتخذ أسلوباً آخر، كالاندفاع بشكل مفاجئ والانقضاض على فرائسه. **النشاط:** نهاري ويلي. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أسراب، ولكنه يتميز بانتشار أسراب الرعي بسهولة واختلاطها مع الأنواع الأخرى، علماً أن أسرابه داخل اليابسة تضم 50 طائراً أو أكثر، وعادةً ما تكون مهاجرة عابرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** قد يكون هذا الطائر خجولاً، ويضطرب بسهولة في حال انزعاجه في البيئات المكشوفة، لذلك ينتصب واقفاً عند استشعار الخطر، ثم يطير مسرعاً على ارتفاع منخفض مع التحويم والهبوط على مستوى منخفض ينتهي غالباً بالركض بمجرد لمس الأرض. **باج الجناح:** 48 - 57 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: كورنيش جدة



زقزاق الرمل الصغير*Charadrius mongolus*

Lesser Sandplover

غير مهدد

غير معروف

110 - 39 سم / 18 - 21 سم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر فوق هضبة التبت مروراً بشمال الصين ووصولاً إلى شمال شرق روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 10,000 كم في الجنوب والجنوب الغربي على امتداد سواحل شرق أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية، وباكستان حتى أستراليا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي نادر. يوجد هذا الطائر المخوض الصغير في المملكة على السواحل بشكل رئيس بوصفه مهاجراً عابراً واسع النطاق (فبراير - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، ويصبح أكثر شيوعاً في الخريف، بينما يوجد في أحيان قليلة بوصفه زائراً شتوياً (نوفمبر - فبراير)، وربما تظل بعض أفراده خلال الصيف. **الموائل:** يفضل المسطحات الطينية الساحلية الكبرى والمفتوحة، أو الشواطئ الرملية في أحيان قليلة. كما يوجد أحياناً داخل اليابسة في مواقع المياه العذبة أثناء هجرته، ربما للاستراحة. **سلوك البحث عن الغذاء:** يتغذى بشكل أساسي على الرخويات والقشريات والديدان والحشرات، حيث يُظهر حذراً قليلاً عندما يطارد فرائسه في المسطحات الطينية المفتوحة، أو يركض فجأة للاستيلاء على فريسة متحركة أحياناً. كما يلتقط فرائسه من السطح الذي يسبره بمنقاره، ويخوض الماء حتى طول ساقيه. **النشاط:** نهارى، وليلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** يتغذى منفرداً، ولكنه يختلط بحرية مع الأنواع الأخرى، ويشكل أسراباً مزدحمة عند التحرك، أو الجثوم فوق المد المرتفع، وقمم الشواطئ الرملية الجافة غالباً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** كما يُظهر اسمه، فإن هذا الطائر أصغر حجماً (بما يراوح 15 - 20%)، مقارنةً بزقزاق الرمل الكبير، أقدمه أقصر ومنقاره أصغر وأرفع. كما يميل إلى الوقوف بشكل مستقيم، مقارنةً بالطيور الأكبر المشابهة لفضيلته، وله رأس أكثر استدارة والمنطقة التي فوق ظهره داكنة أكثر. كما يتمتع ذكر الرمل الصغير بصدر أبيض وأقل حدة في استدارته، مقارنةً بذكر الرمل الكبير. **باع الجناح:** 45 - 58 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي، زائر صيفي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج جازان

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

زقزاق إسكندري*Charadrius alexandrinus*

Kentish Plover

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

15 - 18 سم / 32 - 56 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



فرخ زقزاق إسكندري

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه على طول سواحل شمال أفريقيا، ومن شبه الجزيرة العربية حتى الهند والصين واليابان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من شرق أوروبا وصولاً إلى اليابان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي شرق أفريقيا وباكستان وصولاً حتى الفلبين. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يوجد هذا الطائر المخوض الصغير والنشط على نطاق واسع أثناء الهجرة (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر) وخلال الشتاء (أكتوبر - فبراير)، ويتكاثر بشكل رئيس على طول السواحل. **الموائل:** الشواطئ الرملية، لا سيما بالقرب من البحيرات المالحة، أو داخل اليابسة في


برك مياه الصرف، والمناطق الطينية في المزارع والخزانات، وبرك تجميع مياه المطر. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: القشريات والديدان والرخويات عندما يكون في السواحل، أو المياه المالحة. والحشرات والرخويات والعناكب والقشريات عندما يكون في اليابسة. **النشاط:** نهارى، وليلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في مجموعات تضم 10 - 15 طائراً، رغم تسجيل 150 طائراً منه في حرض خلال الشتاء، ونحو 2,000 - 5,000 في سبخة الفصل خلال الصيف. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش منفردة أو في مجموعات حرة. ومع ذلك، قد يترك الذكر أو الأنثى العش ليؤسس عشاً جديداً مع شريك آخر جديد. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى الحضنة خلال النهار، والذكر خلال الليل. وقبل مغادرة العش، قد يتولى كلا الأبوين دفن البيض جزئياً لحمايته من الشمس، في حين يتولى أحدهما أو كلاهما الاعتناء بالصغار. **العش:** حفرة مبطنة بالحصي، أو بقايا الأصداف، أو مخلفات النباتات في العراء، أو بين النباتات الشحيحة النامية تحت الأشجار. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 24 - 25 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير عندما تبلغ 27 - 31 يوماً. **الحضنة:** مزدوج الحضنة، مع شريك مختلف أحياناً. **باع الجناح:** 42 - 45 سم.

يتولى الأبوان حضن البيض، وبمجرد أن تفقس تخرج الفراخ، ويمكن لأي من الأبوين هجر العش لبدء عش جديد مع شريك جديد.

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير



طائر بالغ



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 13,000
منطقة النشاط: سبخة الفصل

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

زقراق قزويني
Chāradrius asiaticus
 Caspian Plover
 غير مهدد
 يتناقص
 -
 -
 الحجم والوزن: 18 - 20 سم / 60 - 91 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في سهول آسيا الوسطى (امتداداً من بحر قزوين حتى غرب منغوليا)، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 - 8,000 كم إلى الجنوب الغربي في شرق وجنوب أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. يُعدُّ هذا الزقراق الصحراوي الجميل ذو الشريط بلون الصدأ المتميز، مهاجراً محدوداً لكن منتظماً وشائعاً محلياً أحياناً عبر المملكة، لا سيما في المناطق الرملية الشمالية المفتوحة في الربيع. وبعد التكاثر، يُفترض أن تعبر معظم طيوره شمال المملكة قبل التوجه جنوباً عبر أفريقيا. **الموائل:** يفضل التجاوبف الرملية ذات الحزم العشبية والنباتات الأخرى، والمناطق المرورية أحياناً. وفي بعض الأحيان يتوقف بالقرب من برك المياه للاستراحة والتغذية. **سلوك البحث عن الغذاء:** غير معروف جيداً، غير أنه يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، مثل الجنادب والخنافس والبق والنمل ويرقات الفراشات واليرقات الأخرى. ويتغذى عن طريق خفض الرأس لالتقاط الفريسة

عوضاً عن الهجرة المباشرة


بين آسيا الوسطى وأفريقيا،

يطير هذا الطائر أولاً باتجاه

الغرب مروراً بشمال المملكة

لتجنب المناطق القاحلة فيها.

من السطح. وعندما يزور المياه لا يخوض فيها. **النشاط:** قد يكون من الطيور التي تتغذى ليلاً؛ لذا كان غير نشط أبداً على ما يبدو في الصحراء أثناء النهار. **السلوك الاجتماعي:** ينتشر على نطاق واسع في المناطق الصحراوية الشاسعة، ويمكن العثور على مئات عدة منه أحياناً في منطقة تتألف من أسراب صغيرة لا يتعدى كل منها 20 طائراً. وقد تم تسجيل أسراب تصل أعدادها إلى 500 أثناء الهجرة. كما لوحظ في معظم مشاهداته الربيعية وجوده في أزواج ربما تكون حديثة، وعائدة إلى مناطق التكاثر معاً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمكن الاقتراب منه لدى تحديد موقعه، إذ غالباً ما يفضل المشي فقط عوضاً عن الطيران. ولكن في حال طيرانه، فإنه يطير مسافة قصيرة، ثم يهبط قريباً مع الركض بسرعة مبالغ فيها بعد الهبوط. **باغ الجناح:** 55 - 61 سم.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة



زقراق الرمل الكبير
Charadrius leschenaultii
 Greater Sandplover
 غير مهدد
 يتناقص
 قريب من التهديد
 غير معروف
 الحجم والوزن: 22 - 25 سم / 55 - 121 غم




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر امتداداً من تركيا حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 10,000 كم في الجنوب والجنوب الغربي على امتداد سواحل شمال وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وباكستان وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. ينتشر هذا الزقراق على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة خلال موسم الهجرة (فبراير - أبريل، أغسطس - سبتمبر)، لا سيما على السواحل. كما يمكن العثور عليه في المناطق الساحلية خلال فصل الشتاء (أكتوبر - فبراير)، في حين تفضل تلك الطيور البقاء طوال الصيف، وتتكاثر بشكل غير منتظم. **الموائل:** يتكاثر بالقرب من المياه المالحة، أو قليلة الملوحة، وعادةً ما يكون عند مستوى سطح البحر، أو بالقرب منه، وفي المناطق المكشوفة المنبسطة الخالية من الأشجار وتلك التي تحوي شجيرات خفيفة متناثرة. كما يربى فوق المسطحات الطينية والشواطئ الرملية والصحريّة والكثبان الساحلية المنخفضة وجدول المياه المالحة خلال الصيف. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي:

يتغذى بشكل أساسي على الخنافس، إلى جانب القواقع والديدان والقشريات التي يلتقطها من المسطحات الطينية الناتجة عن المد والجزر والسبخات. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في أسراب

رعي تضم ما لا يزيد على 30 طائراً، على الرغم من تسجيل ما يزيد على 1,000 طائر في بعض الأحيان أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. الأدوار الأبوية: يتشارك الأبوان في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** حفرة ضحلة فوق الأرض مبطنة بأجزاء نباتية سواء في العراء، أو فوق أجمة صغيرة من النباتات. **البيض المحضون:** 3 بيوض.

الحضانة: غير معروفة (24 يوماً على الأقل). **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد أن تفقس بفترة قصيرة، وتطير بعد 30 يوماً. **الحضانة:** حفنة مفردة. **باغ الجناح:** 53-60 سم.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: خليج تاروت



قطقاط أشوك*Vanellus spinosus*

Spur-winged Lapwing

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

يتزايد

25 - 28 سم / 127 - 177 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



قطقاط أشوك بالغ



فرخ قطقاط أشوك

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة منه في أفريقيا (على امتداد وادي النيل ومن منطقة الساحل حتى جنوب خط الاستواء مباشرة)، وفي مناطق أخرى متفرقة عبر شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى سوريا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في تركيا وقبرص، بينما تقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في نطاق التعداد المقيم. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثراً نادر، زائر شتوي نادر.** للاستفادة من الأراضي الرطبة الاصطناعية، لجأ هذا الطائر إلى تأسيس مستعمرة لنفسه بالمملكة، فقد شرع في التكاثر أولاً في جدة عام 1982، ثم أصبح موجوداً الآن في تهامة، وفي مزارع الألبان حول الرياض. وعلى الأرجح تمضي أعداد قليلة منه الشتاء على طول شرق منطقة البحر الأبيض المتوسط في شبه الجزيرة العربية.

الموائل: مواقع المياه العذبة في تهامة، بما في ذلك أحواض المياه في الوديان والخزانات وبرك مياه الصرف ومكبات النفايات. كما يوجد في الشواطئ، أو أحواض المياه قليلة الملوحة والبرك الطينية في مزارع الألبان وأحواض الفيض بالقرب من مضخات الري حول الرياض. **سلوك البحث عن الغذاء:**

النظام الغذائي: الحشرات واليرقات، لا سيما الخنافس التي يلتقطها بحركات بطيئة تليها طعنة سريعة بمنقاره. **النشاط:** نهاري، وليلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يوجد في أزواج، أو مجموعات صغيرة متفرقة، رغم تسجيل سرب رعي يضم أكثر من 150 طائراً في الشتاء في حرص. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش منفردة أو في تجمعات متفرقة. **الأدوار الأبوية:** يصنع الذكر تجويف العش الذي تتولى تبطينه الأنثى، والتي تتولى بدورها معظم واجبات الحضنة، في حين يتشارك الأبوان في رعاية الصغار. **العش:** تجويف ضحل في الأرض (غالباً في الطين الجاف)، مبطن بسيقان النباتات، أو أوراق الشجر، أو الحصى، أو الرقائق الطينية الجافة في المناطق المكشوفة بالقرب من المياه. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:** 22 - 24 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير في سن 7 - 8 أسابيع. **الحضنة:** مزدوج الحضنات. **باغ الجناح:** 69 - 81 سم.

لهذا الطائر نتوء حاد على

الحافة الأمامية لكل جناح،


وهو أكبر لدى الذكور، حيث

يستخدمه أداة استعراض في

عروض الدفاع عن المنطقة،

وسلاحاً في القتال متى دعت

الحاجة لذلك.



مقيم متكاثراً

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 600**منطقة النشاط:** بحيرات معالجة مياه الصرف في صبياء**قطقاط شمالي***Vanellus vanellus*

Northern Lapwing

قريب من التهديد

يتناقص

-

-

28 - 31 سم / 128 - 330 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وغرب أوروبا وتركيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر امتداداً من وسط أوروبا حتى شمال شرق الصين، بينما تهاجر لقضاء فصل الشتاء قرابة 3,000 كم جنوباً حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، ثم الصين واليابان. **حاليته بالمملكة: زائر شتوي شائع.** يُعد هذا الطائر المتفاخر بريشه الجميل منتشرًا وزائراً شتوياً منتظماً للمملكة، لا سيما شمال الحد الفاصل بين الدمام والرياض وجدة، وذلك بالرغم من وجوده بأعداد يتعذر التنبؤ بها. **الموائل:** يفضل المواقع المنتجة، مثل برك ترسيب مياه الصرف والأحواض القريبة من مكبات النفايات والأراضي الزراعية، خاصة حقول الأعلاف والمناطق الطينية في مزارع الألبان، حيث السمامد العضوي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، مثل الحشرات واليرقات والديدان والعناكب والقواقع. ونظراً لطبيعته الوادعة للغاية، فإنه يتغذى بهدوء سيراً، ويفتنش في الأرض والنباتات في محاولة للنقر والتقاط

تقع المملكة على مقربة

من الحد الجنوبي لنطاق

تشتية هذا الطائر، ومن ثم


فإن الطيور التي تقضي

الشتاء فيها ربما تكون قد

وصلت متأخرة إلى مناطق

تكاثرها البعيدة.

ما يجده ليتناوله. **النشاط:** نهاري، وليلي جزئي. كما يعمد إلى الهجرة ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أسراب، وعادة ما تكون صغيرة تتألف من 5 - 10 طيور، رغم تسجيل أسراب تتعدى 100 طائر في مواقع عدة، بما في ذلك سرب كان يتألف من 425 طائراً بمنطقة حرص في فبراير. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر المخوض لا تخطئه عين أبداً، لريشه الأبيض والأسود وتاجه الجميل. كما أن جناحيه العريضين يجعلانه طائراً رشيقاً للغاية، لدرجة أنه يمكنه الطيران على الفور والاندفاع فجأة في طيران عمودي. **باغ الجناح:** 82 - 87 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** تبوك


الاسم العربي:	قطقاط تجمعي
الاسم العلمي:	<i>Vanellus gregarius</i>
الاسم الشائع:	Sociable Lapwing
حالة الحماية العالمية:	مهدد بالانقراض بشكل حرج
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	260 - 150 سم / 30 - 27 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر بشكل حصري تقريباً في سهوب شمال كازاخستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 5,000 كم إلى الجنوب والجنوب الغربي، بشكل رئيس في شمال شرق أفريقيا (السودان وتشاد وأريتريا)، وكذلك شمال غرب الهند وباكستان والعراق وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، زائر شتوي محدود. أصبح هذا النوع من طيور الـ «قطقاط» المهدد بالانقراض بشكل حرج، نادراً في الوقت الحالي بالمملكة، ويبدو أن الهجرة الرئيسية من كازاخستان إلى أفريقيا تمر عبر الزاوية الشمالية الغربية من المملكة. وقد أظهرت الاستطلاعات الأخيرة قضاء هذا الطائر النادر جداً قضاء فصل الشتاء بانتظام في حرض، بينما يقضي عدد قليل منه فصل الشتاء في المزارع شمال المملكة. **الموئل:** أثناء الهجرة، يوجد في المناطق المروية، أو حزم الأعشاب المتناثرة والنباتات الموجودة في السهول الشمالية. وخلال الشتاء، يوجد في المساحات المروية من محاصيل الحبوب والقش وحقول الأعلاف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتناول بشكل أساسي الحشرات والعناكب واللافقاريات الصغيرة الأخرى إلى جانب قدر صغير من المواد النباتية

تهاجر نسبة كبيرة من التعداد العالمي لهذا القطقاط المهدد بالانقراض بشكل حرج عبر شمال المملكة في طريقها بين كازاخستان والسودان.

التي يلتقطها عن طريق نقب الأرض لاستخراج فرائسه بين فترات قصيرة من الركض، علماً أنه يتميز بالطول، ثم يُضطر إلى تغطية رأسه بعمق للحصول على غذائه. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في مجموعات صغيرة تتألف من 1 - 5 طيور، رغم تسجيل مجموعة منه يصل عددها إلى 16 طائراً بحرض في فبراير عام 2016، فيما تم تسجيل 45 طائراً منه ضمن سرب في أقصى السهول الشمالية في مارس. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 70 - 76 سم. **حالة الحماية:** تم إدراج هذا النوع ضمن فئة الأنواع المهددة بالانقراض بشكل حرج عالمياً. وتُقدر الأعداد المتبقية - على نحو إيجابي - 16,000 فرد فقط. وقد تناقص تعدده بشكل حاد بسبب انحسار موائمه من السهول وضغط الصيد على طول مسار هجرته، بما في ذلك أراضي المملكة.



مهاجر عابر، زائر شتوي **الأزواج المتكاثرة سنوياً:** لا يتكاثر في المملكة **منطقة النشاط:** تبوك



الاسم العربي:	قطقاط أحمر لغد
الاسم العلمي:	<i>Vanellus indicus</i>
الاسم الشائع:	Red-wattled Lapwing
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	غير معروف
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	يتزايد
الحجم والوزن:	32 - 35 سم / 110 - 230 غم




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في نطاق يمتد من العراق وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، مروراً بالهند ووصولاً إلى شبه الجزيرة الماليزية. وقد ازداد نطاق وجوده في شبه الجزيرة العربية بدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث شرع في التكاثر في كل من الكويت والبحرين وقطر على مدى السنوات الخمس عشرة الأخيرة. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر محتمل، زائر شتوي محدود. يصبح هذا الـ «قطقاط»، المعروف بجرأته، أكثر شيوعاً بمرور الأيام بوصفه زائراً شتوياً في المنطقة الشرقية، ويبدو أنه أسس له تجمعاً في المملكة، بينما يُشتبه في تكاثره بالقرب من الشبيبة في الربع الخالي. **الموئل:** المناطق الخضراء المروية، بما في ذلك الطرق الدائرية وحدائق الزينة، والمزارع وبحيرات مياه الصرف وحظائر الحيوانات ومزارع النخيل، بينما يتكاثر في المناطق المكشوفة ذات البرك الضحلة من المياه العذبة، أو قليلة الملوحة، أو الراكدة، بما في ذلك قنوات التصريف ومكبات النفايات وأحواض معالجة المياه والمناطق الزراعية المروية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللاقاريات، مثل النمل والخنافس والفرشاشات والجناب، وكذلك يرقات الفراشات وغيرها من اليرقات الأخرى، والعناكب والرخويات والقشريات التي يلتقطها عبر التفتيش في أطراف المستنقعات والمساحات الخضراء بحثاً عن الفرائس،

والتقاط الأطعمة من الأرض والنباتات. **النشاط:** شفقي، ويلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُرى منفرداً، أو في أعداد صغيرة جداً، رغم تسجيل رؤية مجموعة تتكون من 24 طائراً بالشبيبة في فبراير عام 2017. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش منفردة، أو في أزواج متعددة في المنطقة

يبدو أن هذا الطائر قد أسس تجمعاً له في المملكة مؤخراً قادماً من الدول الخليجية المجاورة، ومن المرجح أنه سيتكاثر فيها أيضاً.

العامية نفسها. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش وحضانة ورعاية الصغار. **العش:** حفرة ضحلة في أرض مكشوفة، قد تكون غير مبطنة أو مبطنة بأحجار صغيرة، أو قطع ملتقطة من الأرض، أو بقايا من المواد النباتية، وغالباً ما تكون بالقرب من المياه. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:** 26 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير بعد 38 يوماً. **الحضنة:** مزدوجة الحضنات. **باغ الجناح:** 80 - 81 سم.



زائر شتوي **الأزواج المتكاثرة سنوياً:** لم يُسجل تكاثره (مع إمكان حدوثه) **منطقة النشاط:** خليج سلوى



شَنْقِبٌ مَلُونٌ
Rostratula benghalensis
 Greater Painted-snipe
 غير مهدد
 يتناقص
 -
 -
 23 - 28 سم / 90 - 200 غم

الاسم العربي:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



ذكر شَنْقِبٌ مَلُونٌ




أنثى شَنْقِبٌ مَلُونٌ

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ودلتا النيل، ومن الهند مروراً بجنوب آسيا ووصولاً إلى اليابان وإندونيسيا. **حالته بالمملكة:** **مقيم متكاثر شديد الندرة.** تم رصد هذا الطائر الرائع بالمملكة للمرة الأولى في عام 2010، وثبت تكاثره للمرة الأولى في عام 2013. وحتى يومنا هذا، لم يُعثر عليه سوى في بحيرة ملاكي جنوب تهامة، وعند بحيرات مياه الصرف بالقرب من صبياء، حيث سُجِّل تكاثره. **الموئل:** يتكاثر في بحيرات مياه الصرف بالقرب من صبياء في المواقع التي تضم أعمال التربة، وتحفها المستنقعات ذات النباتات الخفيضة وبعض أشجار الطلح. وقد يتكاثر أيضاً في المستنقعات وأحواض القصب والأراضي المغمورة بالمياه التي تتناثر حولها الشجيرات المنخفضة (وفقاً للحالات المُسجَّلة في أفريقيا). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام** شريك واحد. ويقوم شركاؤها للذكور بجميع مهام العيش.

يُبدى هذا الطائر انعكاساً للآدوار الجنسية؛ فالأنثى أكبر حجماً وأكثر ألواناً من الذكر. كما أنها تمتلك أكثر من شريك واحد. ويقوم شركاؤها للذكور بجميع مهام العيش.

عن طريق سبر الأرض. **النشاط:** شفق، ويلي جزئي. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يوجد منفرداً، أو في مجموعة من طائرين أو ثلاثة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** متعدد الأزواج مع أدوار جنسية معكوسة، بمعنى أن الأنثى بألوانها الزاهية هي التي تستعرض نفسها وتتزاوج مع ذكرب إلى أربع ذكور، والتي تعيش دورها في منطقة سيادتها وتؤدي جُل مهام العيش. **الأدوار الأبوية:** يبني الذكر العش ويدافع عنه ويحضن البيض ويعتني بترية الصغار. **العش:** جوف ضحل أو منخفض في الأرض، ويكون مبطناً بسيقان النبات وأوراق الشجر، ومخفياً بين حشائش المستنقعات الكثيفة والمنخفضة. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:** 19 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير عندما تبلغ 30 - 35 يوماً. **الحضنة:** متعدد الحضنات. **باغ الجناح:** 50 - 55 سم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: بحيرات معالجة مياه الصرف في صبياء



قطقاط أغوك
Vanellus leucurus
 White-tailed Lapwing
 غير مهدد
 غير معروف
 غير مهدد
 مستقر
 26 - 29 سم / 99 - 198 غم


الاسم العربي:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في نطاق يمتد من العراق وصولاً إلى باكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في تركيا واليابان وصولاً إلى جنوب كازاخستان، بينما تقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم إلى الجنوب والجنوب الغربي في السودان وباكستان والهند وبشكل متزايد في شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** **مقيم متكاثر نادر جداً، زائر شتوي محدود، مهاجر عابر محدود.** ينتشر هذا الـ «قطقاط» طويل الساقين على نطاق واسع في شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية بوصفه مهاجراً واسع النطاق (فبراير - أبريل، سبتمبر - نوفمبر)، بينما يُعدُّ زائراً شتوياً نادراً في الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. وقد تكاثرت قلة من أزواجه في المملكة بالقرب من مدينة الخُبر بين عامي 1992 و1993، ومنذ ذلك الحين، لم تتوافر أي سجلات تكاثر أخرى. **الموئل:** البرك الساحلية المنخفضة الملوحة والخلاجان الناتجة عن المد والجزر الضحلة وبرك تجميع مياه الأمطار وبحيرات مياه الصرف. وقد تكاثر ذات مرة في مستنقع مياه عذبة يحتوي على طين محض وأحواض من عيدان القصب الطويلة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غير معروف جيداً. ربما الحشرات، واللافقاريات الأخرى التي يلتقطها من سطح الأرض، أو التفتيق بقدمه في المياه الضحلة، أو السبر في الطين. **النشاط:** نهارى.

عادةً ما يعبر هذا الـ «قطقاط» الجميل والنحيف المملكة أثناء هجرته، لكن تم تسجيل القليل من الأزواج أثناء تكاثرها بالقرب من مدينة الخُبر.

على الأرض المكشوفة، مبطنة بأصداف القواقع الصغيرة وبقايا الأصداف والحصى والقليل من سيقان النبات، وتكون بالقرب من المياه. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 21 - 24 يوماً. **الفراخ:** تغادر الصغار العش بعد الفقس بفترة قصيرة، وتطير بعد 30 يوماً. **الحضنة:** أحادي الحضنات. **باغ الجناح:** 67 - 70 سم.



مقيم متكاثر، زائر شتوي، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثر سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: سبخة الفصل




كروان الماء	الاسم العربي:
نهقة أوراسية	الاسم العربي الآخر:
<i>Numenius arquata</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Curlew	الاسم الشائع:
قريب من التهديد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
50 - 60 سم / الذكر 410 - 1,010 غم؛ الأنثى 475 - 1,360 غم (أثقل وزناً بنسبة 30%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية، أما التعدادات المهاجرة ففي نطاق يمتد من شمال غرب أوروبا وصولاً إلى شمال شرق الصين، بينما تقضي الشتاء على بُعد 10,000 كم جنوباً على طول سواحل أفريقيا بشكل رئيس، وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن شبه الجزيرة العربية مروراً بالهند حتى جنوب شرق آسيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محدود. يُعدّ كروان الماء الكبير هذا، مهاجراً عابراً على طول السواحل في المقام الأول، لكن لا توجد أيّ تحركات موسمية ملحوظة، ورغم ندرة السجلات التي توثق وجوده على بُعد 100 كم داخل اليابسة، إلا أنه يوجد بالفعل في كل من الرياض وتبوك وخميس مشيط. **الموئل:** المسطحات الطينية الساحلية والخلجان الموحلة والأراضي الرطبة المكشوفة بالقرب من السواحل. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بصورة أساس على

اللافقاريات، بما في ذلك الحشرات والديدان والقشريات والرخويات، وأحياناً الأسماك والبرمائيات والسحالي والقوارض الصغيرة. أما في اليابسة، فيقتات على أنواع مختلفة من الحشرات، فضلاً عن التوت والحبوب وغيرها من المواد النباتية، وهو يتغذى عن طريق التقاط الفرائس الصغيرة من سطح الأرض، أو النقر السريع بمنقاره في الطين، أو عمل مسابير طويلة باستخدام طول منقاره بالكامل لإيجاد الفرائس على أعماق أكبر. كما أنه يتحسس فريسته ويتلقفها بطرف منقاره، غير أنها غالباً ما تنجرف مع تيارات المياه قبل أن يتمكن من ابتلاعها بالكامل. أما الفرائس الأكبر حجماً، فينقلها إلى حلقه

عبر هز رأسه للخلف، علماً أن إنثاه عادةً ما تبحث عن الغذاء في المناطق الناتجة عن المد والجزر الأكثر انبساطاً، بينما تبحث ذكوره عن الغذاء بشكل أكبر في الأراضي الزراعية. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون اجتماعياً ضمن أسرابٍ صغيرة في المملكة، ولكن قد ينتشر على نطاقٍ واسع للبحث عن الغذاء كأفراد عند الرعي في المسطحات الطينية ضمن أسرابٍ عندما يكون الجزر في أدنى مستوياته. وهو سربي بصفة خاصة في المجاثم، كما سُجّلت أسراب بالمئات منه أثناء هجرته. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 80 - 100 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج جازان




كروان الماء الصغير	الاسم العربي:
نهقة آجام	الاسم العربي الآخر:
<i>Numenius phaeopus</i>	الاسم العلمي:
Whimbrel	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
40 - 46 سم / الذكر 268 - 550 غم؛ الأنثى 315 - 600 غم (أثقل وزناً بنسبة 10%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر عبر المناطق الشمالية من أوراسيا وأمريكا الشمالية، ويهاجر شتاءً حتى 12,000 كم جنوباً بشكل رئيس على طول السواحل الاستوائية والمعتدلة مناخياً في العالم. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محلي، زائر صيفي غير منتظم. يشيع وجود كروان الماء الصغير في المملكة، وينتشر في جميع المناطق الساحلية، ويمر عبر المملكة على نطاقٍ واسع. وقد تم تحديد فترات هجرته في مارس وأكتوبر في ينبع، وخلال أبريل وأغسطس في الخليج، ويقضي الشتاء بانتظام (نوفمبر - فبراير) جنوب ساحل البحر الأحمر، رغم قلة توجهه شمالاً، وفي الخليج العربي أيضاً. وقد توجد بعض الطيور منه خلال أشهر الصيف، لا سيما بمنطقة البحر الأحمر. **الموئل:** السواحل، خاصة المسطحات الطينية، كما يوجد في الشواطئ الصخرية، أو الرملية وغابات المانغروف. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، مثل الحشرات ويرقاتها والقشريات (خاصة سرطان البحر) والرخويات والديدان. ويتغذى عن طريق الالتقاط من السطح، أو سير جحور ساكنات المسطحات الطينية. **النشاط:** نهاري، ويلي جزئي (ويتغذى أيضاً في الليالي المقمرة). **السلوك الاجتماعي:** يُعدّ طائراً مخوضاً سربياً كبيراً،

وعادةً يوجد في مجموعات صغيرة تراوح بين 3-10 طيور، بينما يجثم في مجموعات، أحياناً فوق فروع شجيرات المانغروف، علماً أن هذه الطيور تؤسس مناطق رعي شتوية وتدافع عنها. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** اثنان من أصل تسعة أنواع فرعية على أقل تقدير تمر عبر المملكة العربية السعودية، بما فيها كروان السهول ذي مستوى الانقراض الحرج. وهذه الطيور الفرعية لم يتم رصدها لعقود وأعلن عن انقراضها عام 1994. ولحسن الحظ أعيد اكتشافها عام 2016، ويبدو أن المملكة العربية السعودية تُعدّ جزءاً مهماً من رحلة هجرتها. **باغ الجناح:** 76 - 89 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج جازان



بقويقة سوداء الذيل

الاسم العربي:	قوق أشعل
الاسم العربي الآخر:	<i>Limosa limosa</i>
الاسم العلمي:	Black-tailed Godwit
الاسم الشائع:	شبه مهدد
حالة الحماية العالمية:	يتناقص
المنحى العالمي للمجموعة:	-
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	36 - 44 سم / الذكر 160 - 440 غم؛ الأنثى 244 - 500 غم (أثقل وزناً بنسبة 25%)




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من آيسلندا شرقاً حتى منغوليا وشمال شرق روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 7,000 كم إلى الجنوب حول البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، ومن الهند حتى أستراليا.

حاليته بالمملكة: مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع، زائر صيفي غير منتظم. يوجد هذا الطائر الطويل والرشييق على نطاق واسع في المملكة، لا سيما في ذروة وقت هجرته (مارس-أبريل، أكتوبر-نوفمبر)، وفي فصل الخريف، علماً أن بعض الطيور منه تفضل البقاء في فصل الشتاء، بينما تفضل

قلة منها البقاء خلال الصيف. **الموئل:** يفضل موائل المياه العذبة، خاصة الأراضي الرطبة الداخلية الكبيرة والمنتجة، مثل بحيرات مياه الصرف الصحي والمجاري المائية المحفوفة بالأعشاب الخفيضة ومزارع الحيوانات التي تضم حقول الأعلاف والبرك الموحلة. كما يوجد في السواحل أحياناً. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: اللافقاريات، خاصة الحشرات واليرقات، إلى جانب القشريات والرخويات والعناكب، فضلاً عن البرمائيات والبيدور والتوت، مع العلم بأنه يتلمس فرائسه بواسطة منقاره المستقيم الطويل، أو يلتقطها من السطح. من المعروف عنه أيضاً، أنه يضرب برجليه في المياه الضحلة لقلقلة، أو إزعاج فرائسه. وتسمح له أرجله الطويلة بالتخويض بحرية. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يكون اجتماعياً في فصل الشتاء، وشوهدت أسراب منه تتألف من 20 طائراً كحد أقصى (تجاوزت 100 طائر في حالات استثنائية)، وذلك بالرغم من العثور عليه منفرداً. وربما ينضم هذا النوع من الطيور إلى بعضها بعضاً أثناء البحث عن الغذاء، فتجتمع في بقعة معينة من المستنقع فيما تفصل بينها أمتار قليلة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر قوي وذو قدرات عالية، فيمكنه أداء انعطافات حادة، ويستطيع الانزلاق ببطء لدى الهبوط، فيما يصفّ ساقيه وقدميه خلفه عند الطيران. **باع الجناح:** 70 - 82 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي، زائر صيفي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

**بقويقة مخططة الذيل**


الاسم العربي:	قوق موشم ذنب
الاسم العربي الآخر:	<i>Limosa lapponica</i>
الاسم العلمي:	Bar-tailed Godwit
الاسم الشائع:	قريب من التهديد
حالة الحماية العالمية:	يتناقص
المنحى العالمي للمجموعة:	-
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	37 - 41 سم / الذكر 190 - 400 غم؛ الأنثى 262 - 630 غم (أثقل وزناً بنسبة 50%)



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أعالي القطب الشمالي في أوراسيا وألاسكا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 - 12,000 كم جنوباً على سواحل غرب أوروبا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية وأستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي نادر. يشيع وجود هذا المهاجر في المملكة ضمن مسافات شاسعة على السواحل أثناء فترات هجرته الرئيسية (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، وفي أوقات الشتاء (نوفمبر - فبراير)، في حين يوجد تعداد قليل جداً من الطيور المهاجرة العابرة داخل اليابسة، علماً أن بعض الطيور غير البالغة تفضل البقاء خلال الصيف، وأحياناً بأعداد كبيرة في الخليج العربي. **الموئل:** يفضل المسطحات الطينية الناتجة عن المد والجزر المكشوفة، والخلجان المحمية، وفي أحيان قليلة الشواطئ الرملية والبحيرات الحافلة بأشجار المانغروف. كما يجثم أحياناً فوق الشواطئ الصخرية ورؤوس البر الداخلة في البحر.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: الأصداف والقشريات والديدان وغيرها من اللافقاريات، وهو عادةً ما يتغذى على طول حافة برك المياه، أو في المناطق الناتجة عن المد والجزر، إما عبر التقاط فريسته من السطح، أو بغرز منقاره في الأرض سريعاً، أو استخدامه في سبر أعماق أكبر. كما أنه يخوض الماء بحثاً عن الطعام، وقد يركض وراء فرائس فريدة، علماً أن إنائه تكون أكبر حجماً وتمتلك منقاراً أطول، لذلك

تعتمد إلى البحث في مياه أعمق. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يُعَدُّ اجتماعياً للغاية في مواسم أخرى غير موسم التكاثر، ودائماً ما تتم رؤيته في مجموعات، وغالباً في تجمعات تصل إلى مئات عدة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتمتع بقدرة فائقة على الطيران والرفرفة بشكل سريع، تشعر وكأنه على عجلة من أمره. وغالباً ما يحوم أثناء الطيران، وهو بهلواني في الوقت نفسه، إذ يقوم بانعطافات حادة ويغير اتجاهه حتى عندما يكون ضمن أسراب. **باع الجناح:** 70 - 80 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي، زائر صيفي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج تاروت



الدرجة الكبيرة

طيטوي كبيرة

Calidris tenuirostris

Great Knot

مهدد بالانقراض

يتناقص

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

26 - 28 سم / 115 - 248 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أقصى شمال شرق سيبيريا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 9,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في المناطق الساحلية شرق شبه الجزيرة العربية وباكستان وأستراليا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر جداً، زائر شتوي نادر جداً. يُعدُّ هذا الطائر الشاطئي الكبير مهاجراً غير شائع (خلال فصل الربيع بشكل رئيس) على ساحل الخليج العربي بين الجبيل والخبر في طريقه إلى مواقع قضاء فصل الشتاء المعتادة في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، وقد يقضي الشتاء أيضاً بأعداد صغيرة حول جازان. **الموئل:** السهول الطينية الناتجة عن المد والجزر النائية والشاسعة، أو الخلجان الرملية المحمية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يفضل ذوات الصدفتين وبطنيات القدم والقشريات والديدان والحشرات، وغير ذلك من اللافقريات.

بعد تكاثره في أقصى شمال

شرق روسيا، تهاجر بعض

تعداداته باتجاه الجنوب الغربي

مسافة 9,000 كم، مروراً بالمياه

الإقليمية السعودية، لقضاء

الشتاء في سلطنة عُمان.

ويتغذى من خلال سبر الوحل، أو الالتقاط من السطح. **النشاط:** نهاري وليلي. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يوجد في مجموعات ويرتبط ببعض الأنواع

الأخرى، خاصةً بقويقة مخططة الذيل التي تكون دائماً قريبة في الموئل نفسه.

سلوك التكاثر: لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتميز هذا الطائر المخوض الذي يُعدُّ

الأكبر من بين جنسه، بحجمه المتوسط إلى حد كبير وحركة جناحيه البطيئة نوعاً ما،


والذين يدوان طويلاً أثناء الطيران. **باع الجناح:** 58 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر

مصنف على أنه مهدد بالانقراض على مستوى العالم بسبب انخفاض تعداده على

نحوٍ سريع للغاية بفعل استغلال مناطق توقيفه في طريق هجرته، لا سيّما البحر

الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية. كما يزيد فقدان موائل المانغروف في نطاق

وجوده، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من معاناته.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** خليج تاروت**قنبرة الماء***Arenaria interpres*

Ruddy Turnstone

غير مهدد

يتناقص

-

-

21 - 26 سم / 84 - 190 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر على طول الحافة الشمالية لأمريكا الشمالية وأوراسيا، بينما يمضي الشتاء على بُعد 12,000 كم إلى الجنوب حول السواحل الاستوائية والمعتدلة مناخياً حول العالم. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي نادر. يوجد هذا الطائر الساحلي الساحر في جميع مناطق المملكة الساحلية، وبعض المواقع الداخلية على شكل مهاجر عابر واسع النطاق (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، بينما يوجد في جميع المناطق الساحلية (بما في ذلك مناطق المد والجزر) خلال فصل الشتاء. ويفضل تعداد قليل منه البقاء على طول السواحل خلال فصل الصيف. **الموئل:** يوجد خلال فصل الشتاء في المناطق الطينية الساحلية والبحيرات المالحة والشواطئ الصخرية والشواطئ التي تحوي حطاماً عائماً وأعشاباً بحرية. وأثناء الهجرة، يظهر في أي أرض رطبة داخلية، وحتى في أحواض الأمطار والخلدق الصغيرة الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات واليرقات والقشريات الصغيرة والرخويات والديدان، فضلاً عن بقايا الأظعمة البشرية والجيف، وهو يتغذى عبر

الانطلاق من فوق الصخور والنقر والمطاردة

وسبر مخلفات الحطام وقلب الأحجار (ومن هنا

جاء اسمه)، وغير ذلك من استراتيجيات كشف

الفرائس التي قد يطاردها أيضاً لتأمينها. كما

يقوم بالحفر ويمكنه الهبوط على صفحة

الماء والسباحة. **النشاط:** نهاري. **السلوك****الاجتماعي:** طائر مخوض اجتماعي قصير

الرجلين ونشط - إلى حد ما - يتغذى ويجثم


ويطير ضمن مجموعات متفرقة، وقد شوهد 230 طائراً منه في مناسبة واحدة في جزر

فَرْسان. قد يتغذى على طريق الهجرة أثناء وجوده في السواحل، ولكن على ما يبدو

ليس أثناء المرور عبر وسط المملكة، حيث يعتمد إلى قضاء ما يكفيه من الوقت للراحة

واكتساب القوة للمتابعة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باع الجناح:** 50 - 57

سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي، زائر صيفي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** خليج جازان


طيوطي عريضة المنقار

طيوطي سُدقاء
Calidris falcinellus
 Broad-billed Sandpiper
 غير مهدد
 يتناقص
 -
 -
 الحجم والوزن: 18 - 26 سم / 68 - 26 غم

الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال إسكندنافيا وأقصى شمال روسيا وشرق سيبيريا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم جنوباً على سواحل كينيا وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد هذا الطائر الصغير ذو المنقار العريض في المملكة بوصفه مهاجراً عابراً ساحلياً غير شائع (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر) على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وزائراً شتوياً محلياً (أكتوبر - مارس). شوهد مرات قليلة في الرياض، ما يشير إلى أن تعداده المهاجر قد يمتد فوق المملكة على نطاق واسع. **الموئل:** يفضل الشواطئ الساحلية الموحلة، والبحيرات المالحة الضحلة وغابات المانغروف المفتوحة. ويوجد أيضاً، في الأراضي الرطبة الساحلية الغنية بالمغذيات، مثل بحيرات مياه الصرف الصحي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، بما في ذلك الحشرات والديدان والقشريات والرخويات، وهو يتغذى عن طريق المشي السريع مع التقاط الفرائس من السطح من جانب إلى آخر، أو عن طريق سبر السطح بحثاً عن فرائسه بمنقاره العريض الذي تنحدر تسميته منه. وفي حال أراد اقتفاء أثر فريسة ما، فإنه يضع رأسه على جانب واحد لاستراق السمع ليتتبعها. **النشاط:** نهاري.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: خليج تاروت



يقضي هذا الطائر فصل الشتاء على سواحل المملكة، ثم يطير إلى أوكرانيا في شهر مايو لفترة وجيزة يستجمع فيها طاقته قبل أن يواصل طريقه نحو الشمال الغربي، حيث أراضي تكاثره الإسكندنافية.

حجالة


الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء شمال أوراسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 - 7,000 كم إلى الجنوب في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووادي النيل وعلى طول سواحل شبه الجزيرة العربية حتى جنوب شرق آسيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً،

في الربيع، تطرح ذكور هذا الطائر ريشها إلى نوع واحد من بين ثلاثة أنواع ريش مختلفة بشكل لافت للنظر، فيكون لكل منها حجماً وزخرفة وعدوانية وسلوك تزاوج مختلفاً.

زائر شتوي محلي: يُعد هذا الطائر الاستثنائي مهاجراً عابراً واسع النطاق في المملكة (مارس - مايو، سبتمبر - نوفمبر)، وشائعاً محلياً في الشتاء، مع وجود بعض تعداداته تتحول في الصيف. ويعتبر وجوده محدوداً عند السواحل. **الموئل:** أي موقع للمياه العذبة، لا سيما برك ترسيب مياه الصرف الصحي والمستنقعات، وكذلك برك الوحل في مزارع الألبان والمراعي القريبة، فضلاً عن جداول وقنوات المياه ذات الضفاف الموحلة، وحتى البرك الصحراوية المؤقتة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات وغيرها من اللافقاريات، بما في ذلك القشريات والعناكب والديدان، إلى جانب البرمائيات وبعض البذور. ويتغذى عبر سبر الأرض بقوة بحثاً عن الفرائس، أو عن طريق النقر من السطح. **النشاط:** نهاري وليلي. **السلوك الاجتماعي:** يبحث عن الغذاء في مجموعات صغيرة عادة، غالباً مع غيره من الطيور المخوفة التي تتغذى فوق بعضها بعضاً عندما تكون الفرائس وفيرة. وكثيراً ما يُشاهد في أسراب مهاجرة تضم مئات عدة، بينما يقضي أكثر من 3,000 طائر فصل الشتاء في مزارع الألبان بالقرب من الرياض. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** في الربيع، تظهر عديد من الذكور بريشها المتغير والمزخرف بينما تشتبك معاً في بعض الأحيان تمهيداً لطقوس تكاثرها المعقدة في وقت لاحق من الموسم. **باغ الجناح:** 48 - 58 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



طيوطي تمنكية*Calidris temminckii*

Temminck's Stint

غير مهدد

غير معروف

15 - 13 سم / 15 - 36 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر عبر شمال أوراسيا فوق الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي الشتاء على بُعد 7,000 - 12,000 كم إلى الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمناطق الساحلية امتداداً من شبه الجزيرة العربية والهند وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً، زائر شتوي محلي، زائر صيفي غير شائع. يقطع هذا الطائر الذي يتخذ من المناطق الساحلية موثلاً له مسافات طويلة، وهو يُعدُّ مهاجراً عابراً شائعاً

جداً في المملكة (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، خاصة على السواحل، مع أعداد صغيرة نسبياً في الأشهر الأخرى. ويبدو أنه يمضي فصل الشتاء بانتظام حول جازان (أكتوبر - مارس)، فيما توجد بعض طيوره البالغة في فصل الصيف. **الموئل:** يفضل السهول الطينية الساحلية والبحيرات المالحة وغابات المانغروف الموحلة والمفتوحة. كما يقطن هذا الطائر داخل البر أحياناً، حيث مواقع المياه العذبة التي تحوي الطين أو النباتات القصيرة، بما في ذلك بحيرات مياه الصرف المعالجة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، ومنها



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: بحيرات الصرف الصحي

في صيباء



بعدهما يتكاثر في القطب

الشمالي، يغادر هذا الطائر

في سلسلة من القفزات

القصيرة، ثم يستريح لأربعة

أيام في كل مرة، قبل أن

ينطلق مجدداً ويعبر الصحاري

الشاسعة في أفريقيا، أو شبه

الجزيرة العربية.

الظروف المحمية. **سلوك البحث عن الغذاء:****النظام الغذائي:** يتغذى بشكل رئيس

على الخنافس والذباب واليرقات، فضلاً عن

القشريات الصغيرة والرخويات، حيث يتغذى

من خلال النقر من الطين، أو سطح الماء.

وهو لا يسير الطين عادةً، ولكن لديه حركة

نقر متعمدة على عكس الصيد المحموم

الذي يتميز به طائر طيطوي صغيرة، كما أنه لا يجري كثيراً. **النشاط:** نهارى. **السلوك****الاجتماعي:** على النقيض من معظم الطيور المخوضة، يُعدُّ هذا النوع منعزلاً إلى حد

ما، ولكنه يختلط بحرية مع الطيور المخوضة الأخرى، خاصة أنواع طيطوي الأخرى. ويوجد

عادةً منفرداً، أو في ثنائيات، أو في أسراب مكونة من 20 طائراً عند الهجرة، وأحياناً قد

تحتوي بعض المناطق الواسعة التي يقضي فيها فصل الشتاء، على 50 طائراً كحد

أقصى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 34 - 37 سم.**طيوطي مقوسة المنقار***Calidris ferruginea*

Curlew Sandpiper

شبه مهدد

يتناقص

18 - 23 سم / 44 - 117 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في سيبيريا بالقطب الشمالي، بينما يقضي الشتاء على بُعد 7,000 - 12,000 كم إلى الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمناطق الساحلية امتداداً من شبه الجزيرة العربية والهند وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً، زائر شتوي محلي، زائر صيفي غير شائع. يقطع هذا الطائر الذي يتخذ من المناطق الساحلية موثلاً له مسافات طويلة، وهو يُعدُّ مهاجراً عابراً شائعاً

جداً في المملكة (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، خاصة على السواحل، مع أعداد صغيرة نسبياً في الأشهر الأخرى. ويبدو أنه يمضي فصل الشتاء بانتظام حول جازان (أكتوبر - مارس)، فيما توجد بعض طيوره البالغة في فصل الصيف. **الموئل:** يفضل السهول الطينية الساحلية والبحيرات المالحة وغابات المانغروف الموحلة والمفتوحة. كما يقطن هذا الطائر داخل البر أحياناً، حيث مواقع المياه العذبة التي تحوي الطين أو النباتات القصيرة، بما في ذلك بحيرات مياه الصرف المعالجة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، ومنها

الحشرات والقشريات والرخويات والديدان.

وهو أكل نشط يسير بسرعة مع توجيه

منقاره نحو الأسفل، أو يخوض بحرية، أو

يلتقط من السطح، أو يسير الأرض بحثاً عن

الفرائس في الوحل، أو الرمال الناعمة. وفي

أحيان أخرى شوهد وهو يغسل الديدان قبل

التهامها. **النشاط:** نهارى وليلي. **السلوك****الاجتماعي:** يختلط مع غيره من الطيور


المخوضة عند التغذية والجنوم، لا سيما

أنواع طيطوي الأخرى. ويبحث عن الغذاء

في مجموعات صغيرة أو منفرداً، بينما يهاجر في أسراب صغيرة تتألف من 10 - 20 طائراً،

غير أنه تم تسجيل أسراب عدة تضم 100 طائراً أو أكثر، بما في ذلك ما يزيد على 500 طائر

في سبخة الفصل. وبالمثل، تم تسجيل 600 في مناسبة واحدة خلال فصل الشتاء في

جزيرة قَرْسَان. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 38 - 41 سم.

مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جزيرة قَرْسَان



طيوطي دراجة*Calidris alpina*

Dunlin

غير مهدد

يتناقص

16 - 21 سم / 33 - 85 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوراسيا فوق الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء غالباً على سواحل العالم المعتدلة والاستوائية، بما في ذلك نصف الكرة الجنوبي بأكمله. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً، زائر شتوي شائع. يوجد هذا الطائر المخبوض ذو الأرجل القصيرة بالمملكة على طول سواحلها في طريق هجرته (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، وفي الشتاء (خاصة في سواحل الخليج العربي)، لكنه غير شائع في البر الداخلي. **الموائل:** المناطق الطينية الناتجة عن المد والجزر والحصائر الطحلبية في الخلجان الساحلية الضحلة، حيث توجد بطنيات القدم، ويوجد في كثير من الأحيان في البر الداخلي في السبخات المغمورة والبرك المنتجة المحفوفة بالوحل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على القشريات والرخويات وكذلك الديدان والحشرات واليرقات في مواقع المياه العذبة، وهو يتغذى عن طريق سبر الأرض وتقرها بشكل سريع، وأحياناً مع الجري مسافات قصيرة، أو الهرولة. ويقوم في بعض الأحيان بغسل الديدان التي يلتقطها قبل تناولها.

يفضل طائر طيطوي دراجة تناول ذوات الصدفتين التي تُسارع إلى غلق صدفتها في حال شعرت بأي اهتزاز، ما يضطر هذا النوع من الطيور التي تفتقر إلى مهارة الصيد افتراس القواقع الطينية الأقل قيمة غذائية.

وهو يتغذى عن طريق سبر الأرض وتقرها بشكل سريع، وأحياناً مع الجري مسافات قصيرة، أو الهرولة. ويقوم في بعض الأحيان بغسل الديدان التي يلتقطها قبل تناولها. **النشاط:** نهاري وليلي، **السلوك الاجتماعي:** هذا الطائر اجتماعي في الشتاء وخلال موسم الهجرة، ويختلط بحرية مع غيره من الطيور المخبوضة، علماً أنه شوهدت أسراب تضم 2,000 طائر منه على شواطئ الخليج العربي خلال فصل الشتاء. وفي السهول الطينية، تنقسم الأسراب الكبيرة إلى مجموعات أصغر تميل للتغذية والرعي بالقرب من بعضها بعضاً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة، **باغ الجناح:** 33 - 40 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: خليج تاروت

**مدروان**

طيوطي بيضاء

Calidris alba

Sanderling

غير مهدد

غير معروف

20 - 21 سم / 33 - 110 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في منطقة القطب الشمالي في أمريكا الشمالية وأوراسيا، بينما يمضي الشتاء على بُعد 15,000 كم جنوباً بطول سواحل العالم المعتدلة والاستوائية، بما في ذلك نصف الكرة الجنوبي بأكمله. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع. يشيع هذا الطائر المخبوض الصغير الذي يجري مثل لعبة بنزيرك على الشاطئ بالمملكة، في كلا الساحلين أثناء الهجرة (أبريل - يونيو، سبتمبر - أكتوبر)، وفي بعض الأحيان داخل البر، لا سيما في فصل الربيع. كما تنتشر أسرابه الشتوية على نطاق واسع، غير أنها ربما تكون أكثر تواتراً في البحر الأحمر. **الموائل:** يفضل الشواطئ الرملية المفتوحة ذات الأمواج، أو الشواطئ الموحلة، وفي بعض الأحيان البحيرات المالحة. كما يوجد أيضاً، في مواقع المياه العذبة الداخلية أثناء هجرته. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** القشريات والرخويات التي يلتقطها بطول الأمواج المنحسرة على الشاطئ؛ كما يلتقط الحشرات واليرقات من حواف الأحواض والبحيرات. طائر نشيط للغاية، وعادة ما تطارد مجموعة كاملة منه

الموجة المنحسرة في تشكيل متقارب بحثاً عن اللافقاريات الصغيرة التي قد تتكشف عنها، حيث تقوم تلك المجموعة بالنقر السريع وسبر الأرض قبل أن تجبرها الموجة التالية على الركض باتجاه الشاطئ؛ ثم تكرر المجموعة العملية نفسها مع الموجة المنحسرة التالية. **النشاط:** نهاري وليلي. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، يوجد عادةً في مجموعات من 10 إلى 20 طائراً، ولكن شوهدت أسراب تتألف من 60 طائراً كحد أقصى. وهو يحافظ على أسراب مترابطة في جميع الأوقات، بما في ذلك عند الطيران والجلوس. ونادراً ما يرتاح أكثر من بضع ساعات في المواقع الداخلية أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة، **باغ الجناح:** 35 - 39 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة


منطقة النشاط: خليج جازان



ديك الغاب	الاسم العربي:
دجاجة غاب	الاسم العربي الآخر:
<i>Scolopax rusticola</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Woodcock	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
–	حالة الحماية الإقليمية:
–	المنحى الإقليمي للمجموعة:
33 - 35 سم / 131 - 420 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وغرب أوروبا، بينما تتكاثر التعدادات المهاجرة ضمن نطاق وسط أوروبا عبر دوائر العرض الوسطى امتداداً من أوراسيا حتى اليابان، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم إلى الجنوب حول البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق متفرقة من جنوب شرق آسيا، فضلاً عن شبه الجزيرة العربية في الجهة الجنوبية. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر جداً. يُعدُّ هذا الطائر زائراً شتوياً نادراً جداً في المملكة يجيد التمويه، وقد شوهد في الجوف والظهران بالقرب من الرياض وتيماء وينبع. في واقع الأمر، هذا الطائر نادر للغاية، لدرجة أنه يمكن اعتباره من الأنواع الشاردة. **الموئل:** الأرض الرطبة ذات الغطاء والظل الجيد، مثل مزارع نخيل التمر الكثيفة، والمتنزهات كثيفة الأشجار، وفي الغطاء النباتي على ضفتي الجداول والمصارف. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، خاصة ديدان الأرض والحشرات واليرقات والعناكب، فضلاً عن البذور والحبوب المزروعة. ويتغذى عبر الالتقاط من السطح، أو السبر بعمق في التربة الطينية الرخوة، أو أوراق الشجر المتساقطة. **النشاط:** نهاري، وليلي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد بشكل عام. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول نوعاً ما على الأرض، وأسلوبه في التخفي يعني أنه نادراً ما يتم اكتشافه على الأرض، وغالباً ما تكون رؤيته للمرة الأولى هي الأخيرة؛ إذ إنه غالباً ما يترك الأرض بضربات صاخبة من جناحيه، ثم يسلك طريقه عبر الأشجار ويتوارى بعيداً عن الأنظار. **باغ الجناح:** 56 - 60 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الأحساء




طيوطي صغيرة	الاسم العربي:
<i>Calidris minuta</i>	الاسم العلمي:
Little Stint	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
–	حالة الحماية الإقليمية:
–	المنحى الإقليمي للمجموعة:
12 - 14 سم / 17 - 44 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في إسكندنافيا وروسيا فوق الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي الشتاء على بُعد يراوح بين 5,000 - 12,000 كم جنوباً في البحر الأبيض المتوسط، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووادي النيل، ومن شبه الجزيرة العربية حتى الهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر واسع الانتشار، زائر شتوي شائع. قد يكون طائر طيطوي صغيرة الأكثر انتشاراً في المملكة، وهو يمر عبر المملكة (مارس - مايو، أغسطس - سبتمبر) بشكل جماعي، مع تقارير تشير إلى مرور أكثر من 2,000 طائر في الخريف. إضافة إلى ذلك يمكن أن يوجد في كثير من الأحيان على السواحل وداخل البر، وهو من الطيور المخوّضة القليلة التي تمت مشاهدتها في البرك بالربع الخالي. ويقضي طيطوي صغيرة فصل الشتاء في الأراضي الرطبة الداخلية الشاسعة وعلى السواحل بالقرب من جازان. **الموئل:** الأراضي الرطبة المنتجة، مثل بحيرات مياه الصرف الصحي وبرك الوحل في مزارع الألبان. ويوجد أيضاً في الأحواض المحفوفة بالطين، بما في ذلك برك الأمطار المؤقتة في الصحراء. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات الصغيرة، خاصة الحشرات، مثل الذباب والنمل واليرقات الملتقطة من حافة البحيرات، وكذلك العث والعناكب والديدان والقشريات والرخويات، ودائماً ما يكون نشطاً، حيث يتغذى عبر النقر السريع من سطح الأرض وأثناء الرعي. وغالباً ما يزحف في وضعية محدبة أشبه بالفأر، ويمكنه الركض أيضاً. كما يفضل أن يقتات في الأراضي الموحلة المكشوفة بدلاً من تلك الخضراء، ولا يفضل التخويض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، وتختلط أسرابه بانتظام مع الطيور المخوّضة الأخرى. كما يقضي الشتاء بأعداد صغيرة، بينما تُشاهد التجمعات التي تتألف من 2 - 300 طائر بانتظام في الأراضي الرطبة الداخلية الكبيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** تبحث الطيور التي تعاني من نقص الوزن عن الغذاء لفترات أطول في مواقع التوقف، ما يزيد من خطر تعرضها للافتراس من قِبَل الصقور. **باغ الجناح:** 28 - 31 سم.

لا يمكننا التقليل من شأن هذا الطائر الصغير، فعلى الرغم من أنه أصغر الطيور المخوّضة بالمملكة، إلا أنه يهاجر حتى 24,000 كم سنوياً. إنه بحق طائر استثنائي.

2 - 300 طائر بانتظام في الأراضي الرطبة الداخلية الكبيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** تبحث الطيور التي تعاني من نقص الوزن عن الغذاء لفترات أطول في مواقع التوقف، ما يزيد من خطر تعرضها للافتراس من قِبَل الصقور. **باغ الجناح:** 28 - 31 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل



شنقب شائع*Gallinago gallinago*

Common Snipe

غير مهدد

يتناقص

- حالة الحماية العالمية: المنحى العالمي للمجموعة:
- حالة الحماية الإقليمية: المنحى الإقليمي للمجموعة:
- الحجم والوزن: 25 - 27 سم / 72 - 181 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في شمال أوراسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 6,000 كم إلى الجنوب في جنوب أوروبا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن شبه الجزيرة العربية حتى اليابان وماليزيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يُعدُّ هذا الشنقب ذو المنقار الطويل مهاجراً عابراً شائعاً واسع النطاق (فبراير - أبريل، أغسطس - أكتوبر)، وزائراً

شتوياً في جميع أنحاء المملكة. **الموئل:** الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة والأراضي الموحلة، أو المغمورة بالمياه، والغطاء النباتي المنخفض، لا سيما بحيرات مياه الصرف الصحي والقنوات والجداول المائية وأحواض نباتات الزينة في متنزهات المدينة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، بما في ذلك الحشرات واليرقات والرخويات والقشريات التي يلتقطها من تحت سطح الأرض في المستنقعات الرطبة

في هذا النوع، تكون الطيور

ذات الأجنحة الطويلة المدببة

أكثر كفاءة من حيث الطيران،

وبالتالي تهاجر بسرعة أكبر

وتستهلك طاقة أقل من

نظيرتها ذات الأجنحة القصيرة

المستديرة.

بواسطة منقاره الطويل الذي يمكنه من سبر التربة بكامل طوله في كثير من الأحيان. كما يفتش في أوراق الشجر المتساقطة، ويلتقط الفرائس السطحية وبعض البذور. **النشاط:**

شفقي، ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:**

غالباً ما يتغذى ويرتاح في مجموعات

صغيرة تختبئ في الغطاء النباتي المنخفض لتفادي المفترسات. **سلوك التكاثر:** لا

يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عند إزجاج طائر قريب من أفراد المجموعة الأخرى، تطير


المجموعة كلها في الهواء مع صراخ صاخب سالكة طريقاً منخفضة ومتعرجة. وقد

ترتفع المجموعة بعد ذلك عمودياً في السماء قبل أن ترتد مرة أخرى إلى الأرض مع ضم

أجنحتها في تشكيل بعرض 100 م تقريباً. ومن المثير للاهتمام، أن الشنقب الشائع

الذي يتميز بريش حالك السواد تحت جناحيه يكون في حالة بدنية أفضل ويتمتع بجهاز

مناعة أقوى. **باع الجناح:** 44 - 47 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

**شنقب كبير***Gallinago media*

Great Snipe

شبه مهدد

يتناقص

- حالة الحماية العالمية: المنحى العالمي للمجموعة:
- حالة الحماية الإقليمية: المنحى الإقليمي للمجموعة:
- الحجم والوزن: 27 - 29 سم / 140 - 260 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال إسكندنافيا حتى وسط روسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 7,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر جداً، زائر شتوي نادر جداً. يُعدُّ هذا الطائر الضخم ذو الملامح الجريئة مهاجراً عابراً نادراً عبر المملكة (فبراير - مايو، سبتمبر - نوفمبر)، إذ شوهد فقط في بقيق والرياض وتبوك وينبع. كما شوهد في الرياض خلال فصل الشتاء. ونظراً لأن المملكة تقع في منتصف الطريق بين مناطق تكاثره الشرقية ومناطق قضاء فصل الشتاء الأفريقية، فمن المرجح أن تكون هناك طيور عابرة للمملكة أكثر مما هو مسجل حالياً، أو أن التعدادات الشرقية تأخذ منعطفاً كبيراً لتجنب

الصحاري في شبه الجزيرة العربية. **الموئل:** المستنقعات، أو الأراضي الرطبة ذات أحواض القصب، مثل بحيرات مياه الصرف الصحي ذات الغطاء النباتي الكثيف، والمجاري المائية بطيئة الحركة. **سلوك البحث عن الغذاء:**

يستطيع هذا الطائر التحليق

فوق المحيطات والصحاري

بسرعة 90 كم في الساعة لما

يزيد على 5,500 كم من دون

توقف، وربما يعبر المملكة

أكثر مما ندرك.

النظام الغذائي: اللافقاريات، بما في ذلك

الرخويات والحشرات واليرقات، ويتغذى عن

طريق سبر التربة بمنقاره، أو التقاط الزواحف

السطحية، مثل الصراصير والخنافس والذباب

والنمل وبعض البذور، وهو طائر متخفي نادراً ما

يبحث عن الغذاء في العراء. **النشاط:** شفقي

وليلي. **السلوك الاجتماعي:** في المملكة، لم يُسجَل إلا منفرداً، أو في ثنائيات.


سلوك التكاثر: لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** أول مؤشر على وجود هذا الطائر

هو خروجه من وسط غطاء نباتي مع إصداره صوت نقيق أجش، وهو يطير على

ارتفاعات منخفضة ولمسافات قصيرة مع ضربات بطيئة وثقيلة من جناحيه. ولرؤيته

جيداً عن كثب، حاول تحديد موقعه لدى هبوطه من دون إزعاجه مرة أخرى. **باع**

الجناح: 47 - 50 سم.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



فلرب أحمر الرقبة*Phalaropus lobatus*

Red-necked Phalarope

غير مهدد

يتناقص

-

-

18 - 19 سم / 20 - 48 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء القطب الشمالي، بأمريكا الشمالية وأوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم جنوباً في المياه قبالة الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية وبحر العرب وأرخبيل الملايو. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. يمر التعداد الإسكندنافي من هذا الطائر البديع ذي المنقار الدقيق عبر شبه الجزيرة العربية، مشكلاً أسراباً بالآلاف في بحر العرب، ويمكن العثور عليه في البر عندما يعبر المملكة في طريق هجرته (أبريل - يونيو، يوليو - أكتوبر)، لا سيما في فصل الربيع، ولكن شوهدت بشكل أكثر شيوعاً في الخليج العربي، في حين لا أثر له على ساحل البحر الأحمر. **الموتل:** مياه الخليج العربي، وأحواض المياه العذبة الداخلية الضحلة، خاصة بحيرات مياه الصرف الصحي أو البرك الساحلية المالحة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي:



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل

**يشتهي التعداد المتكاثر**

الإسكندنافي من هذا الطائر

البديع في بحر العرب، علماً

بأنه تم تسجيل سرب يتألف

من 10,000 طائر أثناء عبوره

الخليج العربي.

أسراب الأسماك الصغيرة التي تتعرض للهجوم من قِبَل الأسماك الكبيرة تحت الماء، كذلك يبحث عن الغذاء من خلال التخويض والمشبي ونقر الفرائس من صفحة الماء، أو الطين، أو الغطاء النباتي. ويمد رأسه في الماء لالتقاط اللافقاريات المائية، أو التقاط الحشرات الطائرة. علماً أنه يبدو قوياً على صفحة الماء، وهشاً في البر. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** في البر، يوجد هذا المهاجر واسع الانتشار في مجموعات صغيرة تقل عن 20 طائراً، غير أن سرباً مكوناً من 150 طائراً قد شوهد في بقيق، من جهة أخرى، توجد أسراب كبيرة في الخليج العربي أثناء الهجرة، بما في ذلك سرب مكون من 10,000 طائر في مارس عند دائرة عرض 27° شمالاً إلى الشرق من رأس أبو علي. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باج الجناح:** 31 - 34 سم.

شنقب صغير*Lymnocyptes minimus*

Jack Snipe

غير مهدد

مستقر

-

-

17 - 19 سم / 35 - 73 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أوراسيا بدءاً من إسكندنافيا وصولاً إلى سيبيريا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 1,000 - 6,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في منطقة الساحل الأفريقي وغرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط حتى فيتنام. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محدود. عادةً ما يتم العثور على هذا الطائر ذي المنقار القصير في المملكة شمال الخط الفاصل بين الهفوف والرياح وينبع بوضعه مهاجراً عابراً غير شائع (أبريل، سبتمبر - أكتوبر) وزائراً شتوياً نادراً. ورغم المشاهدات المحدودة، يُفترض أن عدداً منه تعبر المملكة في طريق هجرتها. **الموتل:** مستنقعات المياه العذبة ذات الغطاء الجيد من الأعشاب القصيرة والنباتات، بما في ذلك أحواض مياه الصرف الصحي، والمناطق التي يكثر فيها الرعي بالقرب من الأراضي الرطبة، ومحاصيل الأعلاف المغمورة بالمياه. كما يوجد في السبخة الساحلية ذات الغطاء النباتي الخفيض. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات البالغة واليرقات وبتنقيات القدم وبعض البذور. يتغذى من خلال سبر الطين والغطاء النباتي بكامل

طول منقاره بصفة متكررة، أو عن طريق النقر من السطح، ولا يأكل في العراء أبداً. **النشاط:** ليلي، وشفقي. **السلوك الاجتماعي:** قد لا يكون اجتماعياً على نحو خاص، ولكن يمكن أن يجتمع 5 - 10 طيور منه في مكان واحد عندما تكون الظروف موثية. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يميل إلى الجثوم عندما يشعر بالتهديد، ولا يخرج من مجثمه إلا لسبب ما، ومع ضربات مسموعة غير متوقعة من جناحي طائر بهذا الحجم الصغير، وأحياناً بصريز قصير النغمة قبل الهروب سريعاً وفي طريق مباشرة على النقيض من طائر شنقب شائع، ولكنه سرعان ما يهبط مرة أخرى إلى الأرض. **باج الجناح:** 38 - 42 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



طيوطي شائعة*Actitis hypoleucos*

Common Sandpiper

غير مهدد

يتناقص

-

-

الحجم والوزن: 19 - 21 سم / 33 - 84 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر تقريباً في كامل منطقة أوراسيا شمال شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي الشتاء حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. ينتشر هذا الطائر المخوض الشائع في جميع أنحاء المملكة أثناء عبوره (مارس-أبريل، يوليو-سبتمبر)، وخلال فصل الشتاء أيضاً. **الموئل:** الأراضي الرطبة العذبة أو المالحة، بما في ذلك المياه الجارية وبحيرات مياه الصرف الصحي والخزانات وبحيرات الزينة، وكذلك الشواطئ الصخرية والموانئ، وغابات المانغروف، ولكن نادراً ما يوجد في المواقع الرملية أو الموحلة. **سلوك البحث**

عن الغذاء: النظام الغذائي: اللافقاريات، مثل الحشرات واليرقات والعناكب والقشريات والرخويات، وفي بعض الأحيان البرمائيات. لا يتغذى هذا الطائر عن طريق سبر الوحل، وإنما يعتمد إلى النقر لالتقاط الفريسة من السطح، أو مطاردة الفريسة بسرعة كبيرة أحياناً، أو سحب الفرائس من الشقوق. يتميز طيطوي شائعة بطريقة سيره الحازمة، وقفزاته الواثقة بين الصخور والعوائق على جانب الماء أثناء بحثه عن الغذاء، بينما يتمايل برأسه وذيله. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، ولكن قد توجد أعداد منه في جميع الأراضي الرطبة. وقد لوحظت أسراب مهاجرة تتألف



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



شأنه شأن عديد من الطيور

المخوّضة الأخرى، أضحي

طيوطي شائعة يهاجر حالياً

من وإلى أراضي تكاثره خلال

أقل من سنة كاملة بشكل

ملحوظ بسبب ارتفاع درجات

الحرارة السنوية.

من 250 طائراً في أوائل فصل الخريف (يوليو - أغسطس) أثناء هبوطها عند سد قاحلة بالقرب من الرياض في وقت متأخر من الظهيرة، وذلك بهدف الراحة قبل مواصلة طريقها بعيد غروب الشمس. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتميز هذا الطائر بخفة جناحه الغريبة، وطيوانه المنخفض فوق الماء عندما يتعرض للإزعاج، مع نداءات دائمة بصوت مرتفع. **باغ الجناح:** 38 - 41 سم.

طيوطي رملية*Xenus cinereus*

Terek Sandpiper

غير مهدد

يتناقص

-

-

الحجم والوزن: 22 - 25 سم / 50 - 126 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في معظم أنحاء روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 - 10,000 كم جنوباً على طول سواحل جنوب وشرق أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يُعدُّ هذا الطائر ذو المنقار المنحني لأعلى مهاجراً شائعاً واسع النطاق في جميع أنحاء المملكة (أبريل، أغسطس - سبتمبر)، حيث يستريح بعض أفرادها في الأراضي الرطبة الداخلية، وهو يقضي فصل الشتاء في جميع المناطق الساحلية، في حين تفضل تعدادات قليلة منه غير المتكاثرة البقاء خلال فصل الصيف. **الموئل:** السهول الطينية الناتجة عن المد والجزر المفتوحة والشواطئ الرملية وغابات المانغروف المغلقة، وعند الهجرة، يوجد أيضاً في البر الداخلي في أي نوع من الأراضي الرطبة تقريباً، بما فيها تلك الموجودة بمنطقة الربع الخالي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات واليرقات، مع تفضيله البراغيش والذباب الصغير، إلى جانب الرخويات والقشريات والعناكب والديدان، ويعتمد إلى التقاطها جميعاً عادةً عند انخفاض المد، عبر النقر على الماء، أو سطح الأرض ومن الغطاء النباتي، أو عن طريق شق سطح الماء بالمنقار، وفي ينبع، شوهه وهو يتغذى على اللاقاريات الموجودة على

جذوع المانغروف وجذوره. **النشاط:** نهارى، **السلوك الاجتماعي:** يميل إلى الرعي في مجموعات مبعثرة تتألف من 20 طائراً، وغالباً ما يجتمع مع غيره من الأنواع المخوّضة بحرية، وهو يكثر بشكل خاص في المواقع الساحلية، إذ سجلت أسراب الواحد منها يتضمن 500 طائر في الخليج العربي. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتميز بسلوك غريب على الأرض، إذ يركض ويمشي بسرعة مع تغيير اتجاهاته بصورة مفاجئة، كما يبسط ذيله ويطير بشكل منخفض فوق صفحة الماء، مثل طائر طيطوي شائع. **باغ الجناح:** 57 - 59 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: خليج تاروت



طيوطي حمراء الساق رقطاع*Tringa erythropus*

Spotted Redshank

غير مهدد

مستقر

الحجم والوزن: 29 - 32 سم / 97 - 230 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية في شمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 8,000 كم جنوباً حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والهند، وجنوب شرق آسيا، وأحياناً في شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محدود. يُعدُّ هذا الطائر المخوض الطويل والأنيق الذي يكاد يكون أسود اللون تماماً في موسم التكاثر، مهاجراً عابراً واسع النطاق عبر المملكة (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر)، مع وجود أعداد قليلة منه في مواقعه المفضلة شتاءً، مثل الأراضي الرطبة في بقيق وبحيرة ملاكي. **الموئل:** الأراضي الرطبة العذبة، أو المائلة للملوحة، مثل برك مياه الصرف الصحي المعالجة، وكذلك المستنقعات ذات الغطاء النباتي والسواحل الموحلة والسيخات، كما يستريح أثناء هجرته إلى جانب أي بركة تقريباً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللاقاريات، بما فيها الحشرات والديدان والرخويات والقشريات، فضلاً عن الأسماك الصغيرة والبرمائيات، وهو يتغذى بشكل رئيس عن طريق التقاط الفرائس من السطح، أو عن طريق سبر الأرض الناعمة، ولكنه قد يغمر رأسه وعنقه بالكامل أيضاً، في الماء لالتقاط الفرائس، بما في ذلك أثناء السباحة. وفي بعض الأحيان، يؤقن فرائسه بعد مطاردة قصيرة. **النشاط:** نهاري وليلي. **السلوك الاجتماعي:** هذا الطائر اجتماعي، ويُعرف عنه أنه يقتات بالتعاون مع مجموعات أخرى من الطيور صغيرة تخوض الماء معاً، وهي تقلب مناقيرها من جانب إلى آخر. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يصبح لون هذا الطائر أسود بالكامل تقريباً عندما يبلغ مرحلة التكاثر. **باج الجناح:** 61 - 67 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل

**طيوطي خضراء***Tringa ochropus*

Green Sandpiper

غير مهدد

يتزايد

الحجم والوزن: 21 - 24 سم / 53 - 119 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع مناطق خطوط العرض الوسطى لأوراسيا، امتداداً من غرب أوروبا حتى سيبيريا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 8,000 كم جنوباً في البحر الأبيض المتوسط، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن شبه الجزيرة العربية حتى جنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، زائر صيفي غير منتظم. ينتشر هذا الطائر الذي يميل لونه إلى الرمادي البني أكثر من الأخضر، في كل مكان داخل البر السعودي عند مروره (فبراير - أبريل، أغسطس - نوفمبر)، وينتشر على نطاق واسع في فصل الشتاء، بينما توجد تعدادات قليلة منه في فصل الصيف. **الموئل:** الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، بما في ذلك البرك الصغيرة والفيضانات المؤقتة وبحيرات مياه الصرف الصحي والبحيرات والخزانات والجداول. كما يسكن غابات المانغروف أحياناً. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على اللاقاريات، بما فيها القشريات والعناكب والحشرات واليرقات، خاصة الذباب والخنافس واليعسوب والعث، ويمسك الفريسة عن طريق التقاطها من سطح الماء أو تحته، ومن سطح الأرض والغطاء النباتي، وهو خواض ونادراً ما يسبر السطح. **النشاط:** نهاري، وليلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً أو في أزواج، وغالباً ما يكون الطائر المخوض الوحيد في الأراضي الرطبة الضئيلة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر رشيق، ويفضل التخفي بعض الشيء، وعندما يتعرض للإزعاج، ينطلق مسرعاً في الهواء مطلقاً نداءات حادة ومنتخذاً طريقاً متعرجة ليهبط على الأرض بعد مسافة قصيرة، وعادةً ما يلوم بذيله أثناء البحث عن الطعام. **باج الجناح:** 57 - 61 سم.

يميل طائر طيطوي خضراء إلى العودة إلى موقع التشتية نفسه كل عام، حيث يقضي 80% من نهاره، وجزءاً من ليله إذا لزم الأمر، في البحث الدؤوب عن الطعام.

يميل طائر طيطوي خضراء إلى العودة إلى موقع التشتية نفسه كل عام، حيث يقضي 80% من نهاره، وجزءاً من ليله إذا لزم الأمر، في البحث الدؤوب عن الطعام.

يميل طائر طيطوي خضراء إلى العودة إلى موقع التشتية نفسه كل عام، حيث يقضي 80% من نهاره، وجزءاً من ليله إذا لزم الأمر، في البحث الدؤوب عن الطعام.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

طيوطي أحمر الساق*Tringa totanus*

Common Redshank

غير مهدد

غير معروف

29 - 27 سم / 85 - 155 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وجنوب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر ضمن نطاق يمتد من آيسلندا حتى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم جنوباً في أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية حتى شمال أستراليا. **حاليته بالمملكة: مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع.** يُصنّف هذا الطائر المخوّض ذو السيقان الحمراء في المملكة على أنه مهاجر عابر (مارس - أبريل، أغسطس - أكتوبر)، وزائر بأعداد أقل على طول السواحل بشكل أساس خلال الشتاء. **الموئل:** يفضل المناطق الساحلية، لا سيما أشجار المانغروف والمساحات الطينية المكشوفة. كما يوجد في بعض الأحيان داخل المياه السطحية، بما في ذلك برك المطر وبرك مياه الصرف الصحي والمستنقعات والأراضي الزراعية المروية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، خاصة أسراب الذباب التي توجد موسمياً في البرك المالحة الراكدة، والأسماك الصغيرة أحياناً. ويتغذى هذا الطائر عن طريق التقاط الفرائس من الماء، أو الأرض، أو عن طريق سبر الأراضي الرطبة والغطاء النباتي، أو التقليب في النفايات.

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة


سنوياً، تغير نطاق التكاثر

لدى هذا الطائر وعديد من

الطيور المخوّضة المهاجرة

الأخرى مسافة 120 كم شمالاً

على مدى 20 عاماً.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: كورنيش جدة

**طيوطي أخضر الساق***Tringa nebularia*

Common Greenshank

غير مهدد

مستقر

30 - 35 سم / 125 - 290 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر عبر شمال أوراسيا أسفل الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 10,000 كم جنوباً، بشكل رئيس في المناطق الاستوائية والجنوبية المعتدلة في أفريقيا وصولاً إلى أستراليا. **حاليته بالمملكة: مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع.** يوجد هذا الطائر المخوّض الكبير، ذو الأرجل الخضراء والمنقار المنحني لأعلى قليلاً، في المملكة بشكل أساس على طول السواحل والأراضي الرطبة القريبة بوصفه مهاجراً عابراً واسع النطاق (مارس - مايو، أغسطس - سبتمبر) وزائراً في فصل الشتاء. **الموئل:** السهول الطينية الناتجة عن المد والجزر والأراضي الرطبة المفتوحة، بما في ذلك قنوات المياه العذبة والبحيرات، وأثناء هجرته يمكن العثور عليه عند أي مياه سطحية تقريباً، حتى البرك. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل رئيس على اللافقاريات، مثل القشريات والرخويات والديدان والحشرات واليرقات، وكذلك بعض الأسماك والبرمائيات الصغيرة، وهو يمشي بثبات، أو يجري بشكل غير منتظم بينما يلتقط الفرائس السطحية ويسبر السطح بحثاً عنها، كما أنه يمسح سطح الماء بمنقاره. **النشاط: نهاري وليلي. السلوك الاجتماعي:** غير اجتماعي في المملكة، غير أنه في بعض الأحيان يمكن العثور على مجموعات من 50 طائراً، أو أكثر أثناء الهجرة، أو في فصل الشتاء، وتكون تلك المجموعات منتشرة على مساحة رعي كبيرة في المناطق الساحلية. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول إلى حد ما، ويهرب بطيران صახب عند الاقتراب منه مسافة محددة. **باغ الجناح:** 68 - 70 سم.

شوهدت أعداد هائلة من الطيور

المخوّضة تستنفد اللافقاريات


أثناء بحثها عن الغذاء في أحد

المواقع بنسبة تصل إلى 86%

خلال أقل من أسبوعين.

الاجتماعي: غير اجتماعي في المملكة، غير أنه في بعض الأحيان يمكن العثور

على مجموعات من 50 طائراً، أو أكثر أثناء الهجرة، أو في فصل الشتاء، وتكون تلك

المجموعات منتشرة على مساحة رعي كبيرة في المناطق الساحلية. **سلوك التكاثر:**لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول إلى حد ما، ويهرب بطيران صახبعند الاقتراب منه مسافة محددة. **باغ الجناح:** 68 - 70 سم.

مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: بحيرة ملاكي



طيوطي مستنقعية*Tringa stagnatilis*

Marsh Sandpiper

غير مهدد

يتناقص

22 - 26 سم / 43 - 120 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من أوكرانيا حتى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 10,000 كم جنوباً، بشكل رئيس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن الهند حتى أستراليا، مع وجود تعدادات قليلة منه في مواقع يقضي فيها فصل الشتاء، وذلك حول كل من العراق وإيران وشبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يُصنّف هذا الطائر ذو الأرجل الطويلة بالمملكة بشكل رئيس على أنه مهاجر عابر (مارس - أبريل، أغسطس - أكتوبر)، وزائر في فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير) بتعدادات متغيرة. **الموائل:** يُفضل بحيرات المياه العذبة ومناطق المستنقعات، خاصة برك مياه الصرف الصحي المفتوحة. كما يوجد في بعض الأحيان في السبخة الناتجة عن المد والجزر المحمية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات المائية والرخويات والقشريات وبعض المواد النباتية، وهو يتغذى عبر الالتقاط من سطح المياه، أو الأرض والنباتات. وفي بعض الأحيان، يجري للاستيلاء على فريسته ويمسح الماء بواسطة منقاره، ولكنه يُعدّ الأقل بين أقرانه من الأنواع المخوّضة المماثلة له في الحجم من حيث السبر بالمنقار. وأحياناً، يتبع الأنواع الأكبر حجماً لالتقاط ما تستخرجه من طعام. وغالباً ما يخوض بمنسوب ساقه، لكنه لا يسبح، علماً أن رجليه أطول من معظم أقرانه، ويضمها خلف جسمه أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)**طيوطي الغياض**

طيوطي أجمية

Tringa glareola

Wood Sandpiper

غير مهدد

مستقر

19 - 23 سم / 34 - 98 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر عبر أوراسيا الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 10,000 كم باتجاه الجنوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن شبه الجزيرة العربية حتى أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يُعدّ هذا الطائر بخطوطه الدقيقة أحد أكثر الطيور المخوّضة في المياه العذبة شيوعاً وانتشاراً بالمملكة. كما يوجد تقريباً في جميع المناطق (بما في ذلك الربع الخالي) أثناء الهجرة (فبراير - مايو، أغسطس - أكتوبر) وخلال فصل الشتاء. **الموائل:** الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، مثل البحيرات والجداول وبحيرات مياه الصرف الصحي، وغيرها من المناطق الموحلة المفتوحة. وتنادراً ما يوجد في المواقع الساحلية، أو المالحة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على اللافقاريات، بما فيها القشريات والرخويات والديدان والحشرات واليرقات، إلى جانب بعض الأسماك والبرمائيات الصغيرة. ويحصل على الطعام عن طريق النقر وسبر سطح المياه، أو الأرض، أو عن طريق مسح المياه الضحلة بمنقاره، وهو طائر حساس، ويبدو رشيقياً إلى حد ما عند البحث عن الغذاء. **النشاط:** نهارى، **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي ويميل إلى التغذية والجنوم، ويهرب عندما يشعر بالانزعاج في مجموعات ويختلط بحرية مع الأنواع الأخرى. وقد تم تسجيله في أسراب تتألف من 100 - 200 طائر أثناء الهجرة، علماً أن أسرابه تتميز بالخلل إلى حد ما. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمتاز هذا الطائر برشاقتة. وعندما يتعرض للإزعاج فإنه قد أن ينطلق بسرعة كبيرة بعيداً عن المنطقة على الرغم من أنه قد يعود إليها قريباً بعد الطيران حولها قليلاً. **باغ الجناح:** 34 - 37 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)


حנקور	الاسم العربي:
<i>Dromas ardeola</i>	الاسم العلمي:
Crab-plover	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
معرض للانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
325 - 230 سم / 41 - 38 سم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ يتكاثر على طول سواحل الصومال وأريتريا وإيران وشبه الجزيرة العربية، ويمتد نطاق التعدادات غير المتكاثرة منه على طول الساحل الشرقي لأفريقيا وباكستان والهند وسريلانكا وتايلند، علماً أن شبه الجزيرة العربية تضم 72% من تعداده العالمي. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. يوجد على طول ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، غير أنه يتكاثر فقط في البحر الأحمر. **الموئل:** يتكاثر ضمن المناطق الرملية المفتوحة في الجزر الخالية من مصادر التهديد في البحر الأحمر، ويرعى أيضاً، في السهول الطينية الساحلية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: السلطعون والقشريات الأخرى والرخويات الصغيرة والأسماك التي يلتقطها أحياناً من خلال السبر والنقر والمطاردة. **النشاط:** شفقي، ونهاري جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في جحور مستعمرات تضم ما يصل 100 زوج، مع تباعد مداخل الجحور بمقدار يراوح بين متر واحد إلى مترين. **الأدوار الأبوية:** يُفترض أن الزوجين يتشاركان حفر جحر

يُعدُّ الحנקور من أغرب الطيور في العالم؛ فهو يضع بيضة واحدة ضخمة في عش تحت الأرض، ويعتمد على الرمال الدافئة والرطوبة المستقرة في حضن البيض.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,400
منطقة النشاط: خليج جازان



سمان الشجر الصغير	الاسم العربي:
بتراء صغيرة	الاسم العربي الآخر:
<i>Turnix sylvaticus</i>	الاسم العلمي:
Common Buttonquail	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 - 16 سم / الذكر 32 - 60 غم؛ الأنثى 39 - 70 غم (أثقل وزناً بنسبة 20%)	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن الهند حتى الفلبين، مع تعداد قليل في جنوب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. يقتصر وجود هذا الطائر الأرضي في المملكة على الأراضي المنخفضة في جنوب تهامة. **الموئل:** الحقول الزراعية والمحاصيل، بما في ذلك الذرة والذرة الرفيعة، وكذلك المناطق الغنية بشجيرات السويداء الحقيقية. ويُفترض أنه

يتكاثر في الأراضي العشبية، والمناطق ذات الغطاء الشجري، والحقول الزراعية المهملة والمحروثة (وفقاً للحالات المسجلة في أفريقيا). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** النمل، وغيره من اللافقاريات، فضلاً عن البذور، خاصة الأعشاب التي يلتقطها بعد خدش الأرض. **النشاط:** شفقي، ويلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات صغيرة متفرقة في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** تعدد أزواج متسلسل مع انعكاس بالأدوار الجنسية، أي أن الأنثى ذات الألوان الزاهية تطلق نداءات لجذب الذكر الذي يؤدي معظم واجبات العش بينما تتزاوج الأنثى مع ذكور أخرى. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى بناء العش، بينما يتولى الذكر حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة، أو تجويف في الأرض، مبطنة بالعشب، وأحياناً مع سحب سيقان النباتات الطويلة فوق العش لتشكيل مظلة سائبة. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **الفراخ:** الفراخ تترك العش في غضون أربع ساعات من الفقس، وتطير بعد 7 - 11 يوماً. **الحضنة:** متعدد الحضنات. **ملاحظة:** تمتاز الأنثى بألوانها، مقارنةً بالذكر، ويمكنها وضع أكثر من 100 بيضة في الموسم من أزواج عدة. في حين يقوم الذكر بواجبات العش وحده.

تكون إناث هذا الطائر أكثر ألواناً من الذكر، ويمكنها أن تضع ما يزيد على 100 بيضة في كل موسم من أزواج عدة، بينما يتولى الذكر وحده، ذو اللون البني الرمادي نسبياً، جميع مسؤوليات العش.

تعد أزواج متسلسل مع انعكاس بالأدوار الجنسية، أي أن الأنثى ذات الألوان الزاهية تطلق نداءات لجذب الذكر الذي يؤدي معظم واجبات العش بينما تتزاوج الأنثى مع ذكور أخرى. تتولى الأنثى بناء العش، بينما يتولى الذكر حضن البيض ورعاية الفراخ. العش: حفرة ضحلة، أو تجويف في الأرض، مبطنة بالعشب، وأحياناً مع سحب سيقان النباتات الطويلة فوق العش لتشكيل مظلة سائبة. البيض المحضون: 4 بيوض. الحضانة: 12 - 14 يوماً. الفراخ: الفراخ تترك العش في غضون أربع ساعات من الفقس، وتطير بعد 7 - 11 يوماً. الحضنة: متعدد الحضنات. ملاحظة: تمتاز الأنثى بألوانها، مقارنةً بالذكر، ويمكنها وضع أكثر من 100 بيضة في الموسم من أزواج عدة. في حين يقوم الذكر بواجبات العش وحده.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي



يسر مطوق	الاسم العربي:
<i>Glareola pratincola</i>	الاسم العلمي:
Collared Pratincole	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
22 - 25 سم / 60 - 95 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تنتشر التعدادات المقيمة منه على نطاق واسع في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وصولاً إلى شمال غرب الهند وكازاخستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر غير شائع. يوجد هذا الطائر البديع على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء الهجرة (أبريل - مايو، أغسطس - أكتوبر)، لا سيما في الغرب، وتقيم تعدادات منه على مدار العام، حيث تم توثيق تكاثره بالقرب من جدة وينبع وربما الرياض. **الموائل:** المساحات المفتوحة المسطحة بالقرب من المياه السطحية، بما في ذلك الأراضي الزراعية المروية، وبرك المياه العذبة، وحواف المستنقعات، وبحيرات مياه الصرف الصحي المعالجة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات، ومنها الجراد واليعسوب والخنافس والذباب والنمل الأبيض (الأرضة) التي يلتقطها أثناء الطيران في كثير من الأحيان، أو من الأرض بعد مطارتها في آحايين أخرى أقل. **النشاط:** شفقياً.

يحتاج هذا الطائر إلى الماء؛

فهو يعيش على طول الأنهار


والبحيرات العظمية في كل

من أفريقيا، وغرب آسيا والبحر

الأبيض المتوسط، بينما يرعى

في الأراضي الرطبة أثناء هجرته.

ضمن أسراب تتكون مما يراوح بين طائر واحد إلى 3 طيور، أو في مجموعات صغيرة أحياناً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج موسمياً تعيش في مستعمرات صغيرة متفرقة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات الدفاع عن العش، وحضان البيض، ورعاية الفراخ. **العش:** تجوف أو حفرة ضحلة في الأرض إما غير مبطنة أو مبطنة قليلاً بمواد نباتية جافة، ويوجد في العراء. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 17 - 18 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش، وتعيش بعد يومين إلى 3 أيام، وتطير بعد 25 - 30 يوماً. **الحضانة:** حضنة مفردة، انتهائية.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5

منطقة النشاط: سبخة الفصل



كروان عسلي	الاسم العربي:
دراج شائع	الاسم العربي الآخر:
<i>Cursorius cursor</i>	الاسم العلمي:
Cream-colored Courser	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
19 - 24 سم / 102 - 119 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مجموعات تمتد من غرب أفريقيا شرقاً عبر شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى باكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال غرب أفريقيا حتى أفغانستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 2,000 كم جنوباً في منطقة الساحل الأفريقي، وشمال شبه الجزيرة العربية، وشمال غرب الهند. **حاليته بالمملكة:** مقيم، متكاثر شائع، زائر شتوي غير شائع. يمكن العثور على هذا الطائر عسلي اللون والمتميز بشريط عيني أسود، بشكل أساس في شمال وشرق المملكة. **الموائل:** المساحات الرملية المفتوحة الواسعة، وصحاري السهوب الحصوية ذات الأشجار الخفيفة المتفرقة أحياناً. وغالباً ما يقضي الشتاء في الحقول المروية، خاصة تلك التي يتوافر بها الجذامة، أو القش (بقايا الزرع بعد الحصاد)، فضلاً عن الحدائق الحضرية وملاعب الغولف في بعض الأحيان. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات البالغة واليرقات واللافقاريات الأخرى، وأحياناً السحالي الصغيرة التي يلتقطها من الأرض بعد الجري، أو عن طريق الحفر. ويوفر ريشه الذهبي تمويهاً ممتازاً في التضاريس الرملية.

النشاط: نهارياً، السلوك الاجتماعي: عادةً

ما يوجد إما منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات

عائلية صغيرة، وغالباً ما يتشتت بعد التكاثر

لتكوين أسراب أكبر تضم العشرات منه في

أحياناً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج

متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:**

يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض


ورعاية الفراخ. **العش:** يُوضع البيض على

أرض مكشوفة بشكل مباشر، أو في حفرة ضحلة بمناطق مكشوفة من الرمال والحصى،

ما يوفر رؤية جيدة للطائر الحاضن للبيض. **البيض المحضون:** بيضتان، **الحضانة:** 18 -

19 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش وتعيش بعد فترة قصيرة من الفقس، وتطير بعد

26 - 28 يوماً. **الحضانة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **باغ الجناح:** 51 - 57 سم.



مقيم، متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 35,000

منطقة النشاط: حرص




أبله بني	الاسم العربي:
<i>Anous stolidus</i>	الاسم العلمي:
Brown Noddy	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
38 - 45 سم / 150 - 272 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: متشنت؛ يتكاثر في الجزر الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وهو يربى في البحار الاستوائية. ويُعرف منه خمسة أنواع فرعية، منها *A. s. plumbeigularis* الذي يتوطن جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع. يتكاثر هذا الطائر البحري الهادئ الجميل في 19 جزيرة بالبحر الأحمر قبالة القنفذة وفُرسان، ويتغذى عموماً في جنوب جدة وبحر العرب، وربما ينتشر بشكل غير منتظم في جميع أنحاء المحيط الهندي خلال فصل الشتاء. لا توجد مشاهدات خاصة به في الخليج العربي. **الموئل:** طائر بحري، وهو يربى في البحر ويتكاثر في الجزر الخالية من مصادر التهديد ذات الغطاء النباتي الكثيف، وفي المناطق الغنية بشجيرات السويدياء، ويحتم أيضاً فوق أشجار المانغروف الأسود. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يفضل الأسماك الصغيرة والحبار التي يلتقطها عن طريق التحويم، ثم غمس الرأس أو الالتقاط من السطح. كما يربى بانتظام حتى 50 كم (وفي بعض الأحيان 200 كم) من مستعمرة تكاثره، ويتشنت في جميع أنحاء المحيط الهندي في غير موسم التكاثر.

النشاط: نهاري ويلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يجثم في مجموعات، وغالباً ما يقترن بغيره من الطيور البحرية فوق أسراب الأسماك المفترسة والدلافين. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وتعشش في مستعمرات ذات كثافة عشية تُحدد بتوافر مواقع التعشيش. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** وسادة هشة من الأغصان والأوراق، مبنية على ارتفاع 10 م، فوق سطح الأرض فوق فرع ما، يراوح سمكه بين سنتيمتر واحد إلى اثنين في شجيرة ما، أو شجرة مانغروف، أو على الأرض بين الصخور، أو المنحدرات في أحيان أقل. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 28 - 37 يوماً. **مدة التعشيش:** 8 أسابيع. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 75 - 86 سم.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 7,200

منطقة النشاط: الجزر قبالة سواحل القنفذة




يسر أجنح	الاسم العربي:
<i>Glareola nordmanni</i>	الاسم العلمي:
Black-winged Pratincole	الاسم الشائع:
شبه مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
23 - 26 سم / 84 - 105 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من البحر الأسود حتى شرق كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 8,000 كم باتجاه الجنوب الغربي في غرب أفريقيا الاستوائية وجنوب أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر. رغم الموقع الجغرافي للمملكة في منتصف المسافة بين مناطق تكاثر هذا الطائر ومناطق قضاء فصل الشتاء، إلا أن ما يثير الدهشة هو مرور تعدادات قليلة منه عبر المملكة أثناء الهجرة (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، بينما يُفترض أن معظم تعداداته تهاجر شمال المملكة قبل السفر جنوباً نحو أفريقيا، أو قد تعبر المملكة من دون اكتشافها عبر اجتياز مناطق نائية وجافة على ارتفاعات عالية في رحلة واحدة من دون توقف. **الموئل:** يوجد أينما تتوافر الحشرات الطائرة، خاصة الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: أي حشرة طائرة تقريباً، بما في ذلك الجراد والجنادب والصراصير واليعاسيب والنحل والدبابير والنمل الأبيض (الأرضة)، وغيرها التي يلتقطها بشكل أساس مستخدماً جناحه، علماً أن وجود الذيل المتشعب الذي يتميز به هذا الطائر يشيع في الطيور التي تتطلب حفة حركة كبيرة لصيد الحشرات الطائرة أثناء طيرانها، كما يتغذى على الأرض عبر مطاردة الفرائس بسرعة. **النشاط:** شفقي، ونهاري، وهو يهاجر نهاراً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يكون منفرداً، أو في أزواج، غير أن هناك سجلات لأسراب تتألف من 14 و40 طائراً. وشوهدت تلك المجموعة الكبيرة أثناء انهماكها في التغذية على الأرض في منطقة رملية جافة من مزرعة مروية كبيرة، إذ كانت منتشرة أثناء بحثها عن الحشرات وغيرها من اللافقاريات. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

مثل طائر السنونو، يستخدم هذا الطائر ذيله المتشعب لمساعدته في اصطيد الحشرات أثناء مطاردتها، بينما يوفر عمق التشعب الذي يساوي نحو نصف الطول الكلي للذيل قدرة على الدوران مثالية.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل



نورس رأس*Larus ridibundus*

Black-headed Gull

غير مهدد

غير معروف

37 - 43 سم / 193 - 325 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




طائر بالغ يمكنه التكاثر



طائر بالغ غير قادر على التكاثر

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه داخل البر بشكل أساس في غرب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جميع أنحاء العرض الوسطى في أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم غالباً في شمال الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ومياه جنوب آسيا، من شبه الجزيرة العربية حتى اليابان. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي شائع جداً، زائر صيفي غير منتظم. يشيع وجوده على السواحل في فصل الشتاء (توفمبر - مارس)، وفي العقود الأخيرة، أصبح زائراً شائعاً واسع النطاق شتاءً في المسطحات المائية الداخلية، جنوباً إلى خميس مشيط. وفي حين تعبر تعدادات منه الطريق بين أوراسيا والهند، أو أفريقيا، تبقى تعدادات قليلة منه خلال فصل الصيف. **الموئل:** المناطق الساحلية، بما في ذلك الموانئ وحول قوارب الصيد، خاصة في مواضع إلقاء الأسماك، ويوجد أيضاً، في مناطق بحيرات مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات ومنتزهات المدينة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يفضل اللافقاريات المائية والبحرية والأسماك والجيلف ومخلفات الحيوانات الأخرى من الأطعمة. يتغذى فوق سطح الماء بالسباحة والغطس، أو عن طريق الالتقاط من السطح، إلى جانب متابعة القوارب والعبارات بانتظام. أما في البر، فيتغذى بالمشي مع سبر الوحل. كما يلتقط بقايا الطعام في المنتزهات، ويمكن العثور عليه بشكل خاص حيث الطعام واسع الانتشار، مثل مكبات النفايات، مع تسجيل ما يزيد على 3,000 طائر منه في مكب نفايات بقيق. كذلك، وهو يحوم ويلتقط الحشرات الطائرة، أو الطعام الملقى في الهواء، أو يرفرف فوق السطح لالتقاط الأشياء. **النشاط:** نهاري، ويلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أسراب يصل تعدادها في بعض الأحيان إلى 100 - 200 في المسطحات المائية الداخلية، أو ما يزيد على 2,000 بالقرب من السواحل. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتميز بطيران أكثر حركة وخفة، مقارنة بطيور النورس الأكبر حجماً. **باع الجناح:** 94 - 110 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: أي ساحل

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

نورس مستدق المنقار*Larus genei*

Slender-billed Gull

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

متقلب

42 - 44 سم / 220 - 350 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول شمال أفريقيا والكويت والعراق وسواحل إيران حتى باكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر حول البحر الأبيض المتوسط حتى كازاخستان وأفغانستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين والمياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** زائر دائم شائع. يتكاثر هذا النورس الأبيض اللامع بالقرب من مصر والكويت والعراق وإيران، وهو زائر شائع لكلا الساحلين في جميع الأشهر، خاصة في فصل الشتاء. ونادراً ما يُشاهد في البر الداخلي (في الرياض ويلي)، ما يشير إلى محدودية هجرته عبر شبه الجزيرة العربية. **الموئل:** المياه الساحلية الضحلة الهادئة والمناطق الناتجة عن المد والجزر، علماً أنه يتجنب الموانئ وأنواع النورس الأخرى، ويوجد أحياناً في مواقع المياه العذبة بالقرب من الساحل، مثل سيخة الفصل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يفضل الأسماك واللافقاريات البحرية، ويصطاد فرائسه بخفة ونشاط عبر السباحة، أو الغطس من السطح، أو غمر أعلى جسمه في المياه الضحلة، أو عن طريق الغطس في البحر

يُشاهد هذا الطائر على طول

الساحلين في جميع أشهر


السنة، لكن تزداد أعداده على

نحو خاص في فصل الشتاء،

إذ سُجّلت أسراب مؤلفة من

4,000 طائر كحد أقصى.

أثناء الطيران من ارتفاع يناهز متراً واحداً فوق سطح البحر، كما يحب التخويض في المياه الضحلة والمناطق الناتجة عن المد والجزر، حيث يمكنه العثور على اللافقاريات في الطين والأسماك الصغيرة المحاصرة في البرك الصخرية. وتقوم مجموعات صغيرة منه أحياناً، بالتعاون في الصيد، وذلك عن طريق محاصرة الأسماك في المياه الضحلة. يمكنه أن يتغذى على الجيف، ولكنه نادراً ما يبحث في مناطق القمامة، مثل نورس رأس. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي؛ وعادةً ما يتكاثر ويرعى ويحتم ويهاجر في مجموعات، بينما تزايد أعداده بشكل خاص في فصل الشتاء حيث تبلغ أسرابه نحو 4,000 طائر. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باع الجناح:** 102 - 110 سم.



زائر طوال العام

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: كورنيش جدة


ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

نورس أسحم	الاسم العربي:
<i>Larus hemprichii</i>	الاسم العلمي:
Sooty Gull	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
43 - 48 سم / 400 - 510 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ يتكاثر على الجزر في البحر الأحمر وبحر العرب وجنوب الخليج العربي وعلى سواحل باكستان وشرق أفريقيا (جنوباً إلى كينيا). كما يربى عادةً في المياه المجاورة في حدود 500 كم من مواقع التكاثر. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. يتكاثر هذا النورس ذو اللون الداكن المميز على الجزر الخالية من مصادر الإزعاج في البحر الأحمر، ويرعى بطول السواحل القريبة، علماً أن الطيور التي تتكاثر في الجزر (غير المملكة العربية السعودية) في جنوب الخليج العربي كثيراً ما ترعى في المياه الإقليمية للمملكة، خاصة في خور الدويعين، ولكن نادراً ما تتكاثر شمال قطر. **الموائل:** يتكاثر في جزر البحر الأحمر الصخرية، أو الرملية القاحلة ذات الغطاء النباتي المتناثر والخالية من مصادر التهديد ومن الحيوانات المفترسة. كما يربى في البحر الأحمر وعلى طول الساحل، لكن نادراً ما يتوغل في الداخل. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على الأسماك الميتة والمتساقطة التي يلتقطها عن طريق البحث على طول الخط الساحلي، أو في بعض الأحيان خلف السفن. كما يتحين الفرص لاصطياد فقس السلاحف، وبيض وفراخ الخرشنة والطيور البحرية الأخرى، بما في ذلك الغاق السقطري، فضلاً عن سرقة الطعام من الطيور الأخرى. **النشاط:** نهاري.

السلوك الاجتماعي: عادةً ما يربى منفرداً، على الرغم من كونه اجتماعياً في أوقات الراحة. **سلوك التكاثر:**



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,500

منطقة النشاط: الجزر قبالة سواحل القنفذة

نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، أو منفردة، أو في تجمعات صغيرة متفرقة في أعشاش يفصلها عن بعضها من عشرة إلى مئات الأمتار. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** تجويف فوق سطح الأرض ويكون غير مبطن، أو يحتوي على بعض السيقان النباتية، أو العصي الصغيرة، أو الحجارة، أو العظام. ويكون العش محمياً

بشجيرة، أو صخرة متدلية، أو أحياناً من دون حماية في العراء. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 25 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش بعد فترة قصيرة من الفقس، لكن عمرها في أول طيران لها غير معروف. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 105 - 118 سم.



نورس رأس كبير

<i>Larus ichthyaetus</i>	الاسم العربي:
Pallas's Gull	الاسم العلمي:
غير مهدد	الاسم الشائع:
يتزايد	حالة الحماية العالمية:
-	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
60 - 72 سم / 900 - 2,000 غم	المنحى الإقليمي للمجموعة:
	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر ابتداءً من أوكرانيا وصولاً إلى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء حتى مسافة 4,000 كم جنوباً في المياه شرق البحر الأبيض المتوسط وحول شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى ميانمار. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي غير شائع؛ زائر صيفي نادر جداً. يوجد هذا الطائر البديع بصورة منتظمة شتاءً (نوفمبر - مارس) على طول شواطئ الخليج العربي، مع عدد أقل على سواحل البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يزور الأراضي الرطبة بالقرب من الساحل، لكنه نادراً ما يغامر بالتوغل داخل البر. قد يتحرك بصورة محدودة في جميع أنحاء المملكة، ولكن يبدو أن معظم حركته تكون على طول السواحل. **الموائل:** يفضل السواحل والموانئ وعرض البحر. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: الأسماك (بما فيها الأسماك الميتة على الشاطئ) والقشريات، وغيرها من اللافقاريات البحرية، فضلاً عن اللافقاريات الأرضية والحشرات الطائرة، مثل الجراد، علماً أنه يُغزى بانتظام على الطيور البحرية الأخرى، فيسرق طعام النورس الصغيرة وغيرها من الطيور التي تتغذى على الأسماك. كما يتبع القوارب ويلتقط الأسماك المتساقطة منها، وينجذب إلى مصادر الطعام البشري كالموائى ومكب النفايات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يربى منفرداً، ويستريح في مجموعات صغيرة متفرقة تتألف من 20 طائراً كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمتاز هذا الطائر برشاقته في التحويم، أو التحويم على طول السواحل مستغلاً تيارات الرياح البرية، قد يبدو ثقيلاً أثناء زفرته للطيوان. ومع ذلك، يمكنه اتخاذ انعطافات مفاجئة تتسم بالسرعة وخفة الحركة لمطاردة الطيور البحرية الصغيرة ومضايقتها. ويتميز الطائر البالغ المتكاثر برأس أسود مع حلقة بيضاء واضحة حول عينيه، في حين تتميز الطيور التي لا يمكنها التكاثر والفراخ في شتائها الأول برأس رمادي مائل إلى البني. **باغ الجناح:** 155 - 170 سم.

بطوله الذي يقدر بنحو 72 سم، ووزنه الذي يصل إلى 2 كغم، يُعدّ نورس رأس أكبر أنواع طيور النورس في المملكة، وأحد أكبرها في العالم.



طائر بالغ يمكنه التكاثر



زائر شتوي، زائر صيفي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: خليج القطيف




نورس شائع

الاسم العربي:	نورس شائع
الاسم العلمي:	<i>Larus canus</i>
الاسم الشائع:	Mew Gull
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	غير معروف
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	40 - 46 سم / 290 - 552 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أوراسيا (من أيسلندا حتى سيبيريا)، وفي الأسكا وغرب كندا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم في شمال المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين. **حالته بالمملكة: زائر شتوي نادر.** يُعدُّ نورس شائع زائراً شتوياً نادراً بمنطقة الخليج العربي (شمال الجبيل) والبحر الأحمر (شمال ينبع)، ونادراً ما يتم تسجيله في البر الداخلي. **الموئل:** المناطق الساحلية، لا سيما الموانئ، وأماكن توريد الأسماك عقب اصطيادها، والسهول الطينية، ونادراً ما يوجد في مكب النفايات بالبر الداخلي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات الأرضية والمائية والأسماك الصغيرة، وحتى الثدييات الصغيرة والحييف وبعض البذور. ويفضل الرعي في المواقع الأرضية والساحلية بدلاً من التوغل في البحر. ويستخدم قدميه في المناطق الموحلة للعثور على الطعام، أو يجذب بهما لاستخراج الفرائس من فوق سطح الماء، أو تحته مباشرة، وقد شوهد وهو يسقط الرخويات على الأسطح الصلبة لكسرها لاصطيادها وأكل محتوياتها. كما أنه يسرق أحياناً الطعام من طيور النورس الأخرى، ويمكنه أن يصطاد الحشرات في الهواء مستغلاً طيرانه الخفيف. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أعداد صغيرة، وأحياناً في أسراب مختلطة بنورس أخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 110 - 125 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: ساحل الخليج العربي

**نورس أبيض العين**


الاسم العربي:	نورس أبيض العين
الاسم العربي الآخر:	نورس غرب
الاسم العلمي:	<i>Larus leucophthalmus</i>
الاسم الشائع:	White-eyed Gull
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	39 - 43 سم / 274 - 415 غم



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ متوطن في حوض البحر الأحمر، ويتكاثر في الجزر الواقعة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية وأفريقيا، بينما يربى بشكل رئيس في البحر الأحمر وخليج عدن على بُعد 700 كم من مواقع تكاثره، وهو طائر مستقر إلى حد كبير، رغم أن بعض أفراده تتجول بعد موسم التكاثر عبر قناة السويس وصولاً إلى شرق البحر المتوسط، أو شرق أفريقيا، أو الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** يتكاثر هذا الطائر البحري شبه المتوطن في نحو 20 جزيرة بالبحر الأحمر، ويرعى في المياه المحيطة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الرملية النائية القاحلة الخالية من مصادر التهديد والحيوانات المفترسة، ويرعى في المياه المحيطة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يفضل الأسماك، إلى جانب بعض أنواع سرطان البحر واللافقاريات البحرية الأخرى، وغالباً ما يلتقط الأسماك عن طريق الغطس من السطح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في مجموعات صغيرة، رغم أنه يمكن أن يشكل أسراب رعي تضم المئات منه، أو حتى الآلاف خلال فصل الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مستعمرات صغيرة تضم نحو 60 زوجاً (في أعشاش يفصلها عن بعضها مسافة 3 - 10 م)، وأحياناً في مستعمرات عدة منفصلة في جزيرة واحدة.

يقتصر وجود هذا النورس على البحر الأحمر، ويتكاثر في الجزر والجزر الصغيرة الواقعة قبالة سواحل أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما في ذلك 20 جزيرة تابعة للمملكة.

في أرض جرداء مفتوحة ومنبسطة، عادةً على بُعد 100 م من الشاطئ. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (27 - 29 يوماً في الأنواع المماثلة). **الفراخ:** تهجر الفراخ العشب بعد فترة قصيرة من الفقس، وعمرها في أول طيران لها غير معروف. **الحضانة:** غير معروفة. **باغ الجناح:** 110 - 115 سم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,000
منطقة النشاط: عبارة جزيرة فرسان



نورس أرمني*Larus armenicus*

Armenian Gull

شبه مهدد

يتناقص

57 - 60 سم / 950 - 1,050 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أرمينيا وشرق تركيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في تركيا وجورجيا وشمال غرب إيران، بينما يغادر ليقضي فصل الشتاء لمسافة 1,000 كم جنوباً، بشكل رئيس في شرق البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس وخليج العقبة وشمال الخليج العربي. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي محدود. يُعدُّ هذا النورس شبه المجهول زائراً شتوياً للمملكة، ويقتصر وجوده إلى حد كبير على المياه الشمالية البعيدة للبحر الأحمر والخليج العربي، رغم أنه يتجول أحياناً في اتجاه الجنوب نحو الظهران إن لم يكن إلى خليج سلوى. **الموئل:** يفضل المياه الساحلية والبحيرات القريبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي؛ غير معروف بما يكفي. ومن المفترض أنه يشمل الأسماك واللافقاريات والحيف التي يلتقطها من المياه الساحلية والداخلية. ومن المحتمل

كما يوحي اسمه، يتكاثر

هذا الطائر في المقام الأول


في أرمينيا والدول المجاورة،

ويهاجر جنوباً حتى يصل إلى

المياه قبالة شمال المملكة

العربية السعودية.

أنه يبحث في مكب النفايات شأنه شأن عديد من أنواع طيور النورس الأخرى. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يرعى ويستريح ضمن أسراب كبيرة من طيور النورس الكبيرة الأخرى ذات الرؤوس البيضاء، مثل نورس أظهر صغير (وكل من النورس السيبيري ونورس السهوب). **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** حتى وقت قريب، اعتُبر النورس الأرمني نوعاً فرعياً من نورس الرنكة الأوروبي (*L. argentatus*)، أو النورس أصفر الساق (*L. michahellis*). لذلك؛ نجهل الكثير عنه وعن سلوكه في المملكة. **باع الجناح:** 140 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: كورنيش الخبر

**نورس أظهر صغير***Larus fuscus*

Lesser Black-backed Gull

غير مهدد

يتزايد

51 - 61 سم / 550 - 1,200 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أوراسيا (من آيسلندا حتى شبه جزيرة تايمير)، وغالباً فوق الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 10,000 كم إلى الجنوب في شمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي المياه حول شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى سريلانكا وشرق الصين. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يُعدُّ هذا الطائر مهاجراً عابراً شائعاً، وزائراً شتوياً بأعداد كبيرة لجميع المناطق الساحلية، من أواخر الصيف حتى انقضاء الشتاء، فيما يغادر قبل حلول أبريل. طائر غير شائع في البر الداخلي. وقد تم أعداد صغيرة منه عبر شبه الجزيرة العربية. علماً أن الطيور الثلاثة التالية التي تُعدُّ من الأنواع الفرعية توجد جميعها في المملكة، وهي أنواع متميزة: نورس أظهر النادر والأصغر حجماً (*Larus f. fuscus*) بتعدادات صغيرة كل عام في البحر الأحمر والخليج العربي، والنورس السيبيري (*L. f. heuglini*) الذي يوجد في الخليج والجزء الشمالي من البحر الأحمر، ونورس السهوب (*L. f. barabensis*) في الخليج العربي أيضاً. **الموئل:** السهول الطينية الساحلية، والموانئ ومكب النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي؛ يفضل الأسماك واللافقاريات المائية والبرية والبيوض

والفراخ والقوارض والأسماك المتساقطة والحيث. كما يتتبع قوارب الصيد بانتظام ويزور المناطق الحضرية البشرية، مثل مكبات النفايات للبحث عن الطعام، ويرعى عن طريق الغمس التلامسي والغطس عبر السطح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يمكن أن يتغذى بشكل منفرد، أو في مجموعات صغيرة، أو ضمن أسراب تضم آلاف عدة من الطيور (مثل مكب بقيق)، وغالباً ما يختلط بالنورس الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** ربما يكون هذا الطائر من أكثر الأنواع التي يخطئ الجميع في التعرف إليها بالمملكة. أحياناً تترافق أنواع أخرى مع بعضها بعضاً، كما هي الحال مع نورس السهوب (*L. f. barabensis*) والنورس القزويني. **باع الجناح:** 124 - 127 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: خليج تاروت



خرشنة مقنعة	الاسم العربي:
<i>Onychoprion anaethetus</i>	الاسم العلمي:
Bridled Tern	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
38 - 95 سم / 150 - 95 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في الجزر الاستوائية وشبه الاستوائية والسواحل المحيطة بأميركا الوسطى وغرب أفريقيا والمحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وصولاً إلى أستراليا. كما يرعى في المحيطات المحيطة بتلك المناطق (يغادر المياه العربية عموماً). **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شائع جداً. يتكاثر هذا الطائر الأنيق ذو الذيل الطويل والمتشعب في جزر البحر الأحمر والخليج العربي، بينما يقضي الشتاء (على الأرجح) في غرب المحيط الهندي. وقد تم توثيق وجود الطيور التي طُوقت في الخليج بمناطق نائية جداً، مثل اليابان. **الموئل:** بحري، يتكاثر فوق الجزر الصخرية، أو الرملية وفيرة الظلال والمنخفضة غير المأهولة، ويرعى في البحر. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على أسراب الأسماك الصغيرة (عادةً التي يقل طولها عن 3 سم)، وبيض السمك والحبار الذي يلتقطه عن طريق الغطس عبر السطح، أو الغمس التلامسي من ارتفاع متر واحد، وهو متخصص في الرعي في مناطق ضعيفة الإنتاج، لذلك يتجنب المنافسة مع طيور خرشنة أخرى. وعادةً ما يرعى في المملكة بعيداً عن الشواطئ. **النشاط:** نهارى، ويلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وتعيش في مستعمرات



مهاجر متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 110,000
منطقة النشاط: جزر الخليج العربي



نورس قزويني	الاسم العربي:
<i>Larus cachinnans</i>	الاسم العلمي:
Caspian Gull	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
58 - 68 سم / 680 - 1,500 غم	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في نطاق يمتد من صربيا حتى قيرغيزستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من بحر قزوين حتى شرق كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم في أوروبا والبحر الأسود وحول شبه الجزيرة العربية، وصولاً إلى باكستان. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي شائع، زائر صيفي محدود. يُعدُّ هذا الطائر الكبير زائراً شتوياً

شائعاً في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تصل معظم تعداداته إلى تلك المنطقتين خلال أكتوبر وتغادر في أبريل. كما يوجد بانتظام في الأراضي الرطبة الداخلية لكن بأعداد صغيرة، إذ يبقى أحياناً حتى حلول فصل الشتاء، في حين قلة منه تظهر خلال أشهر الصيف. **الموئل:** المناطق الساحلية، بما في ذلك الموانئ وبحيرات مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الأسماك، فضلاً عن اللافقاريات والجيف وبقايا طعام الإنسان، وهو يتغذى بشكل رئيس عن طريق التخويض في مناطق المد والجزر، أو الغطس السريع. كما يدهم أعشاش الطيور البحرية المقيمة في مستعمرات، بما في ذلك الغاق السقطري في الخليج العربي، ويسرق الطعام من الطيور البحرية الأخرى، ويتبع السفن بحثاً عن الأسماك المتساقطة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أعداد صغيرة، على الرغم من إمكانية مشاهدته بأعداد هائلة داخل أسراب مختلطة من النوارس الكبيرة بيضاء الرأس. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** كان هذا النوع يُصنّف سابقاً على أنه متفرع من نورس الرنكة الأوروبية (*L. argentatus*). مع ملاحظة أن الطيور غير البالغة من هذين النوعين هي غير قابلة للتمييز بشكل عام، ما يسبب الارتباك. **باغ الجناح:** 137 - 145 سم.

شائعاً في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث تصل معظم تعداداته إلى تلك المنطقتين خلال أكتوبر وتغادر في أبريل. كما يوجد بانتظام في الأراضي الرطبة الداخلية لكن بأعداد صغيرة، إذ يبقى أحياناً حتى حلول فصل الشتاء، في حين قلة منه تظهر خلال أشهر الصيف. **الموئل:** المناطق الساحلية، بما في ذلك الموانئ وبحيرات مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الأسماك، فضلاً عن اللافقاريات والجيف وبقايا طعام الإنسان، وهو يتغذى بشكل رئيس عن طريق التخويض في مناطق المد والجزر، أو الغطس السريع. كما يدهم أعشاش الطيور البحرية المقيمة في مستعمرات، بما في ذلك الغاق السقطري في الخليج العربي، ويسرق الطعام من الطيور البحرية الأخرى، ويتبع السفن بحثاً عن الأسماك المتساقطة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أعداد صغيرة، على الرغم من إمكانية مشاهدته بأعداد هائلة داخل أسراب مختلطة من النوارس الكبيرة بيضاء الرأس. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** كان هذا النوع يُصنّف سابقاً على أنه متفرع من نورس الرنكة الأوروبية (*L. argentatus*). مع ملاحظة أن الطيور غير البالغة من هذين النوعين هي غير قابلة للتمييز بشكل عام، ما يسبب الارتباك. **باغ الجناح:** 137 - 145 سم.



نورس قزويني بالغ



زائر شتوي، زائر صيفي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: كورنيش الخبر



خرشنة سوندرزية*Sternula saundersi*

Saunders's Tern

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

متقلب

20 - 28 سم / 40 - 45 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر ومشتت؛ يتكاثر في شمال المحيط الهندي، من الصومال وحول شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى سريلانكا، بينما يقضي فصل الشتاء بشكل رئيس في البحر الأحمر، وعلى طول الساحل الشرقي لأفريقيا وصولاً إلى مدغشقر. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع، زائر دائم غير منتظم. يتكاثر هذا الطائر البحري الصغير على طول سواحل المملكة وفي جزر البحر الأحمر والخليج العربي القريبة. خلال الشتاء، تظل نسبة أكبر منه في البحر الأحمر، مقارنة بالخليج العربي، حيث يصبح محدوداً. **الموائل:** يفضل المناطق الساحلية، ويتكاثر على ارتفاع أقل من متر واحد فوق مستوى سطح البحر في المناطق المكشوفة الخالية من النباتات وفوق الرمال، أو السبخة الصلبة، أو الحصباء، بينما يربى في المياه الضحلة على طول السواحل والجزر القريبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الأسماك الصغيرة والقشريات والرخويات التي يلتقطها عن طريق التحويم، ثم الغطس السريع في المياه الضحلة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في مجموعات صغيرة تتكون من 25 طائراً كحد أقصى. كما يوجد في تجمعات كبيرة خلال فصل الخريف مع تسجيل ما يزيد على 11,000 طائر في رأس أبوعلي. **سلوك التكاثر:** نظام



مهاجر متكاثر، زائر دائم

الأزواج المتكاثر سنوياً: 2,000

منطقة النشاط: رأس أبو علي

**خرشنة صغيرة***Sternula albifrons*

Little Tern

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

22 - 28 سم / 47 - 63 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه على طول السواحل والأنهار الكبرى في شمال وغرب أفريقيا، وبشكل غير منتظم من تركيا حتى شمال الهند وأستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في غرب أوروبا وصولاً إلى كازاخستان وشبه الجزيرة العربية وأقصى شرق آسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً حول شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى أستراليا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يُصنف هذا الطائر في المملكة على أنه مهاجر عابر (أبريل - مايو، سبتمبر)، وزائر شتوي غير شائع، ومهاجر نادر في الأراضي المنشأة الرطبة بالمنطقة الشرقية (شمال الهفوف على بُعد 70 كم من الساحل) وينبع أحياناً. **الموائل:** يتكاثر في الأراضي الرطبة العذبة، أو المائلة للملوحة، بما في ذلك المستنقعات وقنوات

الري والمناطق المغمورة بالمياه وبحيرات

مياه الصرف الصحي المعالجة، ويرعى كذلك

في المناطق الساحلية. **سلوك البحث عن****الغذاء:** النظام الغذائي: الأسماك الصغيرة

(حتى 6 سم)، والقشريات التي يلتقطها عن

طريق مسح المياه الضحلة والتحويم، ثم

الغطس السريع، مع العلم بأنه يقوم بذلك

بصورة متزامنة أحياناً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي. **سلوك****التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش في مستعمراتصغيرة تضم أقل من 25 عشاً متفرقاً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضنالبيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة، أو تجويف طبيعي في أرض مفتوحة، وتكونغير مبطنة أو خفيفة التبتين بمواد نباتية، أو رقائق طينية، أو كسرة أصداف. **البيض****المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 21 - 24 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش بعد أيامقليلة من الفقس، وتطير بعد 20 - 24 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** هذا النوع

شديد الشبه بخرشنة سوندرزية، ورغم ذلك فإن بياض جبهته يمتد ليصل إلى خلف

العين، مع وجود تدرج للون الأسود أقل في مقدمة الرأس، وعادة ما تكون سيقانه باللون

الأصفر المشرق. **باع الجناح:** 47 - 55 سم.

مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً: 200

منطقة النشاط: سبخة الفصل

خرشنة قزوينية*Hydroprogne caspia*

Caspian Tern

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر

48 - 56 سم / 574 - 782 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في غرب وجنوب أفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في أمريكا الشمالية وشمال أوروبا وآسيا الوسطى، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 4,000 كم جنوباً، في أمريكا الوسطى وأفريقيا والهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد هذا الطائر الهائل، وهو الأكبر من نوعه في العالم، في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة وفي فصل الشتاء (بشكل رئيس في المواقع الساحلية)، وهو يتكاثر بشكل رئيس أيضاً، في جزر البحر الأحمر. **الموئل:** يتكاثر في جزر البحر الأحمر الصغيرة الرملية النائية غير المأهولة والخالية من المفترسات الأرضية، ويرعى بطول الساحلين وفي السبخة المغمورة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**

يتغذى بشكل رئيس على الأسماك الصغيرة إلى متوسطة الحجم (حتى 25 سم) التي يلتقطها بالغطس بعد التحويم. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يرعى منفرداً، أو في أزواج، أو أسراب متفرقة تصل إلى 10 طيور، رغم أنه قد يجثم أثناء المد العالي في مجموعات تضم ما يزيد على 150 طائراً. وفي بعض الأحيان، قد ينشئ مناطق تغذية فردية في فصل الشتاء.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 150
منطقة النشاط: ميناء وكورنيش جدة الجنوبي



هذا الطائر هو أكبر خرشنة في

العالم، ويعود إلى مستعمرة

التكاثر نفسها في حال نجاح

العش السابق، فيما يفضل

الانتقال إلى موقع جديد في

حال فشل العش السابق.

أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش منفردة في مستعمرات صغيرة تضم حتى 4 أزواج. **الأدوار الأبوية:** يتولى الزوجان حضن البيض، ورعاية الفراخ، والدفاع بقوة عن العش. غالباً ما ينقض الطائر انقضاضاً شديداً متفادياً رؤوس الدخلاء من البشر بهامش ضئيل جداً لغرض التخويق. **العش:** حفرة ضحلة في أرض مكشوفة، إما مبطنه قليلاً بالحجارة الصغيرة، أو الأصداف أو قطع المرجان، أو بقايا النبات، أو غير مبطنه. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 26 - 28 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش بعد أيام قليلة من الفقس، وتطير بعد 35 - 45 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باج الجناح:** 127 - 140 سم.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة

أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش منفردة في مستعمرات صغيرة تضم حتى 4 أزواج. **الأدوار الأبوية:** يتولى الزوجان حضن البيض، ورعاية الفراخ، والدفاع بقوة عن العش. غالباً ما ينقض الطائر انقضاضاً شديداً متفادياً رؤوس الدخلاء من البشر بهامش ضئيل جداً لغرض التخويق. **العش:** حفرة ضحلة في أرض مكشوفة، إما مبطنه قليلاً بالحجارة الصغيرة، أو الأصداف أو قطع المرجان، أو بقايا النبات، أو غير مبطنه. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 26 - 28 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش بعد أيام قليلة من الفقس، وتطير بعد 35 - 45 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باج الجناح:** 127 - 140 سم.

حضانة مفردة. **باج الجناح:** 85 - 103 سم.

خرشنة نورسية منقار*Gelochelidon nilotica*

Common Gull-billed Tern

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

33 - 43 سم / 190 - 290 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في أمريكا الوسطى والجنوبية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى وشرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً، في المناطق الاستوائية، بما في ذلك حول شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع. بمنقاره الثقيل والفريد من نوعه، يُعدُّ هذا الطائر مهاجراً عابراً غير شائع (فبراير - مارس، أغسطس - نوفمبر)، وزائراً شتوياً، وهو يتكاثر أحياناً في المنطقة الشرقية، مع سجلات في الزخونية وسبخة الفصل. **الموئل:** يفضل المواقع الساحلية، بما في ذلك الخلجان والسهول الطينية والبحيرات المالحة، وأشجار المانغروف. ويوجد بأعداد أقل في المواقع الداخلية، مثل مزارع الأسماك وبحيرات مياه الصرف الصحي ومكب النفايات. كما سبقت مشاهدة أعشاشه في جزيرة شاطئية تحتوي على شجيرات خفيضة (الزخونية)، وفي السبخة (سبخة الفصل). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل انتهازى على جميع أنواع الحشرات، بما في ذلك الجنادب واليعاسيب والبعث. كما يتناول الجراد خلال رحلات الهجرة الجماعية، فضلاً عن الزواحف الصغيرة والضفادع والأسماك، وهو يتغذى عن طريق مطاردة الحشرات في الجو، أو الاصطياد بسرعة على سطح الماء. **النشاط:** نهارى.

السلوك الاجتماعي: يوجد بأعداد صغيرة، رغم إمكانية تجمع ما يزيد على 100 طائر

منه أثناء الهجرة وخلال فصل الشتاء على

طول ساحل البحر الأحمر الجنوبي والخليج

العربي. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:**

أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش

في مستعمرات صغيرة متفرقة تضم أقل

من 12 زوجاً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان

مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ.


العش: حفرة ضحلة فوق سطح الأرض،

وتكون مبطنه بالمواد النباتية، وعادةً بالقرب

من حزم النباتات. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 22 - 23 يوماً. **الفراخ:** تهجر

الفراخ العش بعد أقل من 4 أيام من الفقس، وتطير بعد 28 - 30 يوماً. **الحضنة:** عادةً

حضنة مفردة. **باج الجناح:** 85 - 103 سم.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10
منطقة النشاط: كورنيش الخبر

خرشنة عصماء*Chlidonias leucopterus*

White-winged Tern

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

23 - 27 سم / 42 - 79 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شرق أوروبا وصولاً إلى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 9,000 كم جنوباً في أفريقيا وجنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محلي، زائر صيفي غير منتظم، مفقيد، متكاثراً محتمل. يُصنّف هذا الطائر في المملكة على أنه مهاجر عابر شائع

وواسع الانتشار (مارس - يونيو، أغسطس - أكتوبر)، رغم أن أسرابه قد تهاجر أيضاً على طول السواحل. وتكون تعداداته المهاجرة في الربيع أكثر عدداً على نحو خاص، وهو يفضل قضاء الشتاء في الأراضي الرطبة الساحلية المطلة على البحر الأحمر جنوب ينبع، وبشكل غير منتظم في أماكن أخرى، علماً أن قلة منه تفضل البقاء في الأراضي الرطبة الواسعة خلال فصل الصيف متلحفة بريش تكاثرها، ما يشير إلى احتمالية تكاثره في المملكة. **الموئل:** حقول الأعلاف والأراضي الرطبة في مزارع الألبان والأراضي الرطبة المفتوحة، أو الزراعية في البر الداخلي والمحاصيل المروية. ونادراً ما يتم تسجيله قرب السواحل. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يفضل اللافقاريات المائية والبرية والأسماك والبرمائيات والضفادع الصغيرة التي يصطادها عن طريق التقاطها من سطح الماء، أو الأرض، أو الغطاء النباتي. لا يغطس إذ إنه متغذٍ جويّ بامتياز، يلتقط الحشرات الطائرة أثناء تحليقه بانتظام. وغالباً ما يتتبع مجزئات القش ملتقطاً الحشرات المضطربة، أحياناً بالاشتراك مع خرشنة المستنقعات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، يتم تسجيله عادةً في مجموعات تصل إلى 10 طيور في الشتاء، وأحياناً في أسراب أكبر أثناء الهجرة، حيث سُجّل ما يزيد على 1,000 طائر بدومة الجندل في فصل الربيع. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك، **بأج الجناح:** 56 - 67 سم.

توجد هذه الخرشنة الجميلة المتميزة باللونين الأبيض والأسود بكثرة في فصل الربيع. خلال إحدى المناسبات شوهد ما يزيد على 1,000 طائر منها في بحيرة دومة الجندل.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجّل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: دومة الجندل

**خرشنة سبلاء***Chlidonias hybrida*

Whiskered Tern

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

23 - 29 سم / 60 - 101 غم (الأنثى أصغر بكثير من الذكر)

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب وشمال أفريقيا وشرق الصين وأستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب أوروبا وصولاً إلى الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 8,000 كم جنوباً في أفريقيا وجنوب آسيا حتى أستراليا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محلي، زائر صيفي غير منتظم، مهاجر متكاثراً محتمل. تُصنّف هذه الخرشنة الرشيقة بأنها طائر مهاجر عابر غير شائع (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر) وتعدادات صغيرة (أكثر عدداً في فصل الخريف)، وهي خرشنة المستنقعات الوحيدة التي تتسنى رؤيتها في الشتاء (سبتمبر - أبريل)، بينما يظل بعضها في المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، وأحياناً تكون بريش التكاثر، ما يشير إلى احتمالية تكاثرها بالمملكة. **الموئل:** المياه العذبة والأراضي الرطبة المائلة للملوحة ذات الغطاء النباتي البازر، أو مداخل المحميات الساحلية. كما يوجد هذا الطائر أيضاً، في الأراضي الجافة وبين المحاصيل النامية في بعض الأحيان. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يشكل أساس الحشرات البرية والمائية، بما في ذلك خنافس الماء واليعاسيب والجناب والنمل الطائر، إضافة إلى الأسماك الصغيرة والبرمائيات والضفادع الصغيرة، وهو يفضل الطيران المنخفض، حيث يطير غالباً على ارتفاعات تراوح بين متر واحد إلى مترين فقط فوق سطح الماء، كما يمكنه التوقف، أو الاستدارة فجأة للغطس في الماء والتقاط المواد من السطح، أو الغطس السريع الضحل، أو التقاط الفرائس بعناية من الغطاء النباتي. وأحياناً ما يتتبع مجزئات القش ويلتقط الحشرات المضطربة. علماً أن أفرادها تفضل الجثوم فوق الأعمدة المائية البارزة، أو المواد الطافية خلال فترة الراحة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أزواج، ولكن أحياناً يتم تسجيل مجموعات صغيرة في الأراضي الرطبة الواسعة، فعلى سبيل المثال، شوهد نحو 50 طائراً في بحيرة ملاكي، يرتبط هذا الطائر بحرية بغيره من طيور الخرشنة والطيور المائية. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **بأج الجناح:** 64 - 70 سم.

الذكر في هذا النوع من الطيور يكون أثقل مع منقار أكبر بكثير، ويتغذى عبر الغطس السريع في الماء، بينما تفضل الأنثى، الأخف وزناً والأصغر منقاراً، التقاط الفرائس من السطح.

الذكور في هذا النوع من الطيور يكون أثقل مع منقار أكبر بكثير، ويتغذى عبر الغطس السريع في الماء، بينما تفضل الأنثى، الأخف وزناً والأصغر منقاراً، التقاط الفرائس من السطح.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجّل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

خرشنة شائعة*Sterna hirundo*

Common Tern

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

مستقر

32 - 39 سم / 97 - 146 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق دوائر العرض الوسطى عبر نصف الكرة الشمالي، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 10,000 كم جنوباً حول سواحل أميركا الجنوبية وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وأستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محدود. يُصنّف طائر الخرشنة الكلاسيكي هذا في المملكة بأنه مهاجر عابر شائع (مايو - يونيو، أغسطس - نوفمبر)، رغم أنه أقل شيوعاً في فصل الخريف،

وزائر شتوي محلي على طول ساحل البحر الأحمر جنوب ينبع، فيما يقضي فصل الصيف في تبوك. **الموئل:** الخزانات والسدود، والأراضي الرطبة التي تضم مساحات مائية مفتوحة، سواءً توافرت فيها النباتات المائية، أم لا. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل رئيس على الأسماك الصغيرة (أقل من 15 سم)، ووفقاً لتوافر الفرائس محلياً والحشرات، وهو يصطاد معظم الأسماك بالغطس الاندفاعي السريع، أو عن طريق الغوص عبر السطح، بينما يصطاد

تأكل طيور خرشنة شائعة بقدر ما تستطيع خلال فصل الشتاء، وذلك لأن الطائر الذي يكتسب وزناً أكبر يصل إلى أراضي تكاثره أبكر، وتكون فرصه في التكاثر أكبر، ويعيش فترة أطول.

كثيفة فوق المحيط، غير أن السجلات في المملكة تفيد عدم تجاوز مجموعاته لأكثر مما يراوح بين طائر واحد إلى 3 طيور بمواقع داخلية في طريقها عبر المملكة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** قد تفضل الطيور الصغيرة البقاء في مناطق تَشْتِيَتها طوال أشهر صيفها الأولى قبل أن تعود إلى أراضي تكاثرها بعمر العامين. **باع الجناح:** 72 - 83 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

**خرشنة سوداء***Chlidonias niger*

Black Tern

غير مهدد

يتناقص

-

-

23 - 28 سم / 60 - 74 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا وصولاً إلى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء بشكل رئيس على طول الساحل في أميركا الوسطى وغرب أفريقيا وواادي النيل. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر. على الرغم من الموقع الجغرافي للمملكة الذي يوجد في منتصف المسافة بين نطاق التكاثر الشرقي لهذا الطائر ومناطق تَشْتِيَتِهِ الأفريقية، إلا أن عبوره المملكة يكون أقل بكثير مما هو متوقع

أحياناً، مع اقتصر مشاهداته المحدودة على الطيور الفردية، ربما يشير ذلك إلى أن هذا النوع يتخذ طريقاً غير مباشر حول المملكة، أو أنه يعبر أراضيها من دون توقف. وقد سبق تسجيل إقامة بعض أفرادها في المملكة لأسابيع عدة. **الموئل:** السواحل والبحيرات القريبة منها. ويمكن أن يوجد أيضاً، من حين لآخر، في أي منطقة رطبة، أو منطقة مستنقعات تحوي نباتات بارزة أو طافية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات المائية (خاصة الخنافس)، والضفادع ويرقاتها والأسماك الصغيرة وبعض الرخويات. وعادةً ما يتغذى هذا الطائر الأنيق والصغير المتميز بنمط طيرانه غير المنتظم عن طريق المطاردة الجوية المصحوبة بالكثير من التحويم والانقضاض

لالتقاط الفرائس من السطح، أو من الغطاء النباتي، ونادراً ما يغطس. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** نادر الوجود في المملكة، وعادةً ما يتم الإبلاغ عنه منفرداً، أو بأعداد صغيرة، وتفيد المشاهدات بأنه يشكّل أسراباً فوق أسراب الأسماك المفترسة، ويتغذى على أسماك الدولفين والتونة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باع الجناح:** 57 - 65 سم.

يمكن لطيور خرشنة سوداء البديعة أن تهاجر بسرعة تزيد على 1,000 كم يومياً ولمدة 6 أيام من دون انقطاع. وتستطيع أيضاً، عبور شبه الجزيرة العربية في رحلة واحدة مدتها 24 ساعة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: ينبع



خرشنة عرفاء صغيرة*Thalasseus bengalensis*

Lesser Crested Tern

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

35 - 43 سم / 185 - 242 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ يتكاثر في الساحل الشمالي لأفريقيا وحول شبه الجزيرة العربية باتجاه الجنوب الشرقي وصولاً إلى أستراليا، بينما يقضي فصل الشتاء حول المستعمرات ويصل إلى 4,000 كم قبالة الساحل الشمالي لأفريقيا وفي جميع أنحاء المحيط الهندي حتى بحر كورال. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شائع، زائر دائم غير منتظم. يُصنف هذا الطائر في المملكة بكونه مهاجراً متكاثراً (أبريل - أكتوبر)، مشكلاً مستعمرات كثيفة على جزر الخليج العربي والبحر الأحمر جنوب جدة، في حين توجد تعدادات قليلة منه في أشهر السنة كلها. **الموئل:** يتكاثر على الجزر الرملية المنخفضة، ويرعى في أمواج الشاطئ وقبالة الساحل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**

بشكل أساس الأسماك والقشريات التي يلتقطها بعد أن يجوب صفحة الماء ذهاباً وإياباً، أو يحوم ثم يفوص اندفاعياً، أو يغمر نفسه تحت الماء (غالباً)، أو عن طريق الغمس من السطح. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي للغاية، فهو يهاجر ويجثم في أسراب تضم أكثر من 1,000 طائر في بعض الأحيان، وغالباً ما يختلط بأنواع طيور خرشنة أخرى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش في مستعمرات كثيفة تضم عادة

لحماية عشه من حرارة الصيف القاتلة، يعتمد الطائر البالغ إلى تغيير موضعه باستمرار طوال اليوم، حيث يرفع دائماً بظله البارد بيوضه وفراخه.

بضع مئات من الأزواج (8 - 13 عشاً في المتر المربع الواحد)، ويمكن أن توجد مستعمرات مستقلة في جزيرة واحدة، فعلى سبيل المثال، تم تسجيل 13,700 زوج في 23 مستعمرة في جزيرة كران (الخليج العربي)، أكبرها تضم ما يزيد على 5000 زوج. علماً أن البيض يوضع بصورة مترامنة داخل المستعمرة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة غير مبطنه فوق الأرض، على بُعد 50 - 200 م من البحر، إلى جوار مستعمرة لطيور خرشنة عرفاء كبيرة. **البيض المحضون:** بيضة واحدة، **الحضانة:** 22 - 25 يوماً. **الفراخ:** تهجر الصغار العش بعد يومين إلى 4 أيام من الفقس مكونة رياضاً كبيرة، ثم تطير عندما تبلغ 32 - 35 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة، **باع الجناح:** 88 - 105 سم.



مهاجر متكاثر، زائر دائم

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 41,000

منطقة النشاط: كورنيليس الخبر

**خرشنة بيضاء الخد**

خرشنة غشواء

Sterna repressa

White-cheeked Tern

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

32 - 35 سم / 113 - 142 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من الساحل الشمالي الشرقي لأفريقيا (الصومال إلى كينيا) والبحر الأحمر والخليج العربي وسلطنة عُمان وصولاً إلى غرب الهند، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم في الساحل الشمالي الشرقي لأفريقيا وبحر العرب وسلطنة عُمان حتى جنوب غرب الهند. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شائع، زائر شتوي نادر. يصل هذا الطائر البديع بوصفه مهاجراً متكاثراً (مارس - أكتوبر) إلى الجزر المنتشرة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وبعض تعداداته توجد خلال أشهر السنة كافة. **الموئل:** يتكاثر على رمال الجزر الناعمة بشكل أساس، أو على الحصباء، أو الرمال المضغوطة، وفي أحيان أقل على الأراضي الصخرية الصلبة. ويرعى في البحر في حدود تراوح بين

كيلومتر واحد إلى اثنين من الشاطئ. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الأسماك الصغيرة (نحو 5 سم)، واللافقاريات التي يلتقطها من السطح عن طريق الغمس التلامسي، أو الغطس الاندفاعي. وغالباً ما يتغذى خلف قوارب الصيد وفوق الأسماك المفترسة والدلافين. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، حيث تضم الأسراب الكبيرة المهاجرة، أو الجاثمة ما يزيد على 10,000 طائر أحياناً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش في مستعمرات تضم عادة 10 - 200 زوج (غالباً ما تكون مختلطة بأنواع أخرى من طيور الخرشنة) مع أعشاش متقاربة (6 لكل متر مربع واحد)، أو متباعدة (عش واحد لكل 40 متراً مربعاً). **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة فوق أرض مكشوفة، إما مبطنه بالحجارة الصغيرة، أو الأصداف، أو المرجان، أو العصي، أو الأعشاب، أو الطحالب البحرية، أو غير مبطنه. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 21 - 24 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش، وتعيش بعد فترة قصيرة من الفقس، بينما تطير بعد 25 - 30 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة، **باع الجناح:** 73 - 83 سم.

يُعشش هذا الطائر فوق الأرض الساخنة مباشرة في الصيف، لذلك تعتمد الطيور المعششة إلى غمر أجسامها في مياه البحر، ثم تعود إلى العش بربيش بطنها مبللاً، ما يسهم في تبريد البيض بمقدار 4 درجات مئوية.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 29,000

منطقة النشاط: رأس أبو علي



خرشنة عرفاء كبيرة*Thalasseus bergii*

Greater Crested Tern

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

الحجم والوزن: 43 - 53 سم / 320 - 400 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ يوجد على طول سواحل جنوب وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وأستراليا، وفي جميع أنحاء غرب المحيط الهادئ. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع، زائر دائم غير منتظم. توجد طيور خرشنة عرفاء كبيرة حول سواحل المملكة كافة. وتوجد بشكل أساس في فصل الصيف، مع وجود تعدادات قليلة منها في جميع الأشهر. وهذا الطائر يتكاثر في المستعمرات الكثيفة في الجزر الواقعة في شمال الخليج العربي (حرقوص، وكران، وكربن، وجنا، وجريد) والبحر الأحمر (معظمها بالقرب من القنفذة). وقد يتشتت حتى سواحل أفريقيا الجنوبية والشرقية بعد التكاثر. **الموئل:** يتكاثر في الجزر الرملية المنخفضة التي غالباً ما تكون صغيرة وبعيدة عن البر الرئيس ويرعى أيضاً، في البحر. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يشكل أساس الأسماك (حتى 15 سم)، وكذلك الحبار والقشريات، وبعض الحشرات التي يلتقطها من الماء عن طريق الغطس الاندفاعي من ارتفاع يصل إلى 5 أمتار تقريباً، أو عبر الغمس التلامسي. **النشاط:** نهارى، وليلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** يريعى عادةً في مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية

تشكل هذه الخرشنة

مستعمرات تعشيش كثيفة

فوق الجزر في الخليج العربي


والبحر الأحمر، وتضم بعض

مستعمراتها أكثر من 1,000

زوج موزعة على ثمانية

أعشاش لكل متر مربع واحد.

الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات كثيفة (7 - 8 أعشاش في متر مربع واحد) تضم بضعة أزواج، ويصل عددها إلى أكثر من 1,000 زوج، وتكون متاخمة أحياناً لمستعمرات خرشنة عرفاء صغيرة، أو غيرها من طيور الخرشنة، علماً أن البيض يوضع بصورة متزامنة داخل المستعمرة. كما تنتقل المستعمرات بين الجزر من سنة إلى أخرى. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة فوق سطح الأرض وتكون عادةً غير مبطنة. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 25 - 30 يوماً. **الفراخ:** تهجر الصغار العش بعد يومين من الفقس مكونة رياضاً. ثم تطير بعد أن تبلغ 38 - 40 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 100 - 130 سم.



مهاجر متكاثر، زائر دائم

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,500

منطقة النشاط: كورنيش الخبر

**خرشنة ساندويتشية***Thalasseus sandvicensis*

Sandwich Tern

غير مهدد

مستقر

-

-

الحجم والوزن: 34 - 46 سم / 130 - 285 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر على طول الساحل الشرقي للاميركيتين، ومن غرب أوروبا حتى بحر قزوين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 9,000 كم جنوباً حول سواحل أميركا الوسطى والجنوبية، وغرب وجنوب أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر محدود، زائر شتوي محدود. يوجد في المملكة على طول ساحل الخليج العربي خلال موسم الهجرة (مارس - أبريل، أكتوبر - نوفمبر) وفي فصل الشتاء، لكن يندر وجوده في البحر الأحمر. سبق له التكاثر في جزيرة صغيرة بمنطقة الخليج العربي قبالة رأس تناقيب عام 1991. وربما يكون تكاثره مشهوداً بتواتر أكبر في الجزر النائية الأخرى. **الموئل:** يفضل المناطق والجزر الساحلية. كما سجل تعشيشه في جزيرة صغيرة كانت مغطاة جزئياً بشجيرات محلية ومحاطة بمنطقة رملية مفتوحة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يشكل أساس الأسماك الصغيرة (عادة 3 - 15 سم) التي يلتقطها عبر الغطس من ارتفاع يصل إلى 10 م فوق سطح الماء، وعلى بُعد 50 كم من منطقة تكاثره. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يريعى بمفرده، رغم أن أسرابه المهاجرة يمكن أن تضم مئات الطيور. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات تضم حتى 10 أعشاش. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حفر العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حفرة ضحلة فوق سطح الأرض، تكون مبطنة عادةً، أو فوق كئيب رملي، أو ضفة رملية أو حصباوية. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 25 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ العش بعد أيام قليلة من الفقس مكونة رياضاً تستمر 15 يوماً، ثم تطير بعد مرور 28 - 32 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 86 - 105 سم.

ورد أول وصف لطائر خرشنة

ساندويتشية في مدينة

ساندويتش الإنجليزية، ومن

هنا جاء اسمه، وهو طائر

ساحلي يتغذى تقريباً على

الأسماك الصغيرة.

يمكن أن تضم مئات الطيور.

أزواج متكاثرة أحادية الزواج

تعشش في مستعمرات تضم حتى

10 أعشاش. يتشارك الزوجان


مسؤوليات حفر العش وحضن البيض ورعاية

الفراخ. حفرة ضحلة فوق سطح الأرض،

تكون مبطنة عادةً، أو فوق كئيب رملي، أو

ضفة رملية أو حصباوية. بيضة واحدة إلى اثنتين.

تهجر الفراخ العش بعد أيام قليلة من الفقس مكونة رياضاً تستمر 15 يوماً، ثم تطير بعد مرور 28 - 32 يوماً.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10

منطقة النشاط: رأس أبو علي



كركر قشري منقار*Stercorarius pomarinus*

Pomarine Jaeger

غير مهدد

مستقر

الحجم والوزن: 48 - 51 سم / 550 - 850 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر فوق الدائرة القطبية الشمالية في شمال أوراسيا وأميركا الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 - 12,000 كم جنوباً في معظم مناطق البحار الاستوائية والمعتدلة حول العالم. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، زائر شتوي نادر. يُصنّف هذا المهاجر طويل المدى في المملكة بأنه زائر شتوي نادر للخليج العربي والبحر الأحمر. وقد يسافر داخل البلاد أثناء الهجرة أحياناً. **الموئل:** بحري وساحلي.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يفضل الأسماك والجيلف واللافقاريات البحرية، ويستطيع الغوص للحصول على الغذاء. كما يتتبع العبارات بحثاً عن نفايات المواد الغذائية والأسماك المذعورة، أو المصابة بواسطة الدواسر. وفي بعض الأحيان يفترس الطيور الصغيرة (بما في ذلك طيور فلرب)، ويقتلها بإغراقها في البحر. وعند وفرة الصيد، يُظهر سرعة كبيرة وخفة في الحركة، مع تنفيذ بعض الانعطافات الحادة والغوص المفاجئ. وشأنه شأن طائر الكركر القطبي الشمالي، غالباً ما يوجد حيث التجمعات الكبيرة من طيور النورس والخرشنة، ليسرق طعامها عبر مضايقتها بصورة شديدة أثناء الطيران، ولكن على النقيض من الكركر القطبي الشمالي، فإن هذا النوع لا يعتمد فقط على سرقة طعامه من الطيور الأخرى. **النشاط:** نهارى.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** عبارة جزيرة فَرَسَان

يتكاثر هذا الطائر البحري فوق

الدائرة القطبية الشمالية

ويتغذى على القوارض، وذلك

قبل أن يهاجر لقضاء فصل

الشتاء في الصيد بمناطق

المحيطات الاستوائية حول

العالم، بما في ذلك قبالة

سواحل المملكة.

فإن هذا النوع لا يعتمد فقط على سرقة طعامه من الطيور الأخرى. **النشاط:** نهارى. حيث التجمعات الكبيرة من طيور النورس والخرشنة، ليسرق طعامها عبر مضايقتها بصورة شديدة أثناء الطيران، ولكن على النقيض من الكركر القطبي الشمالي، فإن هذا النوع لا يعتمد فقط على سرقة طعامه من الطيور الأخرى. **النشاط:** نهارى.

السلوك الاجتماعي: عادةً يربى بمفرده. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

ملاحظة: يتميز هذا الطائر بلونين مختلفين؛ اللون الفاتح الشائع والداكن النادر الذي يؤلف نحو 20% من تعداده. وقد يكون لدى أفراد ريش ذيل مركزي، يمتد حتى 11 سم وراء بقية الذيل، رغم طرحه إياه في نهاية الصيف لأنه يقلل من كفاءة الطيران.

ملاحظة: الاسم jaeger أخذ عن الألمانية ويعني الصيد. **باع الجناح:** 125 - 138 سم.

كركر قطبي شمالي*Stercorarius parasiticus*

Arctic Jaeger

غير مهدد

مستقر

الحجم والوزن: 41 - 46 سم / 330 - 610 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في السهول الساحلية الجرداء حول المحيط المتجمد الشمالي، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 8,000 - 12,000 كم جنوباً في المناطق البحرية المعتدلة المجاورة للقطب الجنوبي قبالة أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وجنوب أستراليا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، زائر شتوي نادر. يُصنّف هذا الطائر البحري الاستثنائي في المملكة، بأنه مهاجر عابر بحري محدود وزائر شتوي نادر لمنطقة الخليج العربي، وكذلك لمنطقة البحر الأحمر - مع اقتصر مشاهداته على خليج العقبة وجزان - بصفة أقل شيوفاً. **الموئل:** بحري وساحلي. يربى في البحر، وأحياناً يلجأ إلى الشواطئ عندما يسوء الطقس. وفي بعض الأحيان يجثم فوق العوامات والمراسي والحمام، وغير ذلك من الهياكل البحرية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل أساس الأسماك التي يلتقطها عن طريق مطاردة طيور الخرشنة والنورس مجبراً إياها على قلس (تقيؤ) آخر وجبة تناولتها، ثم ينقض لالتقاطها في الهواء، قبل أن تضرب الماء. إنه طائر رشيق للغاية وسريع الطيران، ويتميز بتسارع كبير مما يعطيه مظهراً يشبه الكواسر، وهو يفضل الجثوم، على صفحة الماء منتظراً أي فريسة محتملة. ويصطاد بنشاط عن طريق التقاط الأسماك مباشرة من البحر. **النشاط:** نهارى.

لا يصطاد هذا الطائر

البحري الجميل فرائسه،

وإنما يطارد طيور النورس

والخرشنة الصغيرة مجبراً

إياها على قلس (تقيؤ) آخر

وجبة تناولتها، ثم يلتقطها

ويأكلها في الهواء.

السلوك الاجتماعي: عادةً يصطاد منفرداً، أو أحياناً في أزواج. غالباً ما يوجد حيث التجمعات الكبيرة من طيور النورس والخرشنة على الساحل وفي البحر، متربحاً وصول الطيور التي تتغذى جيداً على ما يبدو. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

ملاحظة: يتميز هذا الطائر المذهل بلونين مختلفين؛ البني الغامق والباهت المتغير. **باع الجناح:** 110 - 125 سم.




مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** الخليج العربي

بومة صغيرة	الاسم العربي:
صدي	الاسم العربي الآخر:
<i>Athene noctua</i>	الاسم العلمي:
Little Owl	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (يتناقص احتمالاً)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
21 - 23 سم / 162 - 206 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ومن أوروبا حتى الصين. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. تنتشر هذه البومة الصغيرة المستأنسة على نطاق واسع بوصفها من الطيور المقيمة في المملكة. **الموئل:** في كثير من الأحيان المحميات والصحارى بالقرب من المنحدرات المنخفضة، وتوجد أيضاً، في المناطق المزروعة بالأشجار، أو أكوام الصخور، أو المباني المهجورة، أو الآلات المهجورة التي تستخدمها للجنوم والتعشيش. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات (بما في ذلك الخنافس والصراصير وديدان الأرض) والفقاريات الصغيرة، منها الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات التي يلتقطها عن طريق الانقضاض عليها من أي عمود، أو مجثم، من هذا القبيل. ويستطيع هذا الطائر أيضاً، أن يصطاد عن طريق التحويم، أو المطاردة على الأرض، علماً أنه يقبض على فرائسه الكبيرة مستخدماً قدميه، فيما يستخدم منقاره



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 3,000
منطقة النشاط: محمية طويق



يمكن سماع صوت طائر البومة الصغيرة من مسافة 4,4 كم، وعلى الرغم من نداءه البسيط، إلا أن كل طائر يمكنه التمييز بين صوت الطائر الجار وصوت الطائر الغريب.

المملكة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً ووراثياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضن البيض ورعاية الفراخ، بينما يتولى الذكر مسؤولية جلب الطعام. ويتشارك الزوجان رعاية الفراخ بمجرد بلوغها عمر الأسبوعين. **العش:** تجويف غير مبطن، وعادةً ما يكون وسط بقايا فرائس ونشارة خشب في شق صخري، أو كومة من الركام، أو ثقب شجري، أو مبنى، أو صندوق تعشيش، أو أحياناً في جحر حيوان ما، وغالباً ما يعيد استخدام المواقع نفسها في كل عام. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 28 - 33 يوماً. **مدة التعشيش:** 30 - 35 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 54 - 58 سم.


بومة بيضاء	الاسم العربي:
هامة	الاسم العربي الآخر:
<i>Tyto alba</i>	الاسم العلمي:
Common Barn-owl	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
29 - 44 سم / 187 - 455 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ واسع الانتشار في الأمريكيتين وأفريقيا وأوروبا والهند وجنوب شرق آسيا وأستراليا. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. ينتشر هذا الطائر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة. **الموئل:** القرى القريبة من المحاصيل ومكب النفايات، بما في ذلك المدن الكبيرة التي تشتمل على مناطق الصيد المناسبة، ويوجد أيضاً، في المناطق الصحراوية المعزولة بعيداً عن المناطق الحضرية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل أساس الثدييات الصغيرة، بما فيها الزبابة (حيوان يشبه الفأر) والقوارض، إلى جانب الطيور الصغيرة، مثل بلبل أبيض الأذن وماينا شائعة وعصفور دوري وحمام جبلي، فضلاً عن عديد من الطيور الأخرى التي تجثم بشكل جماعي. ويصطاد هذا الطائر فوق سطح الأرض، ويفتش عبر الطيران الصامت ويستمتع إلى أدق تحركات الفريسة، قبل أن ينقض على ضحيته بمخالبه الحادة، وغالباً في ظلام الليل الدامس. وقد تم تسجيل اصطياده للجراد في الحجاز أثناء اجتياحه، مستخدماً أقدامه بعد مطاردها على الأرض. **النشاط:** ليلي. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية

الزواج اجتماعياً ووراثياً، وأحياناً تتزاوج الأنثى مع ذكور أخرى (تعدد أزواج)، أو تتشارك اثنتان من الإناث عشاً مع ذكر واحد (تعدد زوجات). **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضن البيض، بينما يتولى الذكر جلب الطعام. ويرعى الزوجان الفراخ. **العش:** حافة مكشوفة فوق شق في مبنى ما (خاصة المباني المهجورة، أو الأطلال)، أو بئر، أو كهف، أو تجويف شجرة، أو داخل أحد أعشاش طيور مطرفي الرأس

المهجورة، حيث نشارة الخشب والفرائس تتراكم بشكل متزايد. **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض (ربما حتى 14 في حال توافر الطعام). **الحضانة:** 29 - 34 يوماً. **مدة التعشيش:** 50 - 70 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة، أو مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 500
منطقة النشاط: الزلفي

بومة الأشجار الأوروبية


ثبج أوراسي
Otus scops
Eurasian Scops-owl
غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
مستقر
16 - 20 سم / 60 - 135 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أفريقيا وغرب أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر، يوجد هذا الطائر المتخفي الرائع بوصفه مهاجراً عابراً (فبراير - أبريل، سبتمبر) في المقام الأول، مع مشاهدات شتوية فوق مرتفعات تامة جنوب ينبع. **الموئل:** أثناء موسم الهجرة، يمكن أن يظهر على أي شجيرة مناسبة للجنوم، أما في الشتاء، فيوجد في غابات الطلح والأدغال الحرجية، ربما بالقرب من المياه. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل أساس اللافقاريات، خاصة الحشرات كالجراد والخنافس والعث. إضافة إلى العناكب، وأي حيوانات أخرى يمكنه التقاطها بمخالبه، بما في ذلك الفقاريات الصغيرة، مثل القوارض والطيور الصغيرة والسحالي والبرمائيات. ويمكنه تأمين فرائسه الأرضية بقدميه بعد الاندفاع نحوها من مجثمه، أو بعد مطاردتها فوق سطح الأرض. ويعتمد أحياناً إلى التقاط الحشرات في الجو أثناء طيرانه. **النشاط:** ليلي، **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يصعب جداً تحديد مكان طائر بومة الأشجار الأوروبية في ساعات النهار أثناء جلوسه صامتاً بلا حراك، فحكماً قبضته على جذع شجرة ما، وفَعُولاً على تمويهه المذهل لحماية نفسه، الأمر الذي يترتب عليه ندرة سجلات مشاهداته تقريباً في المملكة، غير أنه يمكن سماع الذكور والإناث أحياناً، أثناء إصدار نداءات التكاثر في ليالي الربيع، لا سيما عند اكتمال القمر. ويوجد طائران منه فرعياً على الأقل في المملكة، أحدهما (*O. s. turanicus*) الشاحب جداً، وبالتالي قد يتم الخلط بينه وبين بومة الأشجار المخططة (ثبج فاتح). **باغ الجناح:** 53 - 64 سم.

التمويه الرائع لطائر بومة الأشجار الأوروبية يجعله غير مرئي تقريباً بالنهار، حيث يجلس من دون حراك في جوف أي شجرة ميتة.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الظهران

**بومة الأشجار العربية**

ثبج عربي
Otus pamela
Arabian Scops-owl
غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
18 سم / 62 - 71 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد فقط في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان واليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يوجد هذا المفترس الليلي الرائع بشكل رئيس في المرتفعات الجنوبية الغربية جنوب الباحة. **الموئل:** يفضل الغابات المفتوحة والمنحدرات الحرجية الجافة القريبة من مصادر المياه العذبة. كما يوجد أيضاً، في غابات التين المورقة على ارتفاع 1,600 م في سفوح التلال الغربية، وغابات العرعر في جبل السودة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف. ولكن قد يتكون غذاؤه من مجموعة كبيرة من اللافقاريات (بما في ذلك الخنافس والجنادب والصراصير والعقارب والعناكب والعث وديدان الأرض). إضافة إلى الفقاريات الصغيرة العرضية (لا سيما الزواحف الصغيرة والثدييات وربما الطيور). ويتوقف ذلك على وفرتها محلياً، وفقاً لما تم تسجيله في بومة الأشجار الأفريقية. وتصطاد هذه الطيور عن طريق الانقضاض على الفريسة من مجثم ما، أو عن طريق البحث بنشاط عن الفريسة على الأرض. **النشاط:** ليلي. **السلوك الاجتماعي:** يوجد هذا الطائر عادةً منفرداً، رغم تسجيل ما يصل إلى 5 طيور تطلق نداءاتها في الموقع نفسه. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: غير معروف (تشكل الأنواع المتشابهة أزواجاً متكاثرة مناطقية أحادية الزواج عادةً). **الأدوار الأبوية:** غير معروفة. **العش:** غير معروف (الأنواع المماثلة تستخدم تجويف شجرة غير مبطن). **البيض المحضون:** غير معروف. **الحضانة:** غير معروفة (20 - 24 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (25 - 28 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** غير معروفة. **ملاحظة:** هذا الطائر كان يُعد سابقاً نوعاً فرعياً من بومة الأشجار الأفريقية (*O. senegalensis*). علماً أنه طائر صاخب في الليل أثناء التكاثر. وغالباً ما يكون طائر اليوم الأوسع انتشاراً في المنطقة أينما حل.


مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 14,000
منطقة النشاط: تنومة



الاسم العربي:	بومة صمعاء
الاسم العلمي:	<i>Asio flammeus</i>
الاسم الشائع:	Short-eared Owl
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	37 - 38 سم / الذكر 200 - 450 غم؛ الأنثى 280-500 غم (أثقل وزناً بنسبة 20%)




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية وبريطانيا وأوكرانيا. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جميع أنحاء ألاسكا وكندا وشمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 6,000 كم جنوباً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وشمال أفريقيا وجنوب أوراسيا. **حالته بالمملكة: زائر شتوي نادر.** يُعدُّ هذا الصياد الليلي المتميز زائراً شتوياً نادراً في النصف الشمالي من المملكة. وقد تعبر بعض طيوره التي تتكاثر في شمال آسيا المملكة في طريقها نحو شرق أفريقيا. **الموئل:** الأراضي المفتوحة، مثل الصحاري الشمالية ذات الأشجار الخفيفة، والنباتات المنخفضة بالقرب من السواحل المهجورة، والأراضي الرطبة ذات الغطاء النباتي القصير واسعة الانتشار والأراضي الزراعية المروية، خاصة حقول الحبوب المحروثة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يشكل أساس الثدييات، مثل الجرابيع والجرذان والفئران والأرانب البرية، وبعض الطيور الصغيرة، ويصطاد عبر الطيران المنخفض فوق سطح الأرض، وأحياناً يستخدم التحويم. كما يقوم بتغيير اتجاهه فجأة للانقضاض على فريسته. ويستخدم حاستي البصر والسمع مجتمعتين للكشف عن أي مكان. وفي أوروبا، ينجح في واحدة من كل خمس محاولات صيد. وما إن يقبض على أي حيوان ثديي، فإنه يأكله كاملاً، أو يفصل رأسه



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الدبديبة



يستطيع هذا الطائر الرائع اصطياد الثدييات الصغيرة في الليل والنهار، وينجح في واحدة من كل خمس محاولات صيد تقريباً. ويرتفع هذا الرقم في الليالي القمرية.

وينزع أحشائه أولاً، أما الطيور الصغيرة، فيزيل أجنحتها، ثم يتلغ بقية الطائر كاملاً. **النشاط:** نهارى، وشفقي، وليلي. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، رغم إمكانية العثور أحياناً على عدد قليل منه في المنطقة نفسها. فقد شوهد 6 طيور منه معاً في بحيرة الاصفر في فبراير عام 2018، و8 في الوريعة بالقرب من الدبديبة في فبراير عام 1987. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يجثم هذا البوم في الغطاء النباتي المنتشر في الصحاري، وفي حال مشاهدته فوق الأرض، تكون عيونه الصفراء الثاقبة لافتة للفتة للغاية، كما يتميز بطول جناحيه بشكل ملحوظ وقدرته على الطيران بخفة ورشاقة الذي عادةً ما يكون بطيئاً. وفي بعض الأحيان يُطلق نداءً أشبه بالنباح، لا سيما في فصل الشتاء.


الاسم العربي:	بومة الأشجار المخططة
الاسم العربي الآخر:	ثبج فاتح
الاسم العلمي:	<i>Otus brucei</i>
الاسم الشائع:	Pallid Scops-owl
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	21 سم / 100 - 110 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وإيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في سوريا والعراق وصولاً إلى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 2,500 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في باكستان والهند، وبوتيرة أقل في شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شديد الندرة، زائر شتوي نادر.** تُسجل مشاهدات هذا الطائر المفترس الليلي في فصل الشتاء بانتظام في ينبع، وربما يفضل البقاء في المملكة بعد انقضاء فصل الشتاء على نطاق أوسع مما هو مُسجّل. كما يُحتمل أن يكون هناك تعداد متكاثر صغير منه في جنوب غرب المملكة، حيث تم سماع نداءات له. **الموئل:** غير معروف جيداً، ومن المحتمل أنه يتكاثر في المناطق ذات الأشجار الناضجة، بما في ذلك أشجار الطلح المتناثرة في السهول الحصوية وغابات الغاف وحدائق الضواحي والمناطق الزراعية والوديان جيدة الزراعة (وفقاً لما هو مُسجل في الإمارات وشمال سلطنة عُمان). وهو يفضل الجُثوم في الأشجار والنباتات المتسلقة المتشابكة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، مثل الخنافس والعث والجراد والعناكب والثدييات الصغيرة (خاصة القوارض والخفافيش) والطيور الصغيرة والسحالي، وحسبما هو متوافر محلياً.

قد يتكاثر هذا الطائر الغامض بأعداد صغيرة في غرب المملكة.

أما التقنية التي يتبعها في الصيد، فتتمثل في الانقضاض من مجثمه على الفريسة فوق فرع أدنى، أو على الأرض من تحته، أو عن طريق التقاط الفريسة جواً أثناء الطيران ولكن بوتيرة أقل. **النشاط:** ليلي، وشفقي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، أو متعددة الزواج أحياناً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضن البيض والفراخ، ويتشارك الأبوان في رعاية الصغار، فيما يتولى الذكر الدفاع عن منطقة السيادة بنداياته. **العش:** تجويف غير مبطن، عادةً في حفرة شجرة (أو في شق في مبنى، أو بئر، أو جرف، أو بوتيرة أقل ضفة ترابية). **البيض المحضون:** 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 26 - 28 يوماً. **مدة التعشيش:** 28 - 30 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 54 - 64 سم.




مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10
منطقة النشاط: ينبع



بوم فرعوني	الاسم العربي:
بوهة صحراوية	الاسم العربي الآخر:
<i>Bubo ascalaphus</i>	الاسم العلمي:
Pharaoh Eagle-owl	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
46 - 50 سم / الذكر 1,900 غم؛ الأنثى 2,300 غم (أثقل وزناً بنسبة 20%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال غرب أفريقيا، وبشكل غير منتظم شرقاً عبر شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى جنوب غرب إيران. **حاليته بالمملكة:** **مقيم متكاثر غير شائع.** ينتشر هذا الطائر المهيب في جميع أنحاء المملكة. في الواقع، قد يكون هناك زوج على كل صخرة معزولة من صخور الجرانيت في المناطق الوسطى. **الموئل:** يوجد عادةً على ارتفاعات دون 1,000 م في المناطق القاحلة الصخرية ذات الحواف الصخرية شديدة الانحدار، أو النتوءات الجرانيتية، أو التلال الصغيرة المعزولة المحاطة بالسهول. كما يوجد في المناطق الرملية المفتوحة ذات الأشجار الخفيضة بالمنطقة الشرقية وصدراء النفود الكبير. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يفضل الثدييات الصغيرة، لا سيما الجرابيع والقوارض والطيور الصغيرة والزواحف واللافقاريات، وهو طائر انتهازي، إذ يصطاد أيضاً الثعالب والأرانب البرية والخفافيش والعقارب. ويصطاد من مجثمه عبر الانقضاض على الفريسة من فوقها مباشرة. ومثل طيور اليوم الأخرى، يقلس (يتقياً) بقايا عظام وشعر غير مهضوم. تم جمع وتحليل بقايا عظم في الظهران واتضح أنها تحتوي على 173 قطعة عظم على الأقل من فرائس فقارية متعددة. **النشاط:** ليلي وشفقي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً ووراثياً مع روابط زوجية تدوم مدى الحياة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 2,200
منطقة النشاط: الهفوف

الأدوار الأبوية: تتولى الأنثى حضن البيض وإطعام الفراخ بطعام يجلبه الذكر. **العش:** حفرة غير مبطنّة في تجويف، أو حافة مجوفة على منحدر منخفض، أو منحدر صخري، أو على حافة مكشوفة، أو في كثير من الأحيان على ركام السفوح. وقد يعيش أيضاً في المنطقة الشرقية في حفرة شجرة ما، أو تجويف بين جذور الأشجار، أو تحت شجيرة أحياناً. وعادةً ما يصبح التجويف مملوفاً ببقايا الفرائس والعظم. **البيض المحضون:** 3 بيوض (على نحو استثنائي). وقد سُجلت رعاية زوج واحد لستة أعشاش في محمية محازة الصيد عام 2013). **الحضانة:** 32 - 36 يوماً. **مدة التعشيش:** 34 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

يصطاد هذا الطائر المفترس الليلي المذهل، والأثقل بثلاثة أضعاف من أي طائر بومة آخر في المملكة، القوارض الصغيرة والأرانب البرية، وحتى الثعالب.




بومة الصحراء	الاسم العربي:
<i>Strix hadorami</i>	الاسم العلمي:
Desert Tawny Owl	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (على الأرجح)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
30 - 35 سم / 140 - 284 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال شرق السودان وشرق مصر وفلسطين والأردن، وبشكل غير منتظم في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان واليمن، مع شمول شبه الجزيرة العربية لما يزيد على 86% من نطاق وجوده العالمي. **حاليته بالمملكة:** **مقيم متكاثر غير شائع.** يُصنّف هذا الطائر الغامض الذي يتميز بطوق وجهه الأبيض الكبير، على أنه مقيم متكاثر ويتوزع بشكل غير منتظم في معظم أنحاء المملكة. **الموئل:** المناطق التي تنطوي على الصخور والوديان والمنحدرات والكهوف، لا سيما الوديان العميقة والمنحدرات الجيرية التي تحتوي على الكثير من الشقوق. ويوجد أيضاً، في مناطق الجرانيت والبازلت، بما في ذلك حقول الحمم البركانية في محمية الملك سلمان (حزة الحة). فيما لم يتم تسجيل أي وجود له في مناطق الحجر الرملي بالمناطق الشمالية الغربية، أو الجنوبية الوسطى. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بشكل أساس القوارض (الجرابيع والجرذان والفئران الشوكية) والزبابت، إلى جانب الزواحف الصغيرة والطيور والجنادب والخنافس والعقارب. ويصطاد عبر الانقضاض من مجثمه على الفريسة، أو التقاط الحشرات الطائرة في الجو. **النشاط:** ليلي وشفقي. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** غير معروف (الأنواع المماثلة تشكّل أزواجاً متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً عادةً). **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي، لكن من المرجح أن الأنثى تتولى معظم مسؤوليات حضن البيض أو جميعها. **العش:** تجويف غير مبطن، أو كهف في جدار خور حاد (وكذلك في الأبراج الحجرية المهجورة في المرتفعات الجنوبية الغربية). وقد تتراكم الفرائس ونشارة الخشب في العش. **البيض المحضون:** 1-5 بيوض. **الحضانة:** 34 - 39 يوماً. **مدة التعشيش:** 30 - 40 يوماً. **الحضنة:** غير معروفة. **ملاحظة:** كان هذا الطائر الحائق يُصنّف سابقاً نوعاً فرعياً من البومة السمراء (*S. aluco*)، أو كان يتم الخلط بينه وبين البومة العُمانية (*S. butleri*). **باع الجناح:** 95 - 98 سم.

لا يوجد الكثير عن طائر بومة الصحراء، علماً أن نحو 86% من تعدادها العالمي يوجد في شبه الجزيرة العربية، ومن المرجح التعداد تعيش في المملكة.

مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,800
منطقة النشاط: محمية طويق



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,800
منطقة النشاط: محمية طويق




عقاب نسارية	الاسم العربي:
<i>Pandion haliaetus</i>	الاسم العلمي:
Osprey	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
55 - 58 سم / الذكر 990 - 1,800 غم؛ الأنثى 1,200 - 2,050 غم (أثقل وزناً بنسبة 15%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مناطق دوائر العرض الاستوائية وشبه الاستوائية وأستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 7,000 كم جنوباً في جميع أنحاء أميركا الجنوبية وأفريقيا وجنوب آسيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. واسع الانتشار على السواحل عند الهجرة وفي الشتاء، ويتكاثر بشكل أساس في البحر الأحمر. **الموئل:** يتكاثر في الجزر الخالية من مصادر التهديد، خاصة الحيوانات المفترسة، وبالقرب من المياه الساحلية الضحلة. وأثناء الهجرة، يوجد في المياه الداخلية والساحلية. **سلوك البحث عن الغذاء:** يفضل الأسماك (حتى 75 سم) التي يمسكها بعد الانقضاض عليها من ارتفاع يراوح بين 5 إلى 75 م. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وأحياناً تكون هذه الطيور متعددة الأزواج (لا سيما في البحر الأحمر) مع نحو أربعة ذكور وأنثى واحدة، أو متعددة الزوجات مع اثنتين من الإناث في عش واحد، أو ذكر واحد واثنتين من الإناث في عشرين. **الأدوار الأبوية:** يؤدي الذكر معظم مسؤوليات الدفاع عن منطقة

يُفضل هذا الطائر الجارح الرائع صيد الأسماك الكبيرة، ويستطيع الغوص من ارتفاع يصل إلى 75 م فوق سطح البحر. كما يلتقط الأسماك المذعورة بمخالبه، ويطيير بينما لا يزال يصارع فريسته.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500
منطقة النشاط: جزر قَرْسَان

السيادة. ويتشارك كلا الأبوين في بناء العش وحضن البيض. أما الأنثى فتتولى رعاية الفراخ لمدة 5 أسابيع بإطعامها مما يجلبه الذكر، ثم يتشارك الأبوان جلب الطعام. **العش:** كومة ضخمة من العصي والحطام، بارتفاع 2 م وعرض 1.5 م، وتتكون مبطنة ومبنية فوق الأرض، غالباً فوق رأس بحري بارز، أو أحياناً فوق قمة مرجانية، أو بنية اصطناعية، أو شجرة مانغروف. ويكون لكل زوج نحو 6 أعشاش، بينما تتم إعادة استخدام بعض المواقع كل عام. ثمة عش في جزيرة تيران يُرجح أنه أعيد استخدامه لمدة 80 عاماً. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 34 - 37 يوماً. **مدة التعشيش:** 44 - 59 يوماً. **الحضانة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** يُعدُّ هذا الطائر العضو الوحيد في عائلته. **باغ الجناح:** 127 - 174 سم.



بومة عقابية مرقطه	الاسم العربي:
بوهة رقطاع عربية	الاسم العربي الآخر:
<i>Bubo africanus</i>	الاسم العلمي:
Spotted Eagle-owl	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
45 سم / الذكر 490 - 620 غم؛ الأنثى 640 - 850 غم (أثقل وزناً بنسبة 35%)	الحجم والوزن:



فرخ وطير بالغ (إلى اليسار)

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جنوب أفريقيا، وجنوب شبه الجزيرة العربية. وقد تم التعرف إلى ثلاثة أنواع فرعية منه، بما في ذلك *B. a. milesi* المتوطن في جنوب شبه الجزيرة العربية (الذي قد يكون نوعاً متميزاً). **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يوجد هذا الطائر الصغير نسبياً، والتميز بطوق أذنه الطويل، في الجنوب الغربي والجنوب حول منطقة جدة. الموئل: يوجد دون ارتفاع 2,800 م في الوديان المشجرة عند سفوح الجبال. ويوجد بوتيرة أقل في منطقة تهامة جنوب جدة، أو المنطقة الشرقية الأكثر جفافاً في المرتفعات الغربية، أو الغابات الوعرة ذات النبتات الصخرية في جبال عسير. وغالباً ما يوجد بالقرب من المناطق الحضرية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: انتهازي، ويشمل ذلك المفصليات

(العناكب والعقارب والخنافس)، والثدييات الصغيرة (القوارض والأرانب البرية والفناذ والخفافيش)، والطيور (من طيور الشمس الصغيرة حتى الطيور الكبيرة، مثل الحمام والصقور والقرنفل). ويصطاد عبر الانقضاض على الفريسة من مجثمه، أو يلتقط الفرائس الطائرة أثناء الطيران. **النشاط:** ليلي، وشفقي. **السلوك**

الاجتماعي: منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام **التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً ووراثياً، مع احتمال وجود روابط زوجية تدوم مدى الحياة. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضن البيض، بينما يتولى الذكر جلب الطعام. ويتشارك كلا الأبوين في رعاية الصغار. **العش:** حفرة غير مبطنة فوق الأرض

في عديد من طيور البوم، تكون الأنثى أكبر بكثير من الذكر، وذلك لأن الذكور الأصغر يمكنها أن تصطاد الفرائس الأسرع، في حين تستثمر الإناث الأكبر حجماً طاقتها في التكاثر.

بين الصخور، أو في تجويف في منحدر أو صفة ترابية أو شجرة أو مبنى، أو فوق عش مهجور لنوع آخر. وغالباً ما يُعيد استخدام العش نفسه كل عام، فيمتلئ بالريش وبقياء فضلات وقلس. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 30 - 32 يوماً. **مدة التعشيش:** 30 - 38 يوماً. **الحضانة:** حضنة مفردة، أو مزدوجة في حال توافر الطعام. **ملاحظة:** يمكن ترقب هذا الطائر حول مصابيح الشوارع عند حافة الجرف بالقرب من تنومة. **باغ الجناح:** 100 سم.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 800
منطقة النشاط: تنومة



حوام العسل الأوروبي

عقيب العسل أوروبية
Pernis apivorus
 European Honey-buzzard
 غير مهدد
 يتناقص
 -
 -
 الحجم والوزن: 52 - 60 سم / 360 - 1,050 غم

الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا حتى إيران ومنغوليا، ويقضي الشتاء على بُعد 4,000 - 8,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر. يُعدُّ هذا الطائر الجارح المتميز بلونه شديد التغير، مهاجراً عابراً غير شائع عبر المملكة في فصل الخريف (سبتمبر - نوفمبر)، ومع ذلك يندر وجوده في فصل الربيع. وتسلق عشرات الآلاف منه طريق الهجرة الرئيس من الشمال إلى الجنوب، مروراً بغرب البحر الأحمر من السويس، مع مرور قلة منه شرق البحر الأحمر وصولاً إلى المملكة. كما تتدفق طيوه بغزارة أثناء عبورها مضيق باب المندب من اليمن إلى جيبوتي في الخريف. فيما تنحسر هجرته عبر مضيق باب المندب في الربيع، مع فرضية تحرك الطيور الربيعية شمالاً عبر شمال شرق أفريقيا. **الموئل:** يعيش حوام العسل الأوروبي في أي بيئة أثناء هجرته. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

تخلق هذه الطيور الجارحة

مسافات طويلة حتى 700 كم،

مترقبة الرياح المواتية للهجرة

عبر أكثر الصحاري الشاسعة


في العالم.

الغذائي: يقتات على أنواع مخصصة للغاية، بما في ذلك اليرقات والشرانق وأزواج غشائيات الأجنحة التي تقيم في مستعمرات (الدبابير والزنابير بصفة أساس)،

إذ يعتمد إلى حفر، أو مهاجمة الأعشاش مباشرة، حتى أنه يخلق وراء الدبابير متتبعاً إيها لمسافات تصل إلى 8 كم لتحديد أماكن مستعمراتها وينقض عليها. كذلك يفضل اصطيد عدد من الزواحف والبرمائيات والثدييات والطيور. علماً أنه قد تعذرت ملاحظته أثناء اقتيابه في شبه الجزيرة العربية، وربما يمر عبرها دون تناول أي طعام.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** شوهدت مجموعات مهاجرة مكونة مما يقرب من 50 طائراً أثناء تحركها إلى الجنوب بالقرب من ينبع. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا النوع من الجوارح متباين الأشكال والألوان إلى حد بعيد، علماً أنه تم التعرف إلى أشكال ما لا يقل عن عشرة من الطيور البالغة وسبعة من الفراخ.

باع الجناح: 118 - 150 سم.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: ينبع

**الحدأة سوداء الجناح**

زرزق شائع
Elanus caeruleus
 Black-winged Kite
 غير مهدد
 مستقر
 معرض للانقراض
 يتزايد
 الحجم والوزن: 30 - 37 سم / 197 - 277 غم

الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جنوب غرب أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى والجزيرة العربية، والهند باتجاه الجنوب الشرقي وصولاً إلى غينيا الجديدة. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شديد الندرة، زائر نادر. تتكاثر بضعة أزواج من هذا الطائر في جنوب تهامة وسفوح المرتفعات الغربية من المملكة، مع أرجحية حدوث ذلك سنوياً. **الموئل:** يوجد دون ارتفاع 500 م في حقول الحبوب ذات الأشجار المتناثرة، لا سيما الطلح وأشجار دوبييرا، وعادةً بالقرب من الوديان المتدفقة، أو قنوات الري. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على القوارض، فضلاً عن الخفافيش والطيور الصغيرة والزواحف والحشرات. ويصطاد منطلقاً من مجثم، أو عبر التحويم، ثم النزول ببطء على مراحل مثبتاً أجنحته عالياً وفدلياً قدميه لأسفل، ويتبع ذلك بانخفاض مفاجئ وسريع على الفريسة فوق سطح الأرض. كما يقوم بالتقاط الحشرات الطائرة أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى وفي وقت الشفق. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً بشكل عام، وأحياناً تكون متعددة الأزواج مع وضع الأنثى حضنة ثانية مع ذكر جديد. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان

في بناء العش ورعاية الصغار، وتتولى الأنثى حضن البيض، بينما يدافع الذكر عن منطقة السيادة. **العش:** عبارة عن قاعدة رقيقة مسطحة من الأغصان، ومبطنة بالأعشاب والجذور، ومثبتة على ارتفاع يراوح بين 4 إلى 5 م فوق سطح الأرض (في بعض الأحيان 2 إلى 20 م) بين فروع أشجار منفردة. علماً أن هذا الطائر يبني عشه كل سنة.

البيض المحضون: 3 - 4 بيوض. **الحضانة:**

31 يوماً. **مدة التعشيش:** 30 - 40 يوماً. **الحضنة:** انتهازى، متعدد الحضنات أحياناً.

باع الجناح: 77 - 92 سم. **حالة الحماية:** صُنّف هذا الطائر على أنه مهدد بالانقراض

إقليمياً بسبب حجم تعداده الضئيل جداً. ولحسن الحظ، يبدو أن أعداده تتزايد ببطء

بفعل تزايد حقول الحبوب، التي توفر بدورها فرائس مناسبة.

في بناء العش ورعاية الصغار، وتتولى الأنثى حضن البيض، بينما يدافع الذكر عن منطقة السيادة. **العش:** عبارة عن قاعدة رقيقة مسطحة من الأغصان، ومبطنة بالأعشاب والجذور، ومثبتة على ارتفاع يراوح بين 4 إلى 5 م فوق سطح الأرض (في بعض الأحيان 2 إلى 20 م) بين فروع أشجار منفردة. علماً أن هذا الطائر يبني عشه كل سنة.


البيض المحضون: 3 - 4 بيوض. **الحضانة:**

31 يوماً. **مدة التعشيش:** 30 - 40 يوماً. **الحضنة:** انتهازى، متعدد الحضنات أحياناً.

باع الجناح: 77 - 92 سم. **حالة الحماية:** صُنّف هذا الطائر على أنه مهدد بالانقراض

إقليمياً بسبب حجم تعداده الضئيل جداً. ولحسن الحظ، يبدو أن أعداده تتزايد ببطء

بفعل تزايد حقول الحبوب، التي توفر بدورها فرائس مناسبة.



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5

منطقة النشاط: حرض



النسر الملتحي

الاسم العربي:	ستل
الاسم العربي الآخر:	Bearded Vulture, Lammergeier
الاسم العلمي:	قريب من التهدد
الاسم الشائع:	يتناقص
حالة الحماية العالمية:	معرض للانقراض
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر (من المحتمل أن يتناقص)
حالة الحماية الإقليمية:	مستقر (من المحتمل أن يتناقص)
المنحى الإقليمي للمجموعة:	94 - 125 سم / 4,500 - 7,100 غم
الحجم والوزن:	



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أفريقيا وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية وجنوب أوروبا حتى جبال الهيمالايا. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر، ربما منقرض.** تكاثر هذا النسر الفريد من قبل في جميع أنحاء مرتفعات المملكة، لكن يبدو أنه انقرض حالياً في المملكة، ولا يبقى سوى التمسك بالأمل في وجود بعض منه في المناطق التي يتعذر الوصول إليها. **الموئل:** منحدرات الحجر الرملي في الشمال الغربي، والمناطق الجبلية الوعرة في الغرب، وحافة الجرف في الجنوب الغربي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على العظام، إذ يفضل العظام الأقدم والأخف وزناً، وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. ويتغذى على العظام والنخاع، وحتى الكريات التي تقلسها البومة العقابية للحصول على ما تحويه من خلايا عظمية. كما أنه يتغذى في بعض الأحيان على جيف الثدييات الصغيرة، وبيتلع العظام الصغيرة كاملة، أو يقذف العظام الكبيرة من ارتفاع نحو 80 م فوق سطح الأرض لتحطيمها على الصخور الموجودة في الأسفل. علماً أن الطيور البالغة قد تسيطر على مساحة من آلاف الكيلومترات المربعة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج

على النقيض من أي كائن

حي فقاري آخر، يتغذى هذا

النسر الضخم على العظام

بشكلٍ رئيس. وللأسف، فقد

انقرض حالياً في المملكة.



مقيم متكاثر (ربما منقرض)

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يسجل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: المرتفعات الجنوبية الغربية

**حوام متوج**

الاسم العربي:	عقيب العسل شرقية
الاسم العربي الآخر:	Pernis ptilorhynchus
الاسم العلمي:	Oriental Honey-buzzard
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	مستقر
المنحى العالمي للمجموعة:	-
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	52 - 68 سم / الذكر 750 - 1,280 غم؛ الأنثى 950 - 1,490 غم (أثقل وزناً بنسبة 20%)



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب آسيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر ابتداءً من شرق كازاخستان وصولاً إلى اليابان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً ضمن نطاق وجوده، وباتجاه الغرب حتى شبه الجزيرة العربية. وقد يُعزى سبب انتشار هذا النوع على نطاق واسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط خلال العقدتين الأخيرين، إلى محاولته بتوسيع نطاقه غرباً بتعداداته في آسيا الوسطى. **حالته بالمملكة: زائر شتوي محدود، زائر دائم غير منتظم.** سُجل ظهور هذا النوع من الجوارح مختلف الألوان في المملكة فقط منذ عام 1994، ومنذ ذلك الحين أصبح أكثر شيوعاً، إذ تفضل بعض طيوره قضاء فصل الشتاء في المملكة، فيما تصل طيور أخرى في أواخر فصلي الصيف والخريف، مع احتمالية كونه زائراً دائماً. **الموئل:** متغير، ويشمل ذلك الغابات والحدائق المروية والمرتفعات الجنوبية الغربية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على أنواع خاصة للغاية، منها النحل والديابير ويرقاتها بشكل خاص التي تقيم في مستعمرات،

إذ يهاجم بيوتها لافتراس اليرقات وتناول

العسل، وهو يهاجم البيوت الموجودة في

ثقوب الأشجار، أو المعلقة في أطرافها، أو

يحفر الأرض برجليه لإخراج بيوت هذه الحشرات،

ولحماية نفسه من لدغات فريسته، يمتلك

الطائر منقاراً ربيعاً ذا طرف معقوف، ومخالب

طويلة، وريشاً يشبه القشور حول العينين،

وغشاءً طرياً طويلاً حول منقاره، وفتحات


أنفية شبيهة بالشقوق (الخياشيم)، كما

يصطاد عدداً من الحشرات الأخرى والزواحف

والثدييات والطيور الصغيرة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك**

التكاثر: لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا النوع من الطيور متباين الأشكال إلى حدٍ

بعيد، ويمتاز بريش بالغ الاختلاف. **باغ الجناح:** 115 - 155 سم.



زائر شتوي، زائر صيفي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران

العقاب المصفق

عقاب بهلوانية
Terathopius ecaudatus
Bearded Vulture
قريب من التهدد
يتناقص

–
–
الحجم والوزن:
55 - 70 سم / 1,820 - 2,950 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:


حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



زائر غير منتظم (ربما منقرض)
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجَل تكاثره (مع إمكان حدوثه)
منطقة النشاط: جنوب تهامة

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جميع أنحاء السهول العشبية الأفريقية وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** زائر نادر جداً، أو دائم غير منتظم، أو ربما منقرض. يوجد هذا النسر الجميل والنادر في تهامة، ويتجنب مرتفعات عسير المغطاة بالسحب. وسُجِلت جميع مشاهداته في الفترة من يوليو ولغاية أبريل، خاصة في ديسمبر، حيث لوحظت أزواج وعروض تودد. ويمكن أن يتكاثر أيضاً، في المناطق النائية بأعداد منخفضة للغاية. بل قد يكون الآن زائراً نادراً للغاية من أفريقيا، وكانت آخر مشاهدة مؤكدة له في عام 1999. **الموئل:** على الرغم من أن هذا الطائر البهلواني عديم الذنب لم يكن شائعاً في المملكة، إلا أنه لا يزال من المقلق عدم تسجيل ظهوره في المملكة منذ عام 1999.

خلال مسح نحو 50 م جيئةً وذهاباً فوق سطح الأرض، ويحوم على ارتفاع منخفض، ثم ينقض في دوامة ضيقة على فريسته في الأسفل. ويمكنه الطيران مسافة تصل إلى 500 كم يومياً بحثاً عن الطعام، وقد يقضي 80% من اليوم على الأرجح في التحويم. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** أحياناً يُوصف بالأوسم بين جميع أنواع النسور، فهذا الطائر أسلوب طيران مائل فريد من نوعه، وسرعة تجعل أجنحته تصدر صوتاً صاخباً يُسمع من مسافة كبيرة. في واقع الأمر، اشتق اسمه من كلمة فرنسية استخدمت في منتصف القرن التاسع عشر وتعني «لاعب الخفة البهلواني»، في إشارة إلى أسلوب طيرانه المائل الجانبى. **باج الجناح:** 168 - 190 سم.

**رخمة**

Neophron percnopterus
Egyptian Vulture
مهدد بالانقراض
يتناقص
معرض للانقراض
يتناقص

54 - 70 سم / 1,600 - 2,400 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جميع أنحاء أفريقيا الساحلية مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى الهند، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أفريقيا حول البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى الصين ونيبال، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم باتجاه الجنوب ضمن نطاق وجوده. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثراً نادر، مهاجر عابر محدود، زائر شتوي نادر. يُعدُّ هذا الطائر الفريد مهاجراً عابراً وزائراً شتوياً، يتكاثر في جميع المناطق باستثناء بحار الرمال والشمال والشمال الشرقي. **الموئل:** يتكاثر في الموائل المكشوفة، وغالباً في المناطق الجافة والنائية التي تشمل على منحدرات وتبوءات صخرية. كما أنه يتغذى في مكب النفايات والأسواق وحضائر الحيوانات والمقاصب والمزارع ومناطق فرز الأسماك. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يفضل الفقاريات الميتة، كما يصطاد أحياناً الحيوانات الضعيفة، أو المريضة، وفي أحيان أخرى يُسقط الحجارة على البيض الكبير لاستخراج محتوياته، وهو قادر على اكتشاف الفريسة على بُعد كيلومتر واحد، ويقطع 80 كم يومياً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** مجموعات صغيرة تتجمع في مصادر الغذاء الغنية. وقد سبق تسجيل نحو 200 طائر بالمنطقة الرطبة في الجنوب الغربي في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن أعداده تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. **سلوك التكاثر:** نظام

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وأحياناً متعددة الأزواج بوجود أنثى واحدة تعيش مع اثنين من الذكور. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** قاعدة مكونة من الغصينات المبطننة بالصوف وشعر الماعز والجرق والورق والفراء والجلد والعظام، وتُثبت في تجويف أو نتوء داخل جرف. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 39 - 42 يوماً. **مدة التعشيش:** 70 - 90 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باج الجناح:** 146 - 175 سم. **حالة الحماية:** يتراجع هذا النوع بنحو متسارع عالمياً وإقليمياً، مع فقدان 90% منه على مدى السنوات الخمسين الماضية في شبه الجزيرة العربية، بفعل التسمم والاصطدام بخطوط الكهرباء وفقدان الموائل والمضايقات.



مقيم متكاثراً، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 50
منطقة النشاط: جزر قَرْسَان




النسر الأسمر

النسر الأسمر	: الاسم العربي:
نسر أوراسي	: الاسم العربي الآخر:
<i>Gyps fulvus</i>	: الاسم العلمي:
Griffon Vulture	: الاسم الشائع:
غير مهدد	: حالة الحماية العالمية:
يتزايد	: المنحى العالمي للمجموعة:
مهدد بالانقراض	: حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	: المنحى الإقليمي للمجموعة:
95 - 100 سم / 6,000 - 11,000 غم	: الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا، مروراً بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، وصولاً إلى شمال غرب الهند وجنوب كازاخستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر حول منطقة القوقاز، بينما يقضي الشتاء في منطقة أفريقيا الساحلية، وامتداداً من شبه الجزيرة العربية حتى الهند. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع.** يوجد في المملكة أثناء هجرته، ويشتهي (سبتمبر - مارس) ويتكاثر في المناطق الغربية والشمالية الوسطى. **الموئل:** يتكاثر في المناطق الجبلية المقسمة، حيث المنحدرات المرتفعة لغرض التعشيش والجنوم، كما يزور سهول تهامة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الجيف، خاصة ذوات الحوافر، مثل الوعول والغزلان والأغنام والماعز والإبل. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** مجموعات يصل عددها إلى 15 طائراً تستخدم الدلالات الاجتماعية، إذ تستقر أفرادها في مواقع الجنوم لعشرات الكيلومترات بحثاً عن الطعام، بحيث إذا وجد أحدها فريسة، تنضم إليه الطيور الأخرى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وتعشش في مستعمرات حرة تضم عادة 2 - 3 أزواج، ولكنها تصل أحياناً إلى 50 زوجاً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** وسادة رقيقة مكونة من العيدان، ومبطنة بالكثير من الأعشاب والغصينات المورقة، ومثبتة على حافة محمية، أو في كهف صغير على جرف مرتفع. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 48 - 54 يوماً. **مدة التعشيش:** 110 - 115 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 240 - 280 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر موضوع على قائمة الطيور المهددة بالانقراض إقليمياً بسبب انخفاضه بنسبة 50 - 80% في الفترة بين عامي 1972 و2015 في شبه الجزيرة العربية نتيجة التسمم الثانوي (نسر تاكل فريسة مسمومة)، وانخفاض القاعدة الغذائية العاشبة الكبيرة في المناطق الطبيعية.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 2,500
منطقة النشاط: جرف تنومة

**عقاب الثعابين**


عقاب الثعابين	: الاسم العربي:
صرارة	: الاسم العربي الآخر:
<i>Circaetus gallicus</i>	: الاسم العلمي:
Short-toed Snake-eagle, Short-toed Eagle	: الاسم الشائع:
غير مهدد	: حالة الحماية العالمية:
مستقر	: المنحى العالمي للمجموعة:
معرض للانقراض	: حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	: المنحى الإقليمي للمجموعة:
62 - 70 سم / الذكر 1,200 - 2,000 غم؛ الأنثى 1,300 - 2,300 غم (أثقل وزناً بنسبة 10%)	: الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الهند وباكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر امتداداً من شمال غرب أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط حتى منغوليا، بينما يشتهي على بُعد 3,000 - 5,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في منطقة أفريقيا الساحلية بشكل رئيس. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر محدود، زائر شتوي محدود.** يوجد هذا النسر المثير ضمن نطاق واسع في مختلف أنحاء المملكة مهاجراً

يُفضل هذا النوع المذهل من الجوارح اصطياد الثعابين على نحو خاص، والتي قد تشكل نحو 80% من نظامه الغذائي. وعادةً ما يصطاد أفعى أو اثنتين في اليوم، والتي قد يصل طول بعضها إلى 1.5 م.

عابراً وزائراً شتوياً، ويتكاثر في المناطق الوسطى والمرتفعات الجنوبية الغربية. **الموئل:** يتكاثر في منطقة الجبال المعزولة، وفوق أشجار الطلع المنتشرة في المناطق الوسطى، وفي غابات العرعر في المرتفعات الجنوبية الغربية. ويوجد أثناء الشتاء أيضاً، في المناطق النائية المقسمة، والتلوات الصخرية، والتلال، والجبال ذات الغطاء الشجري، علماً أنه يظهر في أي مكان على طول طريق هجرته. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الثعابين (حتى طول 1.5 م)، والزواحف الأخرى التي يلتقطها عن طريق المسح من مسافة 20 - 150 م فوق سطح الأرض والانقضاض عليها. وعادةً ما يتلغ الفريسة بأكملها، ويكون ذلك أحياناً أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش ورعاية الفراخ. وتتولى الأنثى معظم الحضنة، فيما يتولى الذكر مسؤولية الدفاع عن منطقة السيادة. **العش:** قاعدة ضحلة (قطرها 60 سم) مكونة من الغصينات، ومبطنة بغصينات دقيقة، ومثبتة على ارتفاع 3 م تقريباً فوق سطح الأرض في أي شجرة طلع، أو عرعر، علماً أنه يبني عشاً جديداً سنوياً، وعادةً ما يكون في منطقة السيادة نفسها. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** 45 - 47 يوماً. **مدة التعشيش:** 70 - 75 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 166 - 188 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر مدرج في قائمة الفئات المعرضة للانقراض في شبه الجزيرة العربية لأن تعداده أقل من 1,000 فرد بالغ، ولحسن الحظ، يبدو تعدادها الصغير مستقر إلى حد ما.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 120
منطقة النشاط: بحيرة الأصفر



نسر آذن

Torgos tracheliotos
Lappet-faced Vulture

مهدد بالانقراض

يتناقص

معرض للانقراض

يتناقص

115 سم / 5,400 - 9,400 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم، يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وشبه الجزيرة العربية. وقد تم التعرف إلى ثلاثة أنواع فرعية منه، بما فيها *T. t. negevensis* المتوطن في شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يوجد بصفة رئيسة في المناطق الوسطى. **الموئل:** يتكاثر في السهول الشاسعة ذات الأشجار المتناثرة، أو المنعزلة ذات القمم المسطحة، ويرعى على نطاق واسع في الموائل المكشوفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يقتات بشكل أساسي على الجيف والجلد والعظام، حيث يبحث عن الجيف الكبيرة، أو الصغيرة على بُعد 200 كم من

العش. **النشاط:** نهارى، ونادراً ما ينشط قبل الساعة التاسعة صباحاً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أزواج، غير أنه تم تسجيل مشاهدة 45 طائراً معاً فوق جيفة كبيرة، فضلاً عن ظهور 162 طائراً جاثماً في محمية محازة الصيد في فصل الخريف. علماً أنه يهيمن على جميع الطيور الأخرى في موقع الرعي. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الأبوين



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500

منطقة النشاط: محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز (محازة الصيد)

**نسر مسود**

Aegyptius monachus
Cinereous Vulture

قريب من التهديد

يتناقص

-

-

107 - 98 سم / 7,000 - 12,000 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أيبيريا، وامتداداً من تركيا حتى منغوليا. بينما تضي بعض تعداداته فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم باتجاه الجنوب من تركيا وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى جبال الهيمالايا. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. هذا النسر العملاق زائر شتوي منتظم ونادر (ديسمبر - مارس) للنصف الشمالي من السعودية، مع انعدام مشاهداته في الجنوب الغربي والربع الخالي، علماً

أن أحد الطيور الحاملة لجهاز تتبع بالأقمار الصناعية والمتكاثر في جورجيا، قطع مسافات طويلة وسط المملكة ابتداءً من منتصف ديسمبر حتى منتصف مارس، ثم عاد إلى أراضي تكاثره. **الموئل:** يُفضل السهول المكشوفة والجبال، حيث يمكنه العثور على جيف الحيوانات الأليفة، أو الحيوانات البرية. كما يتغذى في مكب النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: جيف الحيوانات، بما فيها الماشية المحلية والحيوانات الميتة بسبب حوادث الطرق والحيوانات البرية، وهو يفضل جيف الثدييات الكبيرة، لكنه لا يرفض التغذي أيضاً على بقايا الحيوانات الصغيرة، مثل الأرانب البرية والقوارض والزواحف والطيور. كما أنه يصطاد ويتغذى على الفرائس الحية الصغيرة، بما فيها الثعابين والسحالي، وحتى الحشرات.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما تتم رؤيته منفرداً، وفي أحيان أخرى ضمن أزواج، مع التنويه بظهور ثلاثة منه مرة واحدة في الدببة، لكنه يجتمع مع أفراد نوعه أو غيره من النسور عند جيف الحيوانات، ويهيمن على الأنواع الأصغر من حيث حصة المجموعة، بما في ذلك النسر الأسمر (النسر الأوراسي). كما أنه يجتم مع كل من النسر الأسمر ونسر آذن. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 250 - 295 سم.




زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الدببة

عقاب صحماء	الاسم العربي:
<i>Aquila rapax</i>	الاسم العلمي:
Tawny Eagle	الاسم الشائع:
معرض للانقراض	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
تهدد بالانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
60 - 75 سم / 1,600 - 3,100 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أفريقيا وباكستان والهند، مع وجود تعداد صغير منه في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر جداً.** تم العثور على هذا النسر الهائل في تامة وسفوح تلال الجنوب الغربي. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات تقل عن 2,000 م في المناطق الزراعية قليلة الأشجار وسفوح التلال بالقرب من المياه ومكب النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الثدييات الصغيرة بحجم الوبر الصخري نفسه تقريباً، وكذلك الطيور (كبيرة الحجم على الأقل، مثل البط والدجاج الحبشي)، والسحالي والجيف والحشرات. كما أنه يقتات في مكب النفايات، ويأسر فريسته بالانقضاض عليها من مجثمه أو بعد التحويم، والتجول على الأرض أثناء الاقليات، أو السرقة من الطيور الكبيرة الأخرى. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون منفرداً، رغم أنه غالباً ما يوجد في مجموعات بمواقع الرعي الغنية. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى بناء العش، وتقوم بمعظم مسؤوليات الحضنة ورعاية الفراخ مما يحضره الذكر. **العش:** قاعدة كبيرة (قطرها متر واحد) مكونة من العيدان، وربما تكون مبطنة بالأعشاب الجافة، ومثبتة على ارتفاع 9 - 30 م فوق سطح الأرض فوق شجرة (أو ربما برج كهرباء. كما هو مسجل



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي



يصطاد هذا الكائن المخيف فرائس كبيرة، مثل الدجاج الحبشي، والوبر الصخري التي قد يصل وزنها إلى ضعف وزن النسر نفسه.


بشكل متزايد في اليمن). وقد يعيد استخدام العش نفسه سنوياً. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض (الأعشاش المدروسة = 2). **الحضنة:** 39 - 44 يوماً. **مدة التعشيش:** 76 - 85 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** يوجد هذا الطائر بأشكال لونية مختلفة. **باغ الجناح:** 159 - 183 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر يأتي ضمن قائمة الطيور المهددة بالانقراض في شبه الجزيرة العربية بسبب تعداده الآخذ في التناقص، ولأن أي تعداد فرعي منه لا يضم أكثر من 1,000 فرد بالغ. إنه معرض للانقراض ولانخفاض تعداده حول العالم بسبب تناول الجيف المسمومة، والمضايقات المباشرة، والاصطدام بخطوط الكهرباء.

عقاب رقطاء كبرى	الاسم العربي:
<i>Clanga clanga</i>	الاسم العلمي:
Greater Spotted Eagle	الاسم الشائع:
معرض للانقراض	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
59 - 71 سم / 1,500 - 1,900 غم؛ الأنثى 1,800 - 2,500 غم (أثقل وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شرق أوروبا حتى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في منطقة البحر الأبيض المتوسط مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى جنوب شرق آسيا. **حاليته بالمملكة: زائر شتوي غير شائع.** أعداد صغيرة من هذا النسر المهيب تقضي الشتاء على طول السواحل، وفي بعض الأراضي الرطبة الداخلية. ويبدو أنه يتجنب المنطقة الشمالية الغربية، إذ لم يُسجل أي ظهور له في تبوك، وقد يتجنب الشتاء في شمال ينبع، فيما قد تظل بعض أفرادها لقضاء الصيف. **الموئل:** يفضل المناطق الساحلية التي تضم أشجار المانغروف والقصب، أو غيرها من النباتات الطويلة. كما يوجد في الأراضي الرطبة الكبيرة التي تحتوي على القصب والشجيرات والمياه المكشوفة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يفضل أكل الثدييات والطيور الصغيرة حية. إضافة إلى الجيف، بما فيها الحيوانات النافقة بسبب حوادث الطرق. وأكثر فرائسه شيوعاً هي الطيور المائية الكبيرة، كالبلشون والبط. كما أنه يصطاد ويقتات على البرمائيات والزواحف، وحتى الحشرات. يقضي الكثير من وقته في الجثوم وترصد الضحايا المحتملين، ولكنه يخلق عالياً أيضاً ثم ينقض لاصطياد فرائسه، ويتجول على طول التخوم الرطبة بحثاً عن حيوانات أصغر حجماً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً، وربما يقضي الكثير من أفرادها فصل الشتاء في الأراضي الرطبة الشاسعة، إذ شوهد نحو ثمانية منه في يوم واحد بسبخة الفصل. كما أنه ينضم إلى الأنواع الأخرى أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** قد يظهر أيضاً بلون فاتح نادر جداً. **باغ الجناح:** 155 - 180 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر مصنف على أنه معرض للانقراض حول العالم بسبب قلة تعداده الذي بدأ في التناقص بسبب فقدان الموائل بصورة كبيرة، والمضايقات المستمرة، علماً أنه لا يجذب الوجود في أي منطقة تتسم بالوجود البشري الدائم.

شأنه شأن الكثير من الطيور الجارحة الأخرى، تكون الإناث أكبر وأقوى من الذكور، إذ يتسنى للإناث الأكبر هيمنة على الذكور، في حين تتمكن الذكور الأكثر رشاقة من اصطياد الفرائس الأكثر سرعة.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل



عقاب ملكي شرقي*Aquila heliaca*
Eastern Imperial Eagle

معرض للانقراض


يتناقص

- الاسم العربي:
- الاسم العلمي:
- الاسم الشائع:
- حالة الحماية العالمية:
- المنحى العالمي للمجموعة:
- حالة الحماية الإقليمية:
- المنحى الإقليمي للمجموعة:
- الحجم والوزن:

72 - 84 سم / الذكر 2,450 - 2,720 غم؛ الأنثى 3,160 - 4,530 غم (أثقل وزناً بنسبة 50%)



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في تركيا وإيران وأفغانستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق أوروبا وصولاً إلى شمال شرق الصين، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشمال الهند وجنوب شرق آسيا. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي غير شائع. هذا النسر الملكي في الأساس زائر شتوي غير شائع للسهول الشمالية والمنطقة الوسطى. وقد كشف إحصاء عن أن تعداداً كثيراً منه يقضي فصل الشتاء في السهول الشمالية، ما يجعلها أهم مناطق العالم بالنسبة إليه لقضاء فصل الشتاء. أما الطيور التي تخضع للتتبع عبر الأقمار الاصطناعية، فقد توجهت إلى روسيا وكازاخستان والصين مروراً بالطائف خلال فصل الشتاء. **الموتل:** صحراء السهوب المكشوفة وسط المملكة، والسهول الشمالية. عادةً ما يتجنب المدن، والأراضي الرطبة، والمواقع البشرية الأخرى. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على الثدييات متوسطة الحجم، مثل القوارض وبعض الطيور، وقليل من الزواحف. ويصطاد بالجنوم



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الدبديبة**عقاب السهول**

عقاب سهبية

Aquila nipalensis

Steppe Eagle

مهدد بالانقراض


يتناقص

- الاسم العربي:
- الاسم العربي الآخر:
- الاسم العلمي:
- الاسم الشائع:
- حالة الحماية العالمية:
- المنحى العالمي للمجموعة:
- حالة الحماية الإقليمية:
- المنحى الإقليمي للمجموعة:
- الحجم والوزن:

72 - 81 سم / 2,400 - 3,900 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في السهوب امتداداً من بحر قزوين إلى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 - 7,000 كم جنوباً في شرق وجنوب أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والهند. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع. ينتشر على نطاق واسع كزائر شتوي، فيما تهاجر أعداد كثيرة منه إلى اليمن، ثم إلى أفريقيا. **الموتل:** يفضل الوجود في المواقع المعدلة بشرياً، بما في ذلك مكب النفايات والمزارع والمدن، غير أنه قد يظهر غالباً في أي مكان بالمملكة أثناء موسم الهجرة، حتى في الربع الخالي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: ربما يتغذى بشكل أساس على القوارض (وفقاً لما هو مسجل في نطاق تكاثره). وبناءً على ذلك، هناك تقارير عدة في المملكة تفيد اتباعه المحاريت، وتغذيته على القوارض النازحة. وقد يبحث عن الطعام فوق الأرض، أو يحلق في الهواء، ثم ينقض على فريسته. كما أنه يتحين الفرص لالتقاط الجيف، مثل الحيوانات الميتة بسبب حوادث الطرق، وسرقة الطعام من الطيور الجارحة الصغيرة. علاوةً على ذلك، فإن أي مكب للنفايات يمكنه اجتذاب تجمع من عقاب السهول الذي يبدو أنه يقضي فصل الشتاء بأكمله في موقع واحد. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في مجموعات أثناء هجرته، وغالباً مع غيره من النسور. وقد تحتشد أعدادٌ غفيرة منه أثناء الهجرة، حيث يمكن رؤية مئات عدة منه بالقرب من المدن الكبرى. وقد شوهد نحو 1,000 طائر في منطقة الرياض ذات مرة في منتصف نوفمبر. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 160 - 200 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر مصنّف على أنه مهدد بالانقراض عالمياً، نظراً لتناقص أعداده بوتيرة كبيرة في جزء كبير من نطاق تكاثره بفعل تحويل السهوب إلى أراض زراعية. كما أنه يعاني من المضايقات والصيد والاصطدام بخطوط الكهرباء والتسمم العرضي في نطاق وجوده، بما في ذلك داخل المملكة.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جرف الطائف

العقاب الأسود	الاسم العربي:
عقاب خُدَّارية	الاسم العربي الآخر:
<i>Aquila verreauxii</i>	الاسم العلمي:
Verreaux's Eagle	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
مهدد بالانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
80 - 90 سم / الذكر 3,000 - 4,150 غم؛ الأنثى 3,100 - 5,800 غم (أثقل وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جنوب وشرق أفريقيا، إلى جانب تجمعات صغيرة في شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال وصولاً إلى الأردن. ويرتبط توزيعه ارتباطاً وثيقاً بوجود الوبر الصخري، مصدر غذائه الرئيسي. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. يُعدُّ هذا العقاب الأسود المهيب مقيماً متكاثراً نادراً في المملكة، ولا يوجد

سوى في المرتفعات الغربية وسفوح التلال. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات تتجاوز 200 م في المناطق الجبلية ذات المنحدرات والوديان الملائمة للتعشيش. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يقتات بشكل رئيس على الوبر الصخري، وأحياناً صغار قردة الراج، وبياعت هذا الطائر فريسته فحلقاً بسرعة حول تل، أو تنوء ما. وقد يصطاد أيضاً، بالتعاون مع طائر

يصطاد هذا العقاب الأسود والأبيض الجميل الوبر الصخري بشكل رئيس. كما يقتات أيضاً، على صغار قردة البابون التي تزن أكثر من 2-3 مرات ضعف حجم الطائر نفسه.

آخر، حيث يشنت الضحية المحتملة فيما يهاجمها العقاب الآخر من الخلف. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتقاسم الزوجان مسؤوليات بناء العش (الأنثى بشكل أساس)، والحضن ورعاية الفراخ والدفاع المستميت عن العش (يشمل ذلك قذف أو إسقاط الصخور والحصى وغيرها من أدوات الدفاع لصد الكائنات المفترسة والمتسللة). **العش:** قاعدة ضخمة مكونة من العيدان (يقطر يراوم بين متر واحد إلى اثنين، وعمق يصل إلى متر واحد) ومبطنة بنباتات خضراء، ومثبتة على حافة جرف ما. وغالباً ما يعيد استخدام الأعشاش نفسها لسنوات عديدة. **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى اثنتين. **الحضانة:** 43 - 47 يوماً. **مدة التعشيش:** 84 - 99 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 181 - 219 سم **حالة الحماية:** هذا الطائر مدرج ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض إقليمياً، بسبب صغر حجم تعداده الذي يضم أقل من 250 فرداً بالغاً. ويبدو هذا العدد الصغير، لحسن الحظ، أخذ في التزايد بمنطقة شبه الجزيرة العربية، ربما بسبب الأعداد المتزايدة من قردة البابون.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 20
منطقة النشاط: أبها




عقاب مذهب	الاسم العربي:
<i>Aquila chrysaetos</i>	الاسم العلمي:
Golden Eagle	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
مهدد بالانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
75 - 90 سم / الذكر 2,840 - 4,550 غم؛ الأنثى 3,630 - 6,665 غم (أثقل وزناً بنسبة 40%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة منه في أميركا الشمالية وشمال غرب أفريقيا، وفي جزء كبير من أوراسيا. فيما تقع شبه الجزيرة العربية عند الطرف الجنوبي من نطاق تكاثره، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في كندا، بينما يقضي فصل الشتاء في الولايات المتحدة الأميركية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يتكاثر هذا النسر الذي يحبس الأنفاس بشكل رئيس في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى والمرتفعات الغربية. **الموئل:** يفضل السهول الرملية الصلبة، أو السهول الحصوية الشاسعة المستوية، أو المتموجة قليلاً، إما من دون أشجار، أو بوجود أشجار الطلع المتناثرة التي تتخللها تنوعات صخرية، وذلك في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى، أو في المناطق الجبلية الصخرية من المرتفعات الغربية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على الثدييات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بما في ذلك الأرانب البرية والقوارض والقنافذ والثعالب، وكذلك السحالي (خاصة الضب)، والطيور (بما فيها الغربان). كما يقتات على الجيف، بما في ذلك الماشية المحلية. وعادةً ما يصطاد الفريسة من الأرض ضمن رحلة طيران منخفض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش ورعاية الفراخ. وتتولى الأنثى معظم الحضنة. **العش:** قاعدة مكونة من العيدان ومبطنة بالأعشاب والعصينات المورقة، ومثبتة

على حافة محمية فوق تنوع صخري (أو ربما شجرة وفقاً للمشاهدات المسجلة في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة). عادةً ما يقوم ببناء عشين، أو أكثر في كل منطقة، ويستخدمهما بالتناوب. وغالباً ما يستخدم العش نفسه لسنوات عدة، حتى يصبح ضخماً (أحد الأعشاش بالقرب من حائل بلغ عمقاً يتخطى المترين). **البيض المحضون:** بيضة واحدة إلى بيضتين. **الحضانة:** 43 - 45 يوماً. **مدة التعشيش:** 65 - 70 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 190 - 227 سم. **حالة الحماية:** هذا الطائر موضوع على قائمة الطيور المهددة بالانقراض إقليمياً، بسبب تراجع تعداده الذي ينخفض نتيجة التسمم والمضايقات والصيد وانحسار القاعدة الغذائية.

مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200
منطقة النشاط: محمية الملك سلمان (حرة الحرة)



عقاب مسيرة*Hieraaetus pennatus*

Booted Eagle

غير مهدد

غير معروف

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:

الحجم: 42 - 51 سم / الذكر 510 - 770 غم؛ الأنثى 840 - 1,250 غم (أثقل وزناً بنسبة 60%)



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر امتداداً من شمال غرب أفريقيا وأيبيريا وصولاً إلى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 8,000 كم باتجاه الجنوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. من المحتمل أن يكون هذا النوع من الجوارح الحوامة في المملكة مهاجراً عابراً في طريقه إلى أفريقيا عبر مضيق باب المندب في اليمن. وقد سُجلت مشاهدة واحدة، أو مشاهدتان في ديسمبر ويناير لطائرين لا يزالان يحلقان عبر المملكة عوضاً عن الزيارة في فصل الشتاء. **الموئل:** يمكن العثور على هذا الطائر الحوام فوق أي موئل أثناء هجرته.


سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى على الطيور الصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل الحمام وطيور الحجل والغربان. إضافة إلى الثدييات الصغيرة كالفوارض والأرانب البرية، وفي بعض الأحيان السحالي. يصطاد هذا العقاب الصغير النشط الفريسة من فوق الأرض، أو بين أوراق الشجر، حيث ينقض عليها من ارتفاعات عالية أو مجثمه. يتميز بسرعته ورشاقته عند الصيد. قد لا يتغذى أثناء عبوره، إذ يظهر عادةً وهو يحوم عبر المملكة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: محمية الهدا



شأنه شأن الطيور الحوامة الأخرى، يستخدم هذا النوع المهاجر من الجوارح التيارات الحرارية للارتفاع في الهواء، ومن ثم يحوم إلى الأمام بحثاً عن التيار الحراري التالي.

من 2 - 3 طيور أثناء موسم الهجرة، مع بعض الأنواع الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يوجد هذا الطائر في شكلين يتميزان بلونين مختلفين (شاحب أو داكن)، يمتلك كل منهما ريشاً متوسطاً وكثيفاً. وفي الوقت الذي تكون فيه ازدواجية الشكل الجنسي لدى الكثير من الطيور الجارحة مختلفة نوعاً ما من حيث الشكل والحجم، فإن أنثى هذا الطائر أكبر بكثير من الذكر، حتى أن أخف الإناث وزناً عادةً ما تكون أكبر من أثقل ذكر. **باع الجناح:** 113 - 138 سم.

عقاب مخططة

عقاب بونلية

Aquila fasciata

Bonelli's Eagle

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:


الحجم: 65 - 72 سم / الذكر 1,400 - 2,240 غم؛ الأنثى 2,100 - 3,025 غم (أثقل وزناً بنسبة 40%)



النطاق العالمي: مقيم مشتمت؛ يوجد في شمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا، مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى جنوب شرق الصين. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يوجد هذا الصياد الرائع في المملكة في جبال عسير والحجاز، وعلى طول محمية طويق. **الموئل:** يفضل المناطق الجبلية الوعرة والمناطق المقسمة التي تشتمل على المنحدرات والأشجار والشجيرات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتحين الفرص لاصطياد الطيور متوسطة الحجم بشكل رئيس (مثل طيور الحجل والحمام واليمام)، والثدييات (مثل الأرنب)، وذلك وفقاً لما هو متوافر محلياً.

غالباً ما يصطاد الفريسة من فوق الأرض بمهارته الفائقة، إذ يقترب من الحيوان غير المنتبه عبر الأشجار وحول الشجيرات، ثم ينقض عليه بضربة سريعة ورشيقة. كما يمكنه اصطياد الطيور أثناء الطيران بالمطاردة السريعة، علماً أن أزواجه تصطاد بالتعاون في بعض الأحيان. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام**

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الزوجين مسؤوليات بناء العش ورعاية الفراخ، وتتولى الأنثى معظم واجبات الحضانة. **العش:** قاعدة كبيرة مكونة من العيدان ومبطنة بالمواد النباتية الجميلة، ومثبتة فوق حافة، أو نتوء فوق جرف شديد الانحدار. وقد توجد أعشاش عدة في منطقة واحدة، ويستخدمها بالتناوب، أو قد يفضل تجديد العش ذاته واستخدامه لسنوات عدة متتالية. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 37 - 40 يوماً. **مدة التعشيش:** 60 - 65 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باع الجناح:** 150 - 180 سم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200

منطقة النشاط: المرتفعات الجنوبية الغربية

الوعرة



باشق قبر	الاسم العربي:
باشق عابد	الاسم العربي الآخر:
<i>Micronisus gabar</i>	الاسم العلمي:
Gabar Goshawk	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
28 - 36 سم / الذكر 90 - 173 غم؛ الأنثى 167 - 240 غم (أثقل وزناً بنسبة 55%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء حزام الغابات الاستوائية)، مع وجود تعداد صغير في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر.** يوجد هذا الطائر الصغير النشط للغاية في جنوب تهامة (جنوب القنفذة) وسفوح التلال المجاورة. **الموئل:** غابات أشجار الطلح، والغابات المكشوفة المتنوعة التي غالباً ما تكون بالقرب من المناطق الزراعية، إلى الجنوب من تهامة. كما يوجد في الوديان في سفوح التلال المجاورة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الطيور الصغيرة (حتى 80 غم)، أو متوسطة الحجم أحياناً، مثل الدجاج الحبشي والوقواق. غالباً ما يفترس أعشاش الطيور الصغيرة، مثل طيور النساج. كما يصطاد الثدييات الصغيرة والثعابين وبعض الحشرات الكبيرة. وغالباً ما يصطاد في أزواج، حيث يصطاد من خلال مباغنة الفريسة المحتملة من مخبئه بمطاردة مفاجئة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج

يفترس هذا الباشق الصغير،


الأصغر من بين جوارح

المملكة، الطيور الصغيرة

عبر مطاردها دون كلل، أو

افتراس أعشاشها، أو ملاحقتها

ببساطة عبر الغطاء الكثيف.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 250

منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى بناء العش ومعظم واجبات الحضنة، فيما يتولى الذكر جلب الطعام. كما يتشارك الأبوان في رعاية الفراخ. **العش:** قاعدة ضحلة، صغيرة نسبياً (قطرها 26 سم)، مكونة من الغصينات ومبطنة بغصينات رفيعة وجذور وأعشاب وأوراق، ومثبتة على ارتفاع يصل إلى 7 م فوق سطح الأرض في شجرة التمر الهندي، أو الطلح الشائك، علماً أنه قد يُصق القطع المتساقطة من الأنثى المعششة، أو خيوط العنكبوت بالجزء الخارجي من العش لغرض التمويه. **البيض المحضون:** 3 بيوض (الأعشاش المدروسة = 2). **الحضنة:** 33 - 35 يوماً. **مدة التعشيش:** 35 - 36 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **ملاحظة:** أنثى هذا الطائر غالباً ما تكون أكبر من الذكر (أحياناً تكون أثقل بنسبة 90% من شريكها)، الأمر الذي يحوّلها للاهتمام بفرائس مختلفة، والسيطرة جسدياً على الذكر، وتكريس المزيد من الطاقة للتكاثر. **باع الجناح:** 56-66 سم.

الباشق الحزين الترتيل	الاسم العربي:
باشق صياح داكن	الاسم العربي الآخر:
<i>Melierax metabates</i>	الاسم العلمي:
Dark Chanting-goshawk	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
42 - 50 سم / الذكر 646 - 695 غم؛ الأنثى 841 - 852 غم (أثقل وزناً بنسبة 25%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومدغشقر، إلى جانب تجمعات صغيرة منه في جنوب المغرب وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يُعرف منه خمسة أنواع فرعية، منها *M. p. ignoscens* الذي يتوطن جنوب غرب المملكة وغرب اليمن. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر.** يوجد هذا الجارح بامتياز في المملكة في سهول تهامة وسفوح التلال والسهول إلى الشرق من المرتفعات. **الموئل:** يوجد دون ارتفاع 1,900 م في الأشجار والشجيرات المتناثرة في سهول تهامة، وسفوح التلال، أو سهول الأجمة الجافة شرق المرتفعات الغربية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الفقاريات الصغيرة، بما فيها الزواحف، خاصة السحالي والثعابين والطيور (يحجم الدجاج الحبشي نفسه) والثدييات الصغيرة والضفادع. كذلك اللافقاريات الكبيرة، مثل الجراد والجنادب والخنافس. يصطاد بشكل أساسي عن طريق الانقضاض على الفريسة من مخبئه. كما يتغذى على الجيف. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:**

منفرد. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج

متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً.

الأدوار الأبوية: يتشارك كلا الزوجين

مسؤوليات بناء العش. وتتولى الأنثى

حضانة البيض ورعاية الفراخ بما يجلبه الذكر

من فرائس. **العش:** قاعدة مكونة من العيدان

ومبطنة بالحطام والروث والخرق والطين

الجاف والأحجار والأعشاب، وتكون مثبتة فوق


شجرة (بما في ذلك شجر الطلح والنخيل والتين)، وهو أحياناً يعيد استخدام العش

نفسه في السنوات التالية، رغم احتماليه بناء عش جديد في مكان قريب. **البيض**

المحضون: بيضة واحدة إلى بيضتين. **الحضنة:** 36 - 38 يوماً. **الفراخ:** تهجر الفراخ

العش وتتسلق على الفروع القريبة في غضون 35 - 43 يوماً، وتطير بعمر 50 يوماً.

الحضنة: حضنة مفردة. **باع الجناح:** 86 - 104 سم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 750

منطقة النشاط: أحد المسارحة



مرزة الدجاج	الاسم العربي:
<i>Circus cyaneus</i>	الاسم العلمي:
Hen Harrier	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
42 - 50 سم / الذكر 300 - 400 غم؛ الأنثى 370 - 708 غم (أثقل وزناً بنسبة 50%)	الحجم والوزن:




أنثى مرزة الدجاج

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في غرب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في معظم أنحاء شمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً في شمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا شرقاً، مروراً بشمال شبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى الصين واليابان. **حالته بالمملكة: زائر**

شتوي نادر. في المملكة، يُعدُّ هذا النوع من طيور الـ «مرزة»، مزدوج الشكل جنسياً، زائراً شتوياً نادراً في شمال المملكة، وهو الحد الجنوبي لنطاق وجوده في فصل الشتاء. ويُحتمل أنه يكون أكثر شيوعاً بعد فصول الربيع الرطبة. **الموئل:** المحاصيل، مثل حقول القمح المروية بالقرب من الأراضي الرطبة، أو مزارع منتجات الألبان التي تشتمل على حقول القش والكثير من القوارض لافتراسها. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: يتغذى بشكل أساس على القوارض والطيور البرية الصغيرة، إلى جانب الزواحف والبرمائيات وبعض الحشرات. ويصطاد عبر الطيران ببطء على ارتفاع منخفض، ويبدو أنه يستخدم الصوت لتحديد موقع الفريسة، ومن ثم يفاجئها بالانقضاض عليها فوق الأرض، وهو يُثبت جناحيه على شكل حرف V أثناء التحليق بعد رفرفة جناحيه لمرات عدة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً عند الصيد، وفي مجموعات عند الجثوم. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** في الإناث والطيور غير البالغة من هذا النوع، و«مرزة باهتة» و«مرزة أبو شودة» يكون ريشها بنياً بشكل أساس ووردها أبيض، على عكس اللون الأزرق الرمادي الجميل الذي تتمتع به الذكور. علماً أن التمييز بينها في هذا الجانب هو صعب إلى حد ما، وجميعها تُعرف باسم **«مرزة حلقيه الذيل»**. **باغ الجناح:** 100 - 121 سم.

تبدو أجناس هذا الطائر مختلفة تماماً، فعلى عكس الذكور الصغيرة ذات اللون الرمادي الفاتح، تتزين الإناث باللون البني الغامق، وهي أكبر بنسبة 10% وأثقل وزناً بنسبة 50%.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: تبوك




مرزة مستنقعية	الاسم العربي:
<i>Circus aeruginosus</i>	الاسم العلمي:
Western Marsh-harrier	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهديد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
43 - 54 سم / الذكر 405 - 730 غم؛ الأنثى 540 - 960 غم (أثقل وزناً بنسبة 30%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول البحر المتوسط وصولاً إلى إيران، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة امتداداً من غرب أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 - 7,000 كم إلى الجنوب من جنوب أوروبا، وفي أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والهند. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع.** يُعدُّ هذا الطائر من الجوارح شديد التنوع، مهاجراً عابراً واسع النطاق (مارس - أبريل، أغسطس - أكتوبر) عبر المملكة. وقد تزايدت أعداده في العقود الأخيرة، ويمكن رؤيته حالياً في أي أرض رطبة أثناء هجرته، والأراضي الرطبة الواسعة في الشتاء (نوفمبر - فبراير). **الموئل:** يوجد في الشتاء في الأراضي الرطبة الواسعة، حيث القصب بصورة مكثفة وأشجار المانغروف والمناطق الوعرة ذات الغطاء النباتي (شجيرات) القريبة من المياه. كما يزور حقول القمح المروية محورياً أثناء الهجرة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتحين الفرص لاصطياد الطيور والقوارض والزواحف والبرمائيات والأسماك والحشرات والجيف، علماً أنه يفضل الطيور الصغيرة، أو متوسطة الحجم، ويصطاد أثناء الطيران على ارتفاع منخفض فوق الغطاء النباتي في المستنقعات ثم ينقض فجأة

على فريسته فوق الأرض، أو في الماء. ويتسبب اقترابه في قيام الطيور الغاطسة بغمر نفسها تحت الماء، والطيور التي تتغذى على السطح بالتشتت على الفور. وعلى عكس عديد من الطيور الجارحة الأخرى، عادةً ما يطلق طائر المرزة على ارتفاع منخفض أثناء الهجرة، كما أنه يتغذى أثناء التنقل. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يصطاد منفرداً، مع إمكانية تجمع أعداد كبيرة (أحياناً تزيد على 50 طائراً) منه في الأراضي الرطبة الغنية، أو الحقول المروية محورياً في الشتاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مثل غيره من طيور المرزة، يُثبت هذا الطائر جناحيه بصورة متميزة على شكل حرف V عند الهبوط، ويتميز بتباين كبير في ألوان ريشه، إلا أن الطيور الأكبر سناً تكون شاحبة اللون بشكل عام. **باغ الجناح:** 115 - 145 سم.

على فريسته فوق الأرض، أو في الماء. ويتسبب اقترابه في قيام الطيور الغاطسة بغمر نفسها تحت الماء، والطيور التي تتغذى على السطح بالتشتت على الفور. وعلى عكس عديد من الطيور الجارحة الأخرى، عادةً ما يطلق طائر المرزة على ارتفاع منخفض أثناء الهجرة، كما أنه يتغذى أثناء التنقل. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يصطاد منفرداً، مع إمكانية تجمع أعداد كبيرة (أحياناً تزيد على 50 طائراً) منه في الأراضي الرطبة الغنية، أو الحقول المروية محورياً في الشتاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مثل غيره من طيور المرزة، يُثبت هذا الطائر جناحيه بصورة متميزة على شكل حرف V عند الهبوط، ويتميز بتباين كبير في ألوان ريشه، إلا أن الطيور الأكبر سناً تكون شاحبة اللون بشكل عام. **باغ الجناح:** 115 - 145 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل



مرزة أبو شودة

مرزة مونتجوية

Circus pygargus

Montagu's Harrier

غير مهدد

يتناقص

-

-

39 - 49 سم / الذكر 227 - 305 غم؛ الأنثى 254 - 445 غم (أثقل وزناً بنسبة 30%)

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا حتى غرب الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 9,000 كم باتجاه الجنوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند غالباً. مع تجمعات شتوية أصغر في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع، يُعدُّ هذا الطائر، مزوج الشكل، مهاجراً عابراً في المقام الأول (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر). وقد سُجل ظهور الأنواع الزائرة في الشتاء بالقرب من الرياض وجنوب تهامة، ويبدو أنها تزايدت على مدى السنوات الأخيرة، ربما يُعزى ذلك إلى وجود حقول القمح واسعة الانتشار في المملكة التي تزودها بقاعدة غذائية مناسبة. **الموئل:** الأراضي العشبية والأراضي الكبيرة المكشوفة وحقول الحبوب، لا سيما حقول القمح المروية والقش والأعلاف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الكبيرة (بما فيها الجنادب والجراد) والثدييات الصغيرة والطيور البرية الصغيرة والسحالي، وتصطادها جميعاً على الأرض أثناء تحليقها ببطء بشكل متخفٍ ومنخفض. وقد تكون الحشرات ذات أهمية خاصة بالنسبة لها في فصل الشتاء، ويعتمد هذا الطائر إلى الاحتماء بعشه أثناء هبوب الرياح. كما يصطاد على طول شريط ضيق مستقيم من الأرض من خلال مباحنة فرائسه عبر الانقضاض بشكل مفاجئ. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يتم العثور عليه منفرداً، لكن قد يمر طائران أو ثلاثة من الطيور المهاجرة في صورة متوالية وسريعة، ما يوحي بأنها تتحرك معاً، وقد توجد مجموعات أكثر تركيزاً في المناطق الموالية بشكل خاص أثناء الهجرة، على سبيل المثال شوهد ما يربو على 30 طائراً، أو أكثر في مزرعة قمح مروية في القصيم في شهر أبريل. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يوجد هذا الطائر على نحو نادر بريش أسود. **باغ الجناح:** 102 - 123 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: القصيم

**مرزة باهتة**

مرزة بغثاء

Circus macrourus

Pallid Harrier

قريب من التهدد

يتناقص

-

-

40 - 48 سم / الذكر 235 - 416 غم؛ الأنثى 402 - 550 غم (أثقل وزناً بنسبة 45%)

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر مرزة بغثاء

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر بدءاً من شمال البحر الأسود حتى غرب منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 9,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند غالباً، مع تجمعات شتوية أصغر في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع. يمكن رؤية هذا

الاسم اللاتيني لطائر مرزة

باهتة هو *Circus*، وهي كلمة

مشتقة من ميله للتخليق في

دائرة من التيارات الحرارية،

حيث يرتفع عالياً في الهواء،


ثم يخلق بأمان عبر السهول.

الطائر الجميل في المملكة في أي مكان على السهول أثناء هجرته (مارس - أبريل، سبتمبر - نوفمبر)، إلى جانب الإناث (حلقة الذيل) الأكثر شيوعاً في الربيع، وهو يمر عبر المملكة على نطاق واسع، بما يتضمن البحر الأحمر والخليج العربي. وقد سُجلت مشاهدات لأعداد قليلة في الشتاء بالمنطقة الشرقية بالقرب من الرياض وجنوب تهامة. **الموئل:** يوجد أثناء الشتاء في الأراضي

الزراعية المروية، لا سيما حقول القمح، وعند الهجرة، يفضل صحراء الأجمة المكشوفة الغنية بالأعشاب. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساس على القوارض والطيور الصغيرة، خاصة تلك التي تسكن الأراضي العشبية، مثل الفئرة والتمير. كما يتغذى على الزواحف والحشرات الكبيرة، دون الجيف. يصطاد هذا الطائر من خلال التحليق ببطء على ارتفاع منخفض، ثم ينقض على الفريسة على الأرض بشكل مفاجئ؛ علماً أن الأنواع المهاجرة العابرة تتغذى أثناء مرورها شمالاً في الربيع، ويمكن رؤيتها من أفق إلى آخر تتقدم في خط مستقيم إلى حد ما، في بحث دؤوب عن الفرائس. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** على الرغم من أنها ليست أنواعاً نباتية بشكل عام، فقد سُجل ظهور نحو 12 طائراً في المنطقة نفسها أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يُعدُّ هذا الطائر الأصغر والأكثر ضالة بين أنواع طيور الـ «مرزات» كافة، ويتميز بالطيران على شكل حرف «V»، وقد سبق وأن تمت مشاهدته يستظل تحت شجيرة من شمس الظهيرة. **باغ الجناح:** 100 - 121 سم.



أنثى مرزة بغثاء



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة


منطقة النشاط: حرض



باشق مشرقى	الاسم العربي:
<i>Accipiter brevipes</i>	الاسم العلمي:
Levant Sparrowhawk	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
30 - 37 سم / الذكر 140 - 275 غم؛ الأنثى 183 - 290 غم (أثقل وزناً بنسبة 15%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من البلقان حتى منطقة بحر قزوين، بينما يمضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً في السودان ودولة جنوب السودان، وربما شرقاً نحو اليمن. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. يهاجر هذا الباشق الجذاب شديد العزلة إلى الجنوب في أسراب كثيفة تمر عادةً نحو غرب خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث تنتقل إلى أفريقيا، ومن ثم تتجنب المملكة، ورغم ذلك، إلا أن أسراباً منه تناهز 500 طائر تهاجر جنوباً على طول طريق مائل نحو الشرق، لتتعلق عبر غرب المملكة على طول تهامة وسفوح التلال الغربية، ثم تعبر الحدود باتجاه أفريقيا عند مضيق باب المندب (اليمن). فعلى سبيل المثال، شوهد سرب يزيد على 550 طائراً أثناء هجرته فوق وادي رابغ في شهر سبتمبر عام 2013. ومن المحتمل أن تعبر طيوره على نحو بسيط من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي عبر المملكة، لذا، سُجل ظهور طيوره، مؤخراً، في دومة الجندل. **الموئل:** الغابات المكشوفة، والأجمات والحدائق في تهامة وسفوح التلال. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الكبيرة (كالجراد والجنادب والخنافس واليعاسيب)، والفقاريات الصغيرة (بما فيها السحالي والقوارض والخفافيش والطيور الصغيرة) التي يصطادها عبر مطاردة منخفضة وسريعة ورشيقة، أو يلتقطها من النباتات، أو الأرض. ويفضل أيضاً عند الصيد، حواف الغابات والمساحات الشاسعة الخالية. وقد تصطاد الأزواج والأسراب معاً أثناء الهجرة. **النشاط:** نهارى، وغسقي. وربما تطال هجرته أثناء الخريف فترات ليلية. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يوجد منفرداً، أو في أزواج، وتتسنى رؤيته عند الهجرة في أسراب دائرية كبيرة تحملها تيارات الهواء الدافئة التي تكسبها الارتفاع، ما يُمكنها من التحليق جنوباً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باغ الجناح:** 64 - 74 سم.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: وادي رابغ




باشق كستنائي	الاسم العربي:
بيدق آسيوي	الاسم العربي الآخر:
<i>Accipiter badius</i>	الاسم العلمي:
Shikra	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
25 - 44 سم / الذكر 100 - 193 غم؛ الأنثى 130 - 266 غم (أثقل وزناً بنسبة 35%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وامتداداً من إيران حتى جنوب شرق آسيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في آسيا الوسطى (من كازاخستان حتى بنغلاديش)، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم جنوب نطاق إقامته وفي الكويت. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يتكاثر هذا الجارح الصغير والمكثتر في المملكة بشكل أساس عند حافة الجرف الغربي في جبال عسير. كما يتم تسجيل ظهوره من حين لآخر لدى مروره بالمملكة، وقد تفضل بعض أفراده قضاء الشتاء. **الموئل:** يوجد على ارتفاع أعلى من 400 م في الغابات، غالباً في الوديان، وعادةً بالقرب من المياه. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على الزواحف الصغيرة بشكل أساس، بما فيها السحالي والوزغات والسقنقور والطيور والتدييات الصغيرة والضفادع والحشرات. ويصطاد بأسلوب التخفي في مجثم بين الغطاء النباتي، ثم ينطلق وراء فريسته، وهي تجري أمامه على الأرض، أو في الغطاء النباتي القريب، في مطاردة قصيرة وعنيفة يميزها عنصر المفاجأة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الزوجين

مصطاد هذا الطائر الصيد السحالي والطيور بمطاردة حادة قصيرة بدءاً من حال التخفي. وتتيح له أجنحته القصيرة بالتحليق عبر الفتحات الصغيرة في الأجمة، ثم الانقضاض على فريسته.

البيض المحضون: 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 28 - 29 يوماً. **مدة التعشيش:** 32 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **ملاحظة:** لدى هذا الطائر، البيدق الآسيوي، ناب علوي بارز بشكل ملحوظ، وتنتوء في الجزء العلوي من منقاره يستخدمه في قطع الحبل الشوكي لفرائسه. **باغ الجناح:** 48 - 68 سم.




مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ 150
منطقة النشاط: محمية ريدة



باز	الاسم العربي:
<i>Accipiter gentilis</i>	الاسم العلمي:
Northern Goshawk	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
46 - 63 سم / الذكر 517 - 1,110 غم؛ الأنثى 820 - 2,200 غم (أثقل وزناً بنسبة 85%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في معظم أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا، ومعظم أنحاء روسيا (فوق الدائرة القطبية الشمالية)، بينما يقضي جزءاً صغيراً من تعداده فصل الشتاء، على بُعد 1,000 كم جنوب نطاق تكاثره وصولاً إلى شبه الجزيرة العربية في بعض الأحيان. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. رغم انتشاره على نطاق واسع في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي، إلا أنه تم تسجيل ظهور هذا الصقر الجذاب للغاية في عدد قليل من المواقع بالمملكة، بينما كان يتجول جنوباً من نطاق تكاثره الطبيعي شتاءً. **الموئل:** يفضل المناطق المكشوفة التي تضم الأشجار والشجيرات، حيث يمكنه الاصطياد وهو في وضع التخفي مبالغاً فرائسه، بما في ذلك الحداثق. **سلوك البحث عن الغذاء:** يتغذى بشكل أساسي على الطيور، وأحياناً بعض الأنواع التي تكبره حجماً، بما في ذلك الحمام واليمام، وطيور الصيد. وفي بعض المناطق، يمثل الحمام 50% من فرائسه. كما يتغذى على القوارض



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)



باشق أوراسي	الاسم العربي:
<i>Accipiter nisus</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Sparrowhawk	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
28 - 40 سم / الذكر 105 - 196 غم؛ الأنثى 185 - 350 غم (أثقل وزناً بنسبة 80%)	الحجم والوزن:



أنثى الباشق الأوراسي


النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أوروبا وإيران والصين واليابان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 5,000 كم جنوب شرق أفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي شائع. يُعد صائد الطيور الصغيرة هذا، النشط، مهاجراً غير شائع ولكنه عابر ومنتشر (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، وزائر شتوي للمملكة أيضاً (نوفمبر - فبراير). **الموئل:** يفضل المناطق التي تحوي فسيفساء الأشجار والشجيرات وسياج نباتات، مثل الحدائق والمتنزهات والبساتين، حيث يمكنه اصطياد الجوائم الصغيرة من وضع التخفي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بالكامل تقريباً على الطيور

الصغيرة، مع تفضيل الأنواع التي تتغذى من الأرض، مثل العصافير والهُبَرَات والتمير. فيما تندر الفرائس من غير الثدييات في نظامه الغذائي، وهو بصطاد الفريسة بغتة باستخدام الغطاء النباتي لإخفاء اقترابه أثناء تحليقه على ارتفاع منخفض، علماً أن ذكوره أصغر بكثير من إناثه، وعادةً ما تصطاد في المناطق كثيفة الأشجار، ومن ثم فهي تصطاد فرائس أصغر. **النشاط:**

نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون هذا النوع منفرداً، لكن يمكن رؤية الكثير منه في المنطقة نفسها أثناء الهجرة، أو في مطلع الشتاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يطير بدفعات سريعة ورفرفة من أجنحة، أو قد يحلق في دوائر مستعرضاً أجنحته المستديرة وذيله العريض، وهو ما يحث الطيور الصغيرة على الاحتشاد في معظم الأوقات. **باغ الجناح:** 58 - 78 سم.



ذكر الباشق الأوراسي



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الرياض




البازي الحوام	الاسم العربي:
عقيب شائعة	الاسم العربي الآخر:
<i>Buteo buteo</i>	الاسم العلمي:
Eurasian Buzzard, Steppe Buzzard	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
40 - 52 سم / الذكر 427 - 1,180 غم؛ الأنثى 486 - 1,360 غم (أثقل وزناً بنسبة 15%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جميع أنحاء أوروبا وصولاً إلى شمال إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر امتداداً من شرق أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 10,000 كم جنوباً في تركيا وشرق وجنوب أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي نادر. يُعَدُّ طائر الـ «باز» هذا من الأنواع المهاجرة العابرة الشائعة عبر غرب المملكة في الخريف (سبتمبر - أكتوبر)، مع تناقص أعدادها بصورة مطردة في شرق المرتفعات. كما سُجِّل ظهور عدد قليل منه في الربيع (فبراير - مايو)، بخلاف الشمال الأقصى (شاهد 200 طائر بالقرب من جبل حشمة، و40 - 50 طائراً يومياً في جبل طويق)، ما يشير إلى أن هجرة العودة تمرّ بغرب البحر الأحمر وحول خليج العقبة، ثم تتوجه شرقاً. عادةً ما تبقى الأنواع الزائرة القليلة في فصل الشتاء بجنوب تهامة. **الموئل:** يمكن العثور على هذه الطيور الحوامة في أيّ بيئة أثناء موسم الهجرة. وتوجد على مدار الشتاء في المناطق الغنية بالأشجار والشجيرات والأراضي الزراعية والجبال المغطاة بالأجمات.

يُعَدُّ هذا الطائر البديع من الأنواع المهاجرة العابرة الشائعة، وقد سُجِّل ظهور ما يزيد على 22,000 طير منه أثناء عبورها فجوة في وادي جرف الطائف في غضون أسبوعين فقط.

بالأجمات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على القوارض، وغيرها من الثدييات الصغيرة والزواحف وبعض الطيور. كما يتغذى على الجيف. ويصطاد هذا الطائر بتابع أسلوب المراقبة من مجثم بارز، أو التحليق المرتفع، ثم الانقضاض على الفريسة على الأرض. وهو حوامة في بعض الأحيان، ويفضل التحليق بمجرد سطوع الشمس وفي درجات الحرارة الشديدة. ولا يمكنه التقدم عن طريق الطيران بالرفرفة إلا في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر بعد الظهر. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً في الشتاء، وفي أسراب أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يبدو أن جميع المشاهدات المسجلة في المملكة هي للطيور من النوع الفرعي «الشرقية» *B. b. vulpinus* الذي يُعَدُّ نوعاً متميزاً في بعض الأحيان ويُسمى «بازي حوامة» *Steppe Buzzard*، علماً أن لهذا الطائر ريشاً متغيراً للغاية. **باع الجناح:** 109 - 136 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جرف الطائف



حدأة سوداء

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:


Black Kite, Yellow-billed Kite, Black-eared Kite
غير مهدد
غير معروف
غير مهدد
مستقر (ربما يتزايد)

44 - 66 سم / الذكر 630 - 928 غم؛ الأنثى 750 - 1,080 غم (أثقل وزناً بنسبة 15%)
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وباكستان وصولاً إلى أستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر امتداداً من شمال أفريقيا وغرب أوروبا حتى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً ضمن نطاق وجوده بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي شائع. هناك ثلاثة أنواع منه فرعية في المملكة العربية السعودية، وهي: *M. p. migrans* و يوجد في نطاق واسع أثناء الهجرة وفي فصل الشتاء، و *M. p. lineatus* زائر شتوي نادر إلى الشرق، و *M. aegyptius* (و يُعَدُّ أنواعاً متميزة في بعض الأحيان ويُطلق عليها اسم الحدأة الصفراء *Yellow-billed Kite*)، وهو مقيم متكاثر في الجنوب الغربي. **الموئل:** المدن والقرى، لا سيّما مكب النفايات والأسواق ومناطق التنزه وحتى الشوارع المزدهمة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: متعايش للغاية مع البشر، حيث يقطن من مكبات النفايات والمقاصب ومصائد الأسماك وأماكن تجمعاتها، وحيثما توجد نفايات الطعام. كما يتغذى على الفقاريات الصغيرة والحشرات الكبيرة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يشكل مجموعات في مواقع الرعي الغنية. وسُجِّل ظهور المئات منه أثناء موسم الهجرة في تبوك. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة

مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش منفردة، أو في مستعمرات صغيرة متفرقة تضم حتى 10 أزواج. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الزوجين مسؤوليات بناء العش، وتتولى الأنثى معظم واجبات الحضانه ورعاية الفراخ. ويشترك الأبوان أيضاً، في إحضار الطعام، وفي حال وفر الذكر طعاماً كافياً، فقد لا تصطاد الأنثى أثناء محاولة التكاثر. **العش:** قاعدة مكونة من عيدان ومبطنه بأوراق الشجر والورق والجلد والأكياس البلاستيكية، ومثبتة على ارتفاع يزيد على 5 م فوق سطح الأرض في شجرة ما (خاصة الكافور أو النخيل) أو فوق أعمدة الهواتف، أو أبراج الكهرباء، أو المباني. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 26 - 38 يوماً. **مدة التعشيش:** 42 - 50 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باع الجناح:** 120 - 153 سم.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ 10,000
منطقة النشاط: تبوك


أبو معول	الاسم العربي:
نساف أرمذ أفريقي	الاسم العربي الآخر:
<i>Lophoceros nasutus</i>	الاسم العلمي:
African Grey Hornbill	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
45 - 51 سم / الذكر 172 - 258 غم؛ الأنثى 163 - 215 غم (أثقل وزناً بنسبة 15%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** يمكن العثور على هذا الطائر البديع الذي يُظهر بعضاً من أروع سلوكيات التعشيش لأي طائر في العالم، في تهامة وسفوح التلال جنوب جدة. **الموئل:** يعيش بشكل رئيس على سفوح التلال دون ارتفاع 1,000 م، وحتى مستوى سطح البحر أحياناً في تهامة، حيث الوديان المشجرة والتلال الغنية بالنباتات وغابات الطلع وحقول المحاصيل متناثرة الأشجار. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، لا سيما الجراد والخنفسا والسرعوف والحشرات القشرية التي يلتقطها عادةً من الأشجار، وفي بعض الأحيان الفقاريات الصغيرة والبيض، والفراخ والفاكهة والبيذور. **النشاط: نهارى. السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج، أو مجموعات عائلية، أو أسراب صغيرة مؤلفة من 20 طائراً. **سلوك التكاثر:**

لحماية سلالته، تستخدم الأنثى الطين لإخفاء نفسها داخل تجويف العش في أي شجرة. وعلى مدار الأسابيع العشرة التالية، يناولها شريكها الطعام عبر فتحة ضيقة.

نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، ذات قدرة فائقة في الدفاع عن أعشاشها. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى مسؤولية حماية العش عبر حبس نفسها داخل تجويف العش باستخدام الطين والطعام والفضلات، تاركة فتحة رأسية ضيقة يمكن من خلالها أن تبرز طرف منقارها، فيما يجلب الذكر قشرة اللحم وأوراق الشجر الجافة لتبطين العش. وتتولى الأنثى واجبات حضن البيض وإطعام الفراخ، بينما يناولها الذكر الطعام عبر الفتحة المشار إليها سابقاً، علماً أن الأنثى تغادر العش عندما تبلغ الفراخ سن 3 إلى 5 أسابيع، لتساعد في جلب الطعام. **العش:** تجويف يوجد على ارتفاع يزيد على مترين فوق سطح الأرض في شجرة قديمة (أو ربما في شق بين الصخور، وفقاً لما هو مسجل في أماكن أخرى). **البيض المحضون:** 2 - 5 بيوض. **الحضانة:** 24 - 26 يوماً. **مدة التعشيش:** 43 - 49 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,500

منطقة النشاط: وادي ريداء




البازي طويل الساق	الاسم العربي:
سقاوة	الاسم العربي الآخر:
<i>Buteo rufinus</i>	الاسم العلمي:
Long-legged Buzzard	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
44 - 66 سم / الذكر 590 - 1,281 غم؛ الأنثى 945 - 1,760 غم (أثقل وزناً بنسبة 45%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه امتداداً من شمال أفريقيا حتى أفغانستان، وتنتشر في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر امتداداً من اليونان حتى كازاخستان، بينما يشتهي على بُعد 4,000 كم جنوباً في شرق أفريقيا، وامتداداً من العراق حتى بنجلاديش. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر محدود، زائر شتوي غير شائع.** يوجد طائر البازي طويل الساق القوي على نطاق واسع أثناء الهجرة وفي الشتاء (سبتمبر - أبريل)، ويتكاثر في المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى والمرتفعات الجنوبية الغربية. **الموئل:** يتكاثر في الصحارى المكشوفة والجبال المعزولة بالمنطقة الشرقية، والمنحدرات والوديان في المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يقطن

في الأراضي الزراعية خلال فصل الشتاء، بما في ذلك حقول القش. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الثدييات الصغيرة والزواحف (بما فيها الضب) والطيور الصغيرة والحشرات الكبيرة، مثل الجراد والجنادب والخنفسا. ويعمد إلى مسح الأرض لفترات طويلة انطلاقاً من مجثم، أو يخلق مرتفعاً.

ثم ينقض على الفريسة. **النشاط: نهارى. السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الزوجين مسؤوليات بناء العش ورعاية الفراخ. وتتولى الأنثى معظم واجبات الحضنة. **العش:** قاعدة مكونة من عيدان، ومبطنة بالعشب والخزق والحبال والصوف والأكياس البلاستيكية، وتثبت عادةً على ارتفاع يراوح بين 5 - 8 م فوق سطح الأرض في تجويف، أو نتوء على منحدر، أو في أحيان قليلة على شجيرة، أو صخرة منخفضة، أو على الأرض على كتيب رملي، أو تل في الصحراء المكشوفة. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 28 يوماً. **مدة التعشيش:** 45 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **ملاحظة:** هذا الطائر متعدد الأشكال إلى حد بعيد، ويظهر تبايناً كبيراً في خصائص الريش بين أفرادها. **باج الجناح:** 126 - 155 سم.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 700

منطقة النشاط: حرض



رورار أبيض الزور	الاسم العربي:
قارية صدراء	الاسم العربي الآخر:
<i>Merops albicollis</i>	الاسم العلمي:
White-throated Bee-eater	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
20 سم / 32 - 20 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في المناطق الساحلية بأفريقيا (من موريتانيا حتى إريتريا)، وفي جنوب غرب شبه الجزيرة العربية (جنوب غرب المملكة وغرب اليمن)، بينما يقضي فصل الشتاء بأكمله على بُعد 1,500 كم إلى الجنوب من جنوب وغرب أفريقيا (من ليبيريا حتى أوغندا). **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر. يتكاثر هذا الـ «رورار» الجذاب في الجنوب الغربي على جانبي المرتفعات، ويهاجر فوق البحر الأحمر. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات دون 1,600 م ضمن مناطق شجيرات الطلح الجافة، أو الوديان، أو المناطق الزراعية ذات السواتر الترابية والأشجار المتناثرة. كما

يوجد في ضواحي القرى. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على النمل ونحل العسل وأي حشرات أخرى طائرة يمكنه التقاطها في الهواء في مطاردات مضيئة من مجثمه، أو أثناء تحليقه المستمر، وهو يسيطر على الحشرات اللاسعة بضربها على المجثم، ثم فرك بطنها لإزالة الإبرة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في أزواج، أو مجموعات عائلية، أو أسراب تتألف من 50 طائراً كحد أقصى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** مجموعات متكاثرة تعاونية، عادةً بوجود مساعد واحد، أو خمسة طيور مساعدة في بعض الأحيان، تعيش في مستعمرات حرة تضم 5 - 30 زوجاً مع أعشاش منتشرة على مساحة واسعة. **الأدوار الأبوية:** يساعد

بعد الهجرة إلى المملكة من أفريقيا، تشكّل هذه الطيور الجميلة مستعمرات تكاثر حرة تناهز أعدادها 50 زوجاً، ويحتوي كل عش على زوج متكاثّر إضافة إلى نحو خمسة من الطيور المساعدة.



مهاجر متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,000
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

هدهد أوراسي	الاسم العربي:
<i>Upupa epops</i>	الاسم العلمي:
Common Hoopoe, Hud Hud	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
19 - 32 سم / 46 - 90 غم	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في معظم أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا، بما فيها شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في معظم أنحاء أوراسيا المعتدلة، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً ضمن نطاق وجوده. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. من الرائع أن تكون إحدى الطيور المذكورة في القرآن الكريم منتشرة على نطاق واسع داخل المملكة، إذ يوجد هذا الطائر الذي لا تخطئه العين وذو الشعبية الهائلة، على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة مقيماً متكاثراً أثناء موسم الهجرة (فبراير - أبريل، أغسطس - أكتوبر) وعلى نحو متزايد في فصل الشتاء. **الموئل:** يفضل المناطق المكشوفة متناثرة الأشجار، وغالباً ما يكون قريباً من موئله، بما في ذلك أماكن الزراعة التقليدية والمروج والحدائق والمنتزهات والطرق

يمكن تقييم صحة الهدهد من خلال مرات هدهدته؛

فالتائر الذي يصيح «هد هد... هد هد» لا يكون بصحة جيدة مثل الطائر الذي يصيح «هد هد هد... هد هد هد».

وأحياناً الفقاريات الصغيرة التي يلتقطها عبر حفر الأرض وسبر وقلب الأحياء اللينة. **النشاط:** نهاري. ويمكن أن يهاجر ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً (رغم أن 10% من الحضنات تضم فراخاً من نسل ذكور مختلفة أحياناً). **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن منطقة السيادة ويجلب الطعام، بينما تتولى الأنثى حضن البيض. ويشارك كلا الأبوين في رعاية الفراخ. **العش:** شق مبطن بالحمام، أو في بعض الأحيان بطانة متناثرة من النباتات أو الريش، وعادةً ما يكون ذلك في تجويف شجرة بارتفاع يصل إلى 40 م فوق سطح الأرض، أو في أحيان قليلة بين الصخور في جرف، أو بئر، أو جدار، أو سقف، أو صندوق تعشيش. **البيض المحضون:** 5 - 7 بيوض. **الحضانة:** 15 - 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 26 - 29 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.




مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 30,000
منطقة النشاط: الظهران

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

وروار أزرق الخد	الاسم العربي:
قارية زرقاء الخدين	الاسم العربي الآخر:
<i>Merops persicus</i>	الاسم العلمي:
Blue-cheeked Bee-eater	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
31 سم / 38 - 56 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الغربي، ومن دلتا النيل حتى كازاخستان وشمال غرب الهند، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 7,000 كم في جنوب وجنوب غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع. يوجد هذا البهلوان الجوي على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء الهجرة (مارس - مايو، سبتمبر - نوفمبر)، ويتكاثر بشكل غير منتظم، مع وجود سجلات لتكاثره بالقرب من الرياض، وربما بالقرب من تبوك. **الموئل:** المناطق التي يكثر فيها الحشرات الطائرة، مثل الأراضي الرطبة والمناطق الزراعية، وهو يجثم في الأشجار الطويلة والشجيرات ويتكاثر بالقرب من المياه المحاطة بالقصب وأشجار الطرفاء والرمل، أو التربة المناسبة لحفر جحور العيش. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** النحل والدبابير والنمل واليعسوب والفراشات الملتقطة خلال مطاردة طويلة من مجثم، ما، ويُخضع الحشرات اللاسعة عن طريق ضرب الفريسة على المجثم، ثم يفرك البطن لإزالة الإبرة. **النشاط:** نهاري، وغالباً ما يهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج، أو في مجموعات من 10 - 20 طائراً أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وربما يتكاثر بعضها بشكل تعاوني رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حفر العيش والدفاع عنه، وخصن البيض، ورعاية الفراخ، علماً أن الإناث وحدها هي من تتولى الحضنة ليلاً. **العش:** حجيرة دائرية غير مبطنة في نهاية نفق بطول يراوح بين متر واحد إلى ثلاثة أمتار، ومحفورة في أرض مستوية، أو مائلة، أو على ضفاف رملية شديدة الانحدار، علماً أنه يفضل حفر نفق جديد لكل محاولة تعشيش. **البيض المحضون:** 4 - 8 بيوض. **الحضنة:** 23 - 26 يوماً. **مدة التعشيش:** 30 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: سبخة الفصل

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

وروار أخضر عربي	الاسم العربي:
قارية خضراء	الاسم العربي الآخر:
<i>Merops cyanophrys</i>	الاسم العلمي:
Arabian Green Bee-eater	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
18 سم / 15 - 20 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة واليمن، مع وجود تعداد صغير في الأردن وفلسطين. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يُعدُّ هذا الطائر الفائق الجمال، أحد أكثر الأنواع المتوطنة واسعة الانتشار، أو شبه المتوطنة في منطقة شبه الجزيرة العربية، وقد تم التعرف إلى نوعين فرعيين منه: الأول *M. c. cyanophrys* ويوجد في الأردن وفلسطين، وفي غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية، والثاني *M. c. muscatensis* يوجد وسط المملكة، وفي شرق اليمن وسلطنة عُمان. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات دون 2,800 م، حيث تكثر الحشرات الطائرة بوصفها غذاءً، والضفاف شديدة الانحدار لحفر جحور العيش، بما في ذلك الوديان الصخرية ذات أشجار الطلح المنتشرة، والحدائق والحقول الزراعية والسهول الساحلية والتلال. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على الحشرات الطائرة، بما فيها النحل والدبابير والذباب واليعاسيب والبعث والجنادب والخنافس التي يلتقطها في الجو بعد مطاردة مضيئة من مجثم، وهو يسيطر على الحشرات اللاسعة عن طريق ضرب الفريسة على المجثم، ثم فرك بطنها لإزالة الإبرة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج، أو في مجموعات من 10 - 20 طائراً أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، ربما يتكاثر بعضها بشكل تعاوني مع مساعد واحد (كما هو شائع في هذا الجنس)، على الرغم من عدم وجود سجلات تؤكد ذلك. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حفر العيش والدفاع عنه وخصن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حجيرة دائرية غير مبطنة (قطرها 150 ملم) في نهاية نفق بطول 1 - 2 م (قطره 60 - 65 ملم)، ومحفورة أفقياً في ضفة ترابية، أو رملية، علماً أنه يحفر نفقاً جديداً لكل محاولة تعشيش. **البيض المحضون:** 5 بيوض (4 - 7 بيوض في الأنواع المماثلة. الأعداش المدروسة = 1). **الحضنة:** غير معروفة (18 - 21 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (30 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.

تُعدُّ مشاهدة وروار

مزخرف بمثابة حلم يتحقق

لمراقبي الطيور، فهو يقف

بشكل علني فوق مجثم بارز،

وغالباً ما يسند خده على خد

شريكته، ويصدر أصواتاً كما

لو كان يطلب تصويره.


مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 75,000
منطقة النشاط: بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي في صيبيا

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

شقراق هندي	الاسم العربي:
<i>Coracias benghalensis</i>	الاسم العلمي:
Indian Roller	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
30 - 34 سم / 166 - 176 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم مشتمت؛ يوجد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ومن جنوب العراق وإيران حتى بنجلاديش، مع تجول عديد منه في شرق شبه الجزيرة العربية أثناء فصل الشتاء، وربما في الهند. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. عادة ما يصل هذا الطائر النادر ذو الريش الفزحي الأزرق إلى المملكة في فصل الشتاء. وقد سُجلت جميع مشاهداته في الجزء الشرقي من المملكة، حيث تظل طيوره غالباً ليوم واحد فقط، أو أسبوع. ومع ذلك، فقد فضلت بعض طيوره البقاء لأشهر عدة بالقرب من الرياض وبقية. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات دون 1,000 م في البيئات البشرية المعدلة التي تحتوي على المياه والكثير من الأشجار، مثل بساتين التمر ومنتزهات المدن والمزارع والمناطق السكنية. **سلوك البحث عن الغذاء:**



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الهفوف



وروار أوروبي	الاسم العربي:
قارية أوروبية	الاسم العربي الآخر:
<i>Merops apiaster</i>	الاسم العلمي:
European Bee-eater	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
28 سم / 44 - 78 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب أفريقيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا حتى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 - 8,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي من أفريقيا بشكل رئيس. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع. يوجد هذا الـ «وروار» الزاهي على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء الهجرة (مارس - مايو، أغسطس - نوفمبر)، وفي فترات الذروة في أبريل وسبتمبر. وقد يتكاثر من حين لآخر في شرق وشمال شرق المملكة، حيث تقضي الأزواج فصل الصيف في بعض الأحيان. **الموئل:** أماكن انتشار الحشرات الطائرة بشكل واسع، بما فيها بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات والحقول الزراعية والحدائق ومحاصيل الأعلاف والغابات الخفيفة. ويفضل التكاثر في المناطق التي تحوي رمالاً، أو ضفافاً ترابية مناسبة لحفر جحور العش. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على النحل، وأبي حشرة طائرة أخرى تقريباً، والتي يلتقطها بمطاردة قصيرة من مجثم ما، أو أثناء التحليق بصورة مستمرة لفترات طويلة، وهو يسيطر على الحشرات اللاسعة بضربها على المجثم، ثم فرك بطنها لإزالة الإبرة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يطير في أسراب، وعادةً تضم أسرابه من الطيور

المهاجرة ما بين 10 - 20 طائراً، ولكن سُجلت مجموعات منتظمة تضم أكثر من 100 طائر. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وقد يتكاثر بعضها بشكل تعاوني بمعاونة مساعد واحد الذي يكون أحد أبناؤها من السنة السابقة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حفر العش والدفاع عنه وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حجرة دائرية غير مبطنة في نهاية نفق بطول 1 - 3 م، ومحفورة في ضفة رملية. علماً أنه يحفر نفقاً جديداً لكل محاولة تعشيش. **البيض المحضون:** 5 - 8 بيوض. **الحضانة:** 20 يوماً. **مدة التعشيش:** 25 - 30 يوماً. **الحضانة:** حضانة مفردة.

مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: الظهران



شقراق أوروبي*Coracias garrulus*

European Roller

غير مهدد

يتناقص

قريب من التهديد

مستقر (يتناقص احتمالاً)

31 - 32 سم / 127 - 160 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:


حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: حرض



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا وصولاً إلى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 8,000 م باتجاه الجنوب وجنوب غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع.

يُعدُّ هذا الـ «شقراق» الزاهي مهاجراً عابراً شائعاً ومنتشراً (أواخر أبريل، أغسطس -

سبتمبر) في جميع أنحاء المملكة، وعادةً ما يوجد في مجموعات تتألف من 20 طائراً.

الموئل: أيُّ موئل مكشوف بمجاثم بارزة، مثل أعمدة الهواتف، أو كابلات الكهرباء، أو

الشجيرات الطويلة، والتي يمكنه استخدامها للتفتيش عن الفرائس. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: اللافقاريات الكبيرة التي تعيش على الأرض، مثل الخنافس والجراد والجنادب والزيزيات والفراشات واليعاسيب والنحل ومثويات الأرجل (الحريشات)

والعناكب والعقارب والديدان. وكذلك الفقاريات الصغيرة، مثل الثعابين والسحالي والضفادع. في الواقع، يتغذى هذا الطائر على أي حيوان يمكنه التقاطه وحمله بمنقاره

المدبب. كما يقتات على بعض أنواع الفاكهة والتوت. وينقض هذا الطائر على فرائسه من مجثمه ويلتقطها، ثم يعود إلى المجثم نفسه، أو إلى أي مكان قريب، يضربها مرات

عدة، ثم يبتلعها بالكامل، وهو صياد جوي للفرائس أيضاً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** تم تسجيل ظهوره منفرداً، وضمن مجموعات صغيرة مؤلفة من 20 طائراً

أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** في فصل الربيع، يقوم هذا الطائر أحياناً بأداء عروض تودد مذهلة، حيث تطير أفرادها عالياً في الهواء، ثم تهوي نحو الأرض بحركات دراماتيكية.

من عجائب هذا الطائر ظهوره

باللون الرمادي تقريباً أثناء

جثومه، وباللون الأزرق عندما

يطير. وهو مشهد يحبس

الأنفاس، وأشبه بالسحر.

شقراق حبشي*Coracias abyssinicus*

Abyssinian Roller

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر

28 - 31 سم / 100 - 140 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب المناطق الساحلية بأفريقيا (من السنغال وليبيريا حتى إثيوبيا وكينيا)، وجنوب غرب المملكة العربية السعودية وغرب اليمن، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في منطقة الساحل، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 300 كم جنوباً ضمن نطاق وجوده. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يتكاثر هذا الـ «شقراق» الرائع، ذو اللون الأزرق والضارب إلى الصفرة وأشرطة الذيل الطويلة، في جنوب تهامة وجنوب الوسطة بالمملكة العربية السعودية. **الموئل:** عادةً يوجد بالقرب من مستوى سطح البحر، وعلى ارتفاع يناهز 800 م في سفوح التلال، حيث المناطق الزراعية المكشوفة والحدائق المشجرة والأغطية النباتية من الشجيرات المتناثرة هنا وهناك. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على الحشرات الكبيرة، بما فيها الصراصير والجراد والخنافس واليرقات التي يعمد إلى اصطيادها بعد مراقبتها من مجثمه فوق شجرة، أو كابل، أو سقف، ثم ينقض على الفريسة على الأرض، وأحياناً يقفز بشكل سيئ بعد ذلك. ويتبع فرائسه كاملة بعد القبض عليها في منقاره، أو يعود إلى مجثمه لتمزيق الفرائس الأكبر.

تُعدُّ أشرطة الذيل الطويلة

وسيلة لجذب الشريك،

لكونها تشكّل عائقاً حركياً

في الجو، ولا يتأتى سوى

للطيور الأكثر صحة والتغلب

على مشكلة الطيران بمثل

هذه الأشرطة.

كما يمسك بعض الحشرات على جناحه.

النشاط: نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً

ما يكون منفرداً أو في أزواج، رغم أنه غالباً

ما يجتمع مع 20 طائراً في مواقع الرعي

الغنية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج:

أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً.


الأدوار الأبوية: غير معروفة. **العش:** تجويف

غير مبطن، أو مبطن بكمية ضئيلة من

المواد النباتية، ومثبت على ارتفاع 3 - 8 م فوق سطح الأرض في شجرة أو مبنى،

أو في بعض الأحيان في تلال النمل الأبيض. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:**

غير معروفة (نحو 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (30 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** غير معروفة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 800

منطقة النشاط: صبيا



رفراف أبقع*Ceryle rudis*

Pied Kingfisher

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

يتناقص

25 سم / 68 - 110 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والهند والصين وجنوب شرق آسيا. أما التعدادات المشتتة فتوجد حول شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى طول الأنهار الكبرى في الشرق الأوسط، فيما يتجول أحياناً على مسافة 1,000 كم باتجاه الجنوب إلى شبه الجزيرة العربية خلال فصل الشتاء. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي محدود. يوجد هذا الـ «رفراف» الأسود والأبيض المتميز بشكل رئيس في المنطقة الساحلية من الخليج العربي. ولكن سُجل ظهوره في المواقع الداخلية، بما في ذلك بقيق والرياض وسكاكا. **الموائل:** الموائل ذات المياه المالحة، أو قليلة الملوحة، بما في ذلك غابات المانغروف ذات المياه المكشوفة والبحيرات الساحلية المحمية والموانئ؛ كما أنه يتفادى البحار المكشوفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى غالباً على الأسماك ومجموعة من الحيوانات الأخرى، بما فيها البرمائيات والقشريات والحشرات. والطريقة المعتادة التي يتبعها لصيد الأسماك هي مراقبتها من مجثم مكشوف فوق الماء، ثم يغطس بقوة. وقد يُرى أيضاً، وهو يطير على ارتفاع منخفض تماماً فوق سطح الماء، وفجأة ينخفض ويغطس في الماء، علماً أنه لا يصطاد بعيداً عن الشاطئ؛ ويلتقط فرائسه كافة من الماء تقريباً، على الرغم من أنه قد يصطاد الفريسة أحياناً أثناء الطيران. وقد يلتقط الحشرات من الأرض، أو النباتات. وربما يبتلع فرائس صغيرة أثناء الطيران، لكنه غالباً ما يقوم بضرب الأسماك الكبيرة في مجثم ثم يبتلعها. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يصطاد بمفرده، غير أنه بالإمكان العثور عليه في أوقات أخرى ضمن مجموعات اجتماعية صغيرة يصل عددها إلى ستة طيور، والتي يمكن أن تكون صاخبة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** غالباً ما يرفرف بذيله عندما يكون قلقاً، وربما ينصب عرقه. كما يتميز الذكر بشريطين أسودين على الصدر، والأنثى بشريط واحد.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** خليج القطيف

يمتاز هذا الرفراف الساحر،

بلونه الأسود والأبيض،

بأنه صياد ماهر للغاية،

ويصطاد في المتوسط

سمكة من كل ست سمكات

يعمد إلى صيدها في عشر

محاولات غطس.

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا، وامتداداً من بحر قزوين مروراً بالهند ووصولاً إلى اليابان واندونيسيا. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر امتداداً من شرق أوروبا حتى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب ضمن نطاق وجوده. وكذلك يتكاثر في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وإيران. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي شائع، مهاجر متكاثر محتمل. سُجل ظهور هذه الجوهرة الصغيرة بشكل أساس على اعتبار أنه طائر مهاجر عابر، لا سيما في فصل الخريف (سبتمبر - نوفمبر)، مع بقاء بعض تعداداته لقضاء الشتاء (حتى أبريل). ويوجد بأعداد كبيرة على ساحل الخليج، وهو غير شائع، لكنه منتظم في البر الداخلي وصولاً إلى الرياض، بينما يخلو ساحل البحر الأحمر، جنوب جدة، منه تماماً، علماً أن المشاهدات الصيفية المنتظمة في ينبع تشير إلى أنه قد يتكاثر هناك من حين لآخر. **الموائل:** المياه العذبة المكشوفة والمواقع الساحلية، بما فيها الموانئ، وغابات المانغروف والأخوار الساحلية والمنحدرات الصخرية، أو المرجانية. كما يوجد في بساتين التمر التي تشتمل على برك صغيرة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى في الغالب على الأسماك، إضافة إلى الحشرات المائية واليرقات والضفادع الصغيرة والقشريات. ويبحث بشكل مطول أحياناً على ارتفاع يصل إلى متر واحد فوق سطح المياه، ثم يغوص في الماء مع بضع رפרفات قوية، حيث يغمر نفسه كلياً ويلتقط فريسته بمنقاره، ويطير عائداً إلى مجثمه، وهو يمسك الفريسة من ذيلها ويضربها في المجثم، ثم يبتلعها من رأسها. كما يغوص من حين لآخر من وضع التحليق ملتقظاً فرائسه من السطح، إلى جانب الحشرات الطائرة أيضاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** لا يمكن مشاهدة هذا الطائر الخجول سوى مرة واحدة. ويمتاز أسلوب طيرانه بالسرعة والاستقامة، حيث يعلق على ارتفاع منخفض فوق الماء مع رפרفة جناحيه، اللذين يحدثان طنيناً.

يغطس هذا الطائر ذو اللون

الأزرق، البراق بشكلٍ حاد في

المياه من ارتفاع 1 - 2 م، حيث

يصطاد الأسماك الصغيرة

بالقرب من سطح المياه، ثم

يعيدها إلى مجثمه ليلتلعها

من رأسها.

مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجل تكاثره (مع إمكان حدوثه)
منطقة النشاط: الجبيل



رفراف أرصد

Halcyon smyrnensis
White-throated Kingfisher

غير مهدد
يتزايد
غير مهدد
مستقر

27 - 28 سم / الذكر 85 - 88 غم؛ الأنثى 110 غم (أثقل وزناً بنسبة 25%)

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ يوجد في المناطق الساحلية امتداداً من شرق البحر المتوسط والعراق وصولاً إلى جنوب الصين واندونيسيا، فيما تتجول بعض أفرادها من نطاق وجودها حتى 1000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي نحو شبه الجزيرة العربية.

حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شديد الندرة، زائر شتوي محدود. عادةً ما يصل الطائر الملون الكبير إلى المملكة العربية السعودية في الشتاء (سبتمبر - مارس). وقد سُجِّل ظهور أزواج منه في فصل الصيف بالمنطقة الشرقية. كما سُجِّل تكاثره مؤخراً، بالقرب من الرياض. **الموتل:** يفضل الشواطئ والموانئ والأراضي الرطبة التي تتوافر بها أعواد القصب، ومصبات مياه الصرف الصحي، والمناطق الزراعية التي تضم قنوات التصريف والأشجار (وليس بالضرورة التي تحوي مصادر المياه).

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى على الحشرات وسرطان البحر والأسماك والبرمائيات والزواحف الصغيرة والقوارض، وهو من الطيور المفترسة التي تجلس وتراقب فريستها، ويقضي أكثر من نصف ساعات نهاره في التفتيش عنها من مجتمه، حيث يغوص أولاً في المياه بزواوية 45 درجة، أو يقدمه أولاً في المياه الضحلة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، رغم العثور على 10 - 15 طائراً معاً في سبخة الفصل. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حفر العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** حجرة في نهاية نفق (بطول 30 - 150 سم، وعرض 6 - 8 سم) محفورة في ضفة أرضية شديدة الانحدار. **البيض المحضون:** 5 - 6 بيوض. **الحضانة:** 18 - 20 يوماً. **مدة التعشيش:** 26 - 27 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)



رفراف أرمذ الرأس

Halcyon leucocephala
Grey-headed Kingfisher

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
غير معروف

22 سم / 35 - 61 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 300 كم باتجاه الجنوب في نطاق وجوده بأفريقيا. وقد تم التعرف إلى خمسة أنواع فرعية منه، بما في ذلك *H. l. semicaerulea* الذي يتكاثر فقط في جنوب غرب المملكة العربية السعودية واليمن، وغرب سلطنة عُمان. ويبدو أنه يقضي فصل الشتاء أيضاً، في الصومال. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع. يهاجر هذا الـ «رفراف» متعدد الألوان عبر البحر الأحمر وصولاً إلى المملكة للتكاثر في الجنوب الغربي من مكة. **الموتل:** يوجد على ارتفاع دون 2,300 م في سفوح التلال والمرتفعات، في شجيرات الطلح السميكة، وحواف الغابات، والمناطق ذات الغطاء النباتي من الشجيرات حول الحقول المزروعة، وغالباً بالقرب من المجاري المائية والمستنقعية، وهو يوجد في تهامة، ولكن ربما لا يتكاثر هناك. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، لا سيما الجراد والجنادب، وكذلك العنكب والعقارب والسحالي الصغيرة وغيرها من الفقاريات الصغيرة. يصطاد بالترقب من مجتمه، ثم ينقض بشكل مفاجئ

على الفريسة في الأسفل. **النشاط:** نهاري.

السلوك الاجتماعي: يوجد منفرداً، أو

في أزواج، أو في مجموعات مهاجرة صغيرة

مكونة من 10 طيور. **سلوك التكاثر:** نظام

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية

الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك

الزوجان مسؤوليات حفر نفق العش ورعاية

الفراخ، أما أدوار الحضنة الخاصة بهما فغير

معروفة. **العش:** حجرة مبطنة بألياف

نباتية خشنة في نهاية نفق (طوله 40 - 100 سم)، وتكون محفورة أفقياً في ضفة

رملية، أو طمي، وغالباً ما تكون في الجانب المتأكل من الوادي. **البيض المحضون:** 2 -

4 بيوض. **الحضانة:** 20 يوماً. **مدة التعشيش:** 21 يوماً. **الحضنة:** غير معروفة.

انطلاقاً من أفريقيا عبر البحر


الأحمر، يطير كل عام نحو

1,500 زوج من هذا الطائر

الملون للتكاثر في جنوب غرب

المملكة، ما يجعله الـ «رفراف»

الأكثر شيوعاً فيها.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,500

منطقة النشاط: وادي ريداء



لواء أوراسي*Jynx torquilla*
Eurasian Wryneck

غير مهدد

يتناقص

-

-

الحجم والوزن: 16 - 17 سم / 30 - 50 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في مختلف أنحاء أوروبا القارية، والنصف الجنوبي من روسيا وصولاً إلى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 7,000 كم باتجاه الجنوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وابتداءً من الهند حتى جنوب شرق آسيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. يُعدُّ هذا الطائر الذي يبدو غريباً بحركات عنقه غير المألوفة، مهاجراً نادراً، وعابراً منتشراً (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر) في الوقت ذاته، حيث ينتقل عبر المملكة منفرداً على نطاق واسع. **الموئل:** يفضل الأماكن المشجرة وفيرة الظلال، مثل الطرق الدائرية والحدائق والمنتزهات، ولكن يمكن أن يظهر في أي مكان على طول طريق هجرته، حتى الكثبان الرملية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على النمل رغم أنه يصطاد اللافقاريات الأخرى، بما فيها البق والخنافس والفراشات والذباب والعناكب، وهو يتغذى أيضاً، على الأعلاف التي يلتقطها من الأرض. ويمكن مشاهدته ينقر أوراق الشجر

بالرغم من أنه عضو في عائلة نقارات الخشب، فإن هذا النوع لا يتنقل بين الغابات بحثاً عن الطعام، وإنما يفضل التقاط النمل من الأرض.

المتساقطة بكل هدوء، أو يقفز على العشب، لا سيما في الصباح المبكر، أو في وقت متأخر بعد الظهر. كما يقوم هذا الطائر بحفر ثقوب في مستعمرات النمل بمنقاره، ويدخل لسانه الطويل اللزج لاستخراج النمل، أو سحب الحشرات من الشقوق. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** من الصعوبة بمكان ملاحظة هذا الطائر، ومن السهولة إغفاله كعضو في عائلة نقارات الخشب. فهو يجثم، ويعتمد على تمويهه الممتاز لدى استشعار الخطر، وفي تلك الأوقات قد يحول عنقه ورأسه إلى أوضاع غريبة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جدة**رفراف مطوق***Todiramphus chloris*
Collared Kingfisher

غير مهدد

يتناقص

مهدد بالانقراض

يتناقص

الحجم والوزن: 23 - 25 سم / 51 - 100 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد على طول سواحل جنوب البحر الأحمر (السودان، والصومال، وإريتريا، والمملكة، واليمن)، مع انتشار تعدادات منه في كل من سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والهند، وعبر جنوب شرق آسيا وصولاً إلى أستراليا وفيجي. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. يوجد هذا الـ «رفراف» الساحر، بلونيه الأزرق والأخضر الزمردى، في الجنوب الغربي وجنوب الليث. **الموئل:** غابات المانغروف الأسود التي تنتشر بها الأشجار القديمة بتجاويف الأعشاش المناسبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على القشريات، خاصة سرطان البحر والجمبري والأسماك الصغيرة، وهو من الطيور المفترسة التي تجثم وتترقب فرائسها، حيث يجثم فوق أحد فروع أشجار المانغروف على ارتفاع 1 - 3 م فوق سطح الماء، ثم يقفز لالتقاط فريسته من الطين في الأسفل، ثم يعود بها إلى مجثمه ويضربها ليحكم قبضته عليها ويتناولها كاملة.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** تجويف أفقي تقريباً (بعمق 40 - 50 سم، وقطر المدخل الناضجة، وموجود على ارتفاع يراوح بين 1.3 - 3 م فوق سطح الأرض. وقد تقوم الأزواج أيضاً بحفر حفرة العش في ضفة أرضية، أو في تل نمل أبيض شجري (كما هو مسجل في

جنوب شرق آسيا). **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 19 - 21 يوماً. **مدة التعشيش:** 29 - 30 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة. **حالة الحماية:** هذا الطائر مدرج ضمن فئة الأنواع المعرضة للانقراض إقليمياً، نظراً لصغر وانقسام تعداده الآخذ في التناقص. وقد انخفض تعداده في المملكة بنسبة تراوح بين 50 - 55% على مدى العقود الأخيرة بفعل تحلل أشجار المانغروف؛ لأنه لما كان بحاجة إلى أشجار المانغروف القديمة لبناء أعشاشه في تجاويفها، فإن تجديد تلك الأشجار محدود للغاية ويستغرق عقوداً.

تجاويفها، فإن تجديد تلك الأشجار محدود للغاية ويستغرق عقوداً.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ 300
منطقة النشاط: خور عمق (شمال غرب البرك)

عويسق	الاسم العربي:
<i>Falco naumanni</i>	الاسم العلمي:
Lesser Kestrel	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهديد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
29 - 32 سم / الذكر 90 - 172 غم؛ الأنثى 138 - 208 غم (أثقل وزناً بنسبة 30%)	الحجم والوزن:




أنثى عويسق، وذكر (إلى أعلى)

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وصولاً إلى شمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بعد 3,000 - 10,000 كم جنوباً وجنوب غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع قضاء بعض الطيور منه فصل الشتاء في جنوب آسيا واليمن. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر، زائر صيفي غير منتظم. يُعدُّ هذا الصقر الصغير والملون مهاجراً عابراً غير شائع (مارس - أبريل، أكتوبر) في جميع أنحاء المملكة، حيث يزورها في أسراب (تراوح بين صغيرة إلى كبيرة)، وهو أكثر شيوعاً في فصل الربيع. وقد سُجل ظهور بعض منه أثناء الصيف في الثمامة والظهران، في حين يمضي بعضها الشتاء حول الرياض منذ عام 1987. ولا توجد سجلات لظهوره في شمال المملكة أو الربع الخالي. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أي مكان على طول طريق هجرته، ولكنه يفضل المناطق

يقطع هذا الصقر الأنيق في هجرته نحو 850 كم في اليوم، وكل عام تعبر نسبة كبيرة من تعداده العالمي عبر المملكة.

المكشوفة المناسبة للتغذية الجوية، بما في ذلك أعلى الأراضي الزراعية المروية (لا سيما محاصيل الأعلاف) والسهول العشبية والبيئات الزراعية الغنية بالنباتات، بما فيها المناطق القريبة من المدن. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات الطائرة، مثل الخنافس والجنادب واليعاسيب التي يصطادها في الهواء، إلى جانب اللافقاريات الأرضية، وقليل من السحالي والثدييات الصغيرة التي يصطادها من الأرض، وهو يتغذى أثناء الطيران فيما يستدير السرب باستمرار في تحليق رشيق، وقد تحوم أفراده لفترة قصيرة، أو تعلق في مهب الريح، أو تنقض على فريسة على الأرض، أو تطاردها في الجو. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يتغذى هذا الصقر الاجتماعي في أسراب، ويعيش في مستعمرات، ويهاجر في مجموعات. فيما مضى، سُجل ظهور الآلاف منه في المملكة، غير أنه في العقود الأخيرة، شوهدت أسراب منه تضم 300 - 600 طائر في المنطقة الشرقية بوتيرة كبيرة، وهو أمر غير مألوف، لأن أسرابه عادةً ما تكون أقل عدداً، وتمثل رؤية العشرات معاً في وقتنا الحالي أمراً لافتاً للانتباه. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باج الجناح:** 58 - 73 سم.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)



نقار الخشب العربي

الاسم العربي:	نقار عربي
الاسم العربي الآخر:	<i>Dendropicos dorae</i>
الاسم العلمي:	Arabian Woodpecker
الاسم الشائع:	قريب من التهديد
حالة الحماية العالمية:	يتناقص
المنحى العالمي للمجموعة:	قريب من التهديد
حالة الحماية الإقليمية:	يتناقص
المنحى الإقليمي للمجموعة:	18 سم / 41.5 غم
الحجم والوزن:	




ذكر نقار الخشب العربي (إلى اليسار) والأنثى داخل تجويف الشجرة

النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية؛ ولا يوجد سوى في غرب المملكة العربية السعودية وغرب اليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم. **متكاثر غير شائع.** يُعدُّ هذا النوع بمثابة نقار الخشب الوحيد الحقيقي في المملكة، ويكثر في المرتفعات الغربية جنوب خيبر. كما يوجد بشكل كبير على الجانب الشرقي الأكثر جفافاً والغني بأشجار الطلح في المرتفعات الجنوبية الغربية. **الموئل:** يفضل الارتفاعات دون 2,800 م في الغابات، بما

فيها غابات الطلح والعرعر على المنحدرات والقمم الجبلية، والوديان وفيرة الخضرة، والأشجار حول الحقول الزراعية، أو غابات الأجمة في تهامة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على يرقات الحشرات النافرة للخشب، ودبابير التين والمن التي يصطادها عبر حفر ثقوب في جذوع الأشجار واستخراج الفرائس بلسانه اللزج الطويل. وقد يتغذى كذلك على عُصارة الأشجار في فصل الشتاء. **النشاط:** نهاري.

السلوك الاجتماعي: يوجد منفرداً أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتولى الذكر (وربما الأنثى أيضاً) مسؤوليات حفر العش. ويتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** تجويف (بعمق 25 - 30 سم، وقطر مدخل 4.4 سم) محفور بواسطة الطيور على ارتفاع 2 - 5 م فوق سطح الأرض (يصل أحياناً إلى 25 م) في شجرة (حية أو ميتة)، وعادةً في الجذع الرئيس لشجرة طلح (أو العرعر على ارتفاع عال)، حيث يضع بيضه فوق نشارة الخشب المتراكمة في التجويف، وغالباً ما تستخدم الأنواع الأخرى تجاويف العش القديمة، بما فيها الـ «رزور» بنفسجي الظهر الذي قد يستولي على حفرة تم حفرها حديثاً. **البيض المحضون:** 3 بيوض (الأعشاش المدروسة = 3). **الحضانة:** 11 يوماً. **مدة التعشيش:** 16 - 22 يوماً. **الحضنة:** غير معروفة.

يستوطن هذا الطائر المملكة واليمن، وهو أحد أندر طيور نقار الخشب في العالم. يتميز بمنقاره القوي لحفر ثقوب في جذوع الأشجار للتعشيش، أو العثور على اليرقات المختبئة في الجحور.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,500
منطقة النشاط: تنهمة




صقر الغروب

صقر أسحم	الاسم العربي:
<i>Falco concolor</i>	الاسم العلمي:
Sooty Falcon	الاسم الشائع:
معرض للانقراض	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
مهدد بالانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
32 - 36 سم / 298 - 350 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال شرق أفريقيا وسيناء وفلسطين والأردن وشبه الجزيرة العربية وجنوب غرب باكستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم باتجاه الجنوب في مدغشقر وموزمبيق. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر ومهاجر عابر محدود. يتكاثر هذا الصقر الرمادي فوق الجزر في البحر الأحمر. **الموئل:** يفضل جزر البحر الأحمر الخالية من الكائنات الحية الأرضية المفترسة، ومواقع الأعشاش وفيرة الظلال. يطعم صغاره من تجمعات الطيور المهاجرة في فصل الخريف. **سلوك البحث عن الغذاء:** يتغذى بشكل أساسي على الطيور الصغيرة في موسم التكاثر، وهو متخصص في اصطياد الطيور الصغيرة أثناء محاولتها الهجرة للمرة الأولى، خاصة الطيور التي تهاجر عند الفجر والغسق. كما يصطاد الخفافيش والثدييات الصغيرة الأخرى في موسم هجرة الخريف، وهو يصطاد معظم فرائسه أثناء الطيران. **النشاط:** نهاري، وغسقي. **السلوك الاجتماعي:** منفرد أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً، وتعشش منفردة أو في تجمعات حسب توافر مواقع التعشيش (تبعد عن بعضها 25 م فقط، وفقاً لما هو مسجل في جزيرة بالقرب من الليث). **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 300
منطقة النشاط: الجزر قبالة منطقة الوجه

**عوسق**


<i>Falco tinnunculus</i>	الاسم العربي:
Common Kestrel	الاسم العلمي:
غير مهدد	الاسم الشائع:
يتناقص	حالة الحماية العالمية:
غير مهدد	المنحى العالمي للمجموعة:
مستقر (ربما يتزايد)	حالة الحماية الإقليمية:
27 - 35 سم / 136 - 252 غم؛ الأنثى 154 - 319 غم (أثقل وزناً بنسبة 20%)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه باستثناء الصحراء الكبرى في معظم أنحاء أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ومن جنوب أوراسيا وصولاً إلى الصين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أوروبا وروسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً ضمن نطاق وجوده، وفي جنوب آسيا. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يُعد طائر الـ «عوسق» أكثر الصقور شيوعاً في المملكة، إذ يوجد على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة بوصفه مقيماً متكاثراً، مع وجود أعداد أعلى بكثير في الشتاء وأثناء هجرة الربيع.

الموئل: يتكاثر في المناطق الصخرية والجبلية وبشكل متزايد فوق المباني في المناطق الزراعية وحول القرى والبلدات، وحتى وسط المدن. وفي الشتاء يوجد في السهول والصحاري المكشوفة، بما فيها الربع الخالي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على الثدييات الصغيرة، إلى جانب الطيور الصغيرة والزواحف، بما فيها الثعابين والحشرات الكبيرة، وكثيراً ما يكتشف فرائسه عبر التحويم المتميز على ارتفاع منخفض، أو من مجثمه والانقضاض بسرعة على ضحيته. كما يلتقط الحشرات من وضع الطيران. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الإناث مسؤولية الدفاع وحضن البيض وإطعام الفراخ، فيما يشترك الأبوان في إحضار الطعام. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة في تجويف، أو حافة على منحدر، أو نتوء صخري، أو مبنى، أو هيكل، أو فوق عش مهجور لنوع آخر من الطيور، لا سيما الغربان. وقد يعشش أيضاً في تجويف شجرة، أو صندوق عش (وفقاً لما هو مسجل في مكان آخر). **البيض المحضون:** 5 بيوض. **الحضانة:** 27 - 31 يوماً. **مدة التعشيش:** 27 - 35 يوماً. **الحضانة:** عادة ما تكون حفنة مفردة.

الموئل: يتكاثر في المناطق الصخرية والجبلية وبشكل متزايد فوق المباني في المناطق الزراعية وحول القرى والبلدات، وحتى وسط المدن. وفي الشتاء يوجد في السهول والصحاري المكشوفة، بما فيها الربع الخالي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على الثدييات الصغيرة، إلى جانب الطيور الصغيرة والزواحف، بما فيها الثعابين والحشرات الكبيرة، وكثيراً ما يكتشف فرائسه عبر التحويم المتميز على ارتفاع منخفض، أو من مجثمه والانقضاض بسرعة على ضحيته. كما يلتقط الحشرات من وضع الطيران. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الإناث مسؤولية الدفاع وحضن البيض وإطعام الفراخ، فيما يشترك الأبوان في إحضار الطعام. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة في تجويف، أو حافة على منحدر، أو نتوء صخري، أو مبنى، أو هيكل، أو فوق عش مهجور لنوع آخر من الطيور، لا سيما الغربان. وقد يعشش أيضاً في تجويف شجرة، أو صندوق عش (وفقاً لما هو مسجل في مكان آخر). **البيض المحضون:** 5 بيوض. **الحضانة:** 27 - 31 يوماً. **مدة التعشيش:** 27 - 35 يوماً. **الحضانة:** عادة ما تكون حفنة مفردة.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 6,500
منطقة النشاط: الجبيل

شويهين أوراسي*Falco subbuteo*

Eurasian Hobby

غير مهدد

يتناقص

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

28 - 36 سم / الذكر 131 - 232 غم؛ الأنثى 141 - 340 غم (أثقل وزناً بنسبة 35%)



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء أوروبا وروسيا وصولاً إلى اليابان وشرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء في جنوب أفريقيا (توجد بعض طيوره في جنوب الصين)، ما يعني مرور معظم الطيور الآسيوية عبر شبه الجزيرة العربية أثناء الهجرة. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. يُعدُّ هذا الصقر المعروف بجراته، من الأنواع المهاجرة العابرة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث يعبر بسرعة في فصل الربيع (أبريل)، ويتأن في فصل الخريف (سبتمبر - أكتوبر) للاستجمام. يقيم أحياناً بضعة أيام، أو أسبوع في مكان واحد. وفي أحيان أخرى قليلة، سُجلت مشاهدات له في فصلي الصيف والشتاء. **الموئل:** يمكن أن يوجد في أي مكان على طول طريق الهجرة، لا سيّما حول الأراضي الرطبة وفي المتنزهات والأراضي الزراعية المكشوفة المليئة بالأشجار. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على الحشرات الطائرة الكبيرة، مثل الخنافس والجنادب واليعاسيب والبعث، خاصة عند تجمعها بكثافة، ويصطادها عبر التقاطها بقدمه، أو تناولها على الجناح. كما يصطاد الطيور الصغيرة من فوق الجناح وغيرها من الطيور، إضافة إلى القوارض والسحالي التي يصطادها من الأرض، أو يسرقها من الطيور الجارحة الأضعف منه، مثل الـ «عوسق».

ويتيح تحليقه السريع وحركاته البهلوانية التقاط أكثر الطيور رشاقة في الهواء، بما

فيها طيور «سمام» و«خطاف»، وذلك

عن طريق غلق جناحه والانقضاض بسرعة

على فريسته بنصف جناح مغلق. علماً أنه

يشبه طائر «سمام» في سرعته وأجنحته

الطويلة المدببة، ويستخدم أيضاً، عدداً من

الاستراتيجيات في الصيد، ويستغل المجال

الجوي بأكمله بدءاً من المطارات منخفضة

المستوى وحتى المطارات المرتفعة

المفتوحة. **النشاط:** نهاري، وقد ينشط جزئياً عند الشفق (يصطاد عند الغسق بالتقاط

الخفافيش والطيور، وهي في طريقها إلى مجاثمها الجماعية). **السلوك الاجتماعي:**

يوجد منفرداً، لكنه قد يعتمد أحياناً إلى الهجرة في أزواج. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في

المملكة. **باع الجناح:** 68 - 84 سم.


يصطاد هذا الصقر الذي

يتميز بسرعته ورشاقته

المذهلة، اليعاسيب والطيور،

والخفافيش، ويأكلها أثناء

طيرانه وهجرته عبر المملكة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)

**يُويُّ***Falco columbarius*

Merlin

غير مهدد

مستقر

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

24 - 33 سم / الذكر 150 - 210 غم؛ الأنثى 189 - 255 غم (أثقل وزناً بنسبة 25%)



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء أميركا الشمالية وشمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب في أميركا والمكسيك وشمال أفريقيا وجنوب أوراسيا، ويصل أحياناً إلى شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. تقع المملكة العربية السعودية في جنوب نطاق التشبية الطبيعي لهذا الصقر الصغير المتميز. لذلك، يُعدُّ زائر أشتوياً نادراً، ويوجد بشكل رئيس في الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى من المملكة، مع تسجيل ظهور حالات فردية في كل من تبوك وينبع وشمال جدة. **الموئل:** يفضل السهول الصحراوية المكشوفة المليئة بالأجمات، أو الأراضي الزراعية المرورية، أو المناطق الساحلية المنخفضة، وغالباً ما يتفادى المواقع البشرية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساس على الطيور الصغيرة، إلى جانب

الحشرات الطائرة، مثل الجراد واليعاسيب،

ونادراً ما يتغذى على القوارض والزبابة، في

حين تُعدُّ القبرات الفريسة الأكثر شيوعاً

في مناطق ترده. ويهاجم من مجثم مرتفع،

أو الطيران على ارتفاع منخفض، عبر الاندفاع

نحو فريسته الطائرة عندما تكون الفرصة

مواتية. وقد ينعطف فجأة مُحلّقاً على ارتفاع منخفض، غالباً على ارتفاع يصل إلى


متر واحد فقط من الغطاء النباتي، لمطاردة أحد الطيور. وعادةً ما يطير الصقر

أسفل طير عابر منفرد لإجباره على الارتفاع في الهواء حتى يتسنى له الانقضاض عليه

بسهولة أكبر. كما يصطاد الطيور النازحة بفعل مرور المركبات، مع العلم أنه يخزن

الطعام أحياناً في مجثمه لتناوله في وقت لاحق. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:**

منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **باع الجناح:** 50 - 67 سم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة


منطقة النشاط: الدبدبة



صقر حر	الاسم العربي:
<i>Falco cherrug</i>	الاسم العلمي:
Saker Falcon	الاسم الشائع:
مهدد بالانقراض	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
مهدد بالانقراض بشكل حرج	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
45 - 57 سم / الذكر 730 - 990 غم؛ الأنثى 970 - 1,300 غم (أثقل وزناً بنسبة 30%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه على نحو متقطع، من جنوب شرق أوروبا وصولاً إلى جبال الهيمالايا. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من وسط أوروبا حتى الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب في منطقة أفريقيا الساحلية والشرقية وشبه الجزيرة العربية وشرق البحر المتوسط حتى جنوب الصين. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، زائر شتوي نادر. يمكن أن يوجد هذا الصقر القوي، عالي الطلب، على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة في الشتاء (أكتوبر - مارس) إلى جانب الطيور الغربية في الأشهر الأخرى على الأرجح، وهي في طريقها إلى أفريقيا. **الموائل:** الصحارى المكشوفة، بما فيها المناطق الرملية والصحيرية المليئة بالأجمات، وكذلك الأراضي الزراعية والأجمات الساحلية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الفقاريات التي تعيش على الأرض، بما فيها القوارض والأرانب البرية، وربما السحالي الكبيرة، مثل الضب وسحالي الورل الصحراوية، والطيور. كما يصطاد طيوراً أخرى من فوق الجناح، بما فيها الثُيَّرات والقطا، فضلاً عن الزواحف التي تنزع عندما يطاردها على ارتفاع منخفض فوق مكب النفايات المفتوحة. ويراقب الفريسة من نقاط معينة، علماً أن الأزواج المتكاثرة تصطاد بالتعاون مع بعضها أحياناً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:**



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة





صقر وكري	الاسم العربي:
<i>Falco biarmicus</i>	الاسم العلمي:
Lanner Falcon	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
مهدد بالانقراض بشكل حرج	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
39 - 48 سم / الذكر 430 - 600 غم؛ الأنثى 700 - 900 غم (أثقل وزناً بنسبة 55%)	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم ومشتت؛ توجد التعدادات المقيمة منه في معظم أنحاء أفريقيا وشرق البحر المتوسط، مع انتشار تعدادات منه في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، بينما تتجول بعض تعداداته في فصل الشتاء. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر ونادر جداً، زائر شتوي نادر. يتكاثر في المرتفعات الجنوبية الغربية، وربما يستمر في التكاثر في بعض المناطق الوسطى، وهو زائر شتوي نادر يخلق نحو السواحل. **الموائل:** يتكاثر بشكل أساسي في المناطق القاحلة، عادةً فوق التلال المعزولة المحاطة بسهول صحراوية، مثل نتوءات صخور الجرانيت وسط شبه الجزيرة العربية، ويوجد على ارتفاع يزيد على 2,000 م في غابات العرعر بالمرتفعات الجنوبية الغربية. وفي الشتاء يزور بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**

يتغذى على الطيور الصغيرة، خاصة اليمام، كذلك يتغذى على القوارض والخفافيش والسحالي والحشرات والعناكب والعقارب التي يصطادها بعد مطاردات سريعة عمودية، أو أفقية. ويصطاد أحياناً بمساعدة شركاء. **النشاط:** غسقي، ويلي جزئياً. **السلوك الاجتماعي:** إما منفرداً، أو في أزواج، فيما تتشكل مجموعات صغيرة في المناطق الغنية. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات

حضن البيض ورعاية الفراخ، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الذكر يصطاد وحده الفرائس في الأسابيع الأولى بعد الفقس، بينما تسهم الإناث في توفير المؤونة للفراخ الأكبر لمدة ثلاثة أشهر بعد مغادرة العش. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة في نتوء جرف، أو حافة محمية، أو فوق عش مهجور لنوع آخر من الطيور، لا سيما الغربان بُنية الرقبة، كما يوجد أحياناً على الأرض. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 32 يوماً. **مدة التعشيش:** 35 - 47 يوماً. **الحضنة:** أحادي الحضنات. **حالة الحماية:** هذا الطائر مهدد بالانقراض بشكل حرج إقليمياً بفعل التسمم بمبيد «دي دي تي»، واستمرار معاناته من الصيد ونصب الشراك وجمع البيض من جانب المشاركين في رياضات الصقارة. **باغ الجناح:** 88 - 113 سم.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ 10
منطقة النشاط: تنومة

صفارية أوراسية*Oriolus oriolus*

Eurasian Golden Oriole

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

24 - 25 سم / 42 - 102 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أفريقيا وغرب أوروبا وصولاً إلى منغوليا، وجنوباً إلى تركيا وشمال إيران، مع وجود تعدادات صغيرة جداً تتكاثر في شمال شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 9,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي نحو جنوب أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً، مهاجر عابر غير شائع. يوجد هذا الطائر باللون الأسود والأصفر المشرق على نطاق واسع أثناء هجرته عبر المملكة

(أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، في حين يتكاثر عدد صغير من التعدادات المقيمة منه على ما يبدو في النصف الشمالي من المملكة. **الموئل:** يتكاثر في مجموعات معزولة من الأشجار، لا سيما أشجار أوكالبتوس بالمتنزهات والحدائق كثيفة الأشجار. وعند الهجرة، يتخذ من النباتات الكثيفة والطويلة والأشجار الباسقة موئلاً له، خاصة المتنزهات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات

والفاكهة الصغيرة، إضافة إلى بعض البذور

والرحيق وحبوب اللقاح، وأحياناً السحالي

الصغيرة وبيض الطيور والفراخ. **النشاط:**

نهاري. ويهاجر بشكل رئيس في الليل.

السلوك الاجتماعي: منفرد أو في أزواج، أو

في بعض الأحيان في أسراب كبيرة مهاجرة

وأسراب رعي تضم نحو 40 طائراً، أو أكثر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة

مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى بناء العش ومعظم

واجبات الحضنة. ويشترك كلا الأبوين في رعاية الفراخ. **العش:** وعاء مكون من الأعشاب

والألياف النباتية، وغالباً ما يكون خيطاً، أو صوفاً، أو ورقاً، مبطناً بالعشب الناعم المحشور

بين فرعي شوكية أفقية، ومثبت على ارتفاع يراوح بين مترين إلى 20 م فوق سطح الأرض

في الفروع الخارجية للشجرة. **البيض المحضون:** 3-4 بيوض. **الحضنة:** 13-20 يوماً. **مدة التعشيش:** 14-15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

يصدحُ ذكر هذا الطائر، ذهبي

اللون والناضب بالحياة، بلحن


عالٍ وموسيقيٌّ يشبه صوت

الناي، ويتردد صده عبر

السهول الواسعة في شمال

شبه الجزيرة العربية كصوت

الأذان ساعة الصلاة.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40

منطقة النشاط: الظهران

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

الشاهين

كوبج

Falco peregrinus

Peregrine Falcon, Barbary Falcon

غير مهدد

مستقر

مهدد بالانقراض

مستقر (ربما يتزايد)

35 - 51 سم / الذكر 425 - 1,060 غم؛ الأنثى 595 - 1,600 غم (أثقل وزناً بنسبة 50%)

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جميع القارات (باستثناء القارة القطبية الجنوبية)، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أمريكا الشمالية وشمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 10,000 كم في المناطق المعتدلة والمدارية حول العالم. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر نادر، زائر شتوي نادر. توجد التعدادات الأوراسية في جميع أنحاء المملكة أثناء الهجرة وفي الشتاء، لا سيما في المناطق الساحلية، والنوع الفرعي من طيور الصقراء الصغيرة *F. p. peregrinoides* (وتُعدُّ في بعض الأحيان أنواعاً متميزة، مثل

الشاهين)، من بين التعدادات التي تتكاثر عبر شمال أفريقيا إلى إيران، مع وجود تعدادات منه في المملكة. **الموئل:** يتكاثر في الجبال والمناطق الصحراوية البرية ذات المنحدرات. وعند الهجرة، يفضل المناطق التي تنتشر فيها الفرائس بشكل واسع، بما فيها بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي والخزانات والأراضي الرطبة

والمسطحات الطينية الساحلية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى

بشكل أساسي على الطيور والثدييات والزواحف وأحياناً الأسماك. يفترس الطيور أثناء تحليقه

مستغلاً سرعته الكبيرة، وتصطاد إنائه الفرائس الأكبر. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:**

منفرد أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج

اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات الدفاع عن منطقة السيادة وحضن

البيض. وتتولى الأنثى واجبات الحضنة في الأسبوع الأول، فيما يناط بالذكر جلب الطعام،

لكنهما يتشاركان في جلب الفرائس للفراخ الأكبر. **العش:** حفرة ضحلة غير مبطنة على حافة

جرف، علماً أنه يُعيد استخدام بعض المواقع لسنوات عدة، ونبؤه أنه يتم تسجيل ظهوره


في أماكن أخرى بصورة متزايدة، إذ يفضل التعشيش في المبانى، وربما يقوم بالشيء ذاته في المملكة. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضنة:** 29 - 32 يوماً. **مدة التعشيش:**

35 - 40 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة. **باغ الجناح:** 79 - 114 سم. **حالة الحماية:** كان هذا

النوع على شفير الانقراض عالمياً بفعل التسمم بمبيد «دي دي تي»، لكنه يمر بمرحلة من

التعافي نظراً لتقويض استخدام هذا المبيد حول العالم. وقد أدرج ضمن قائمة الطيور

المهددة بالانقراض في شبه الجزيرة العربية، لأن حجم تعداداته لا يزال صغيراً.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 600

منطقة النشاط: محمية طويق

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

صائد ذباب فردوسي أفريقي

Terpsiphone viridis

African Paradise-flycatcher

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

18 سم / 13 - 14 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



الذكر



أنثى صائد ذباب فردوسي أفريقي

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شبه الجزيرة العربية، ويُعرف منه عشرة طيور فرعية؛ منها *T. v. harterti* الذي يتوطن شبه الجزيرة العربية. كما توجد تجمعات منعزلة منه في أقصى جنوب غرب المملكة وجنوب سبتة غمان واليمن. **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثر غير شائع.** يوجد هذا الطائر الرائع بالمملكة جنوب تهامة، وسفوح التلال والمرتفعات في الجنوب الغربي جنوب الطائف. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات تراوح بين 600 - 1,800 م تقريباً في سفوح التلال الرطبة الدافئة. كما يكثر عند مستوى سطح البحر في تهامة، وعلى ارتفاع يصل إلى 2,500 م في غابات العرعر الباسقة، عادةً بالقرب من المياه الجارية في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف ضمن الغابات المختلطة على سفوح التلال والوديان العميقة المورقة. كذلك يوجد في المناطق المحمية من الأراضي الزراعية، بما فيها مزارع النخيل والمزارع والمنتزهات والحدائق. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات والعناكب وبعض أنواع التوت الصغيرة. يصطاد فريسته بعد مطاردة قصيرة إما بخطفها من تحت الأوراق، أو عن طريق نشق ريش الذيل والتقاط الحشرات النازحة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً في أزواج، أو ضمن مجموعات رعي صغيرة خلال الشتاء.

إنه طائر بديع! إذ تؤكد ذكوره

على صحتها وحيويتها من


خلال أشرطة ذيلها الكبيرة

التي يصل طولها إلى 18 سم

وراء الذيل، والتلويح لأعلى

وأسفل أثناء الطيران.

منطقتها. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ، في حين يدافع الذكر عن منطقة السيادة بالتغريد. **العش:** وعاء متقن البناء يتكون من العشب وشرائح اللحاء، ومزين بنبات الأشنة (نوع من الطحالب أو البكتيريا الزرقاء) وأوراق الأشجار وأحياناً لحاء الأشجار، ومربوط بخيوط العنكبوت، ومبطن بالعشب الناعم والجذور وموضوع على ارتفاع 3 - 5 م فوق سطح الأرض على شوكية مكشوفة في ظلة سفلية لشجرة وفيرة الظل. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,500

منطقة النشاط: محمية ريدة

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

أخطب رأس

Tchagra senegalus

Black-crowned Tchagra

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتزايد (على الأرجح)

20 - 23 سم / 42 - 55 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال غرب أفريقيا، ومعظم دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع وجود تجمعات منعزلة في جنوب شبه الجزيرة العربية. يُعرف منه عشرة طيور فرعية، منها *T. s. persivali* الذي يتوطن شبه الجزيرة العربية، والذي يوجد فقط في جنوب غرب المملكة وجنوب سلطنة عُمان واليمن. **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثر غير شائع.** يوجد هذا الطائر الغامض إلى حد ما مقيماً متكاثراً في سفوح التلال الجنوبية الغربية جنوب الطائف.

يُحدد موقع هذا الطائر

الخجول بشكل أفضل من

خلال التغريدات العذبة التي


ترددتها ذكوره، والتي تبدو

أحياناً مثل «تش... تش... تشا... تشا...»

غراء، مع صفير بوتيرة أبداً

لكل لحن.

أساس على الحشرات والديدان والعناكب والقوارب والقواقع والسحالي الصغيرة والثعابين والضفادع والضفادع الصغيرة والفاكهة. كما يقتات من الأرض، أو من الغطاء النباتي المنخفض أسفل الغطاء الخشبي. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج أو مجموعات عائلية، ويشكل في بعض الأحيان أسراب رعي مختلطة مع الطيور الأخرى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **العش:** وعاء متقن مكون بشكل أساسي من العشب وسيقان النبات، مبطن بالعشب الناعم والجذور، ومبني على ارتفاع يراوح بين متر واحد إلى مترين فوق سطح الأرض في شجرة منخفضة، أو شجيرة في غطاء كثيف. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 12 - 13 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 16 يوماً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الأبوان في بناء العش ورعاية الفراخ. تقوم الأنثى بحضانة الفراخ، في حين يحمي الذكر منطقة السيادة. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 2,000

منطقة النشاط: أسفل وادي تنومة

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

مايو أبريل مارس فبراير يناير

صدر أحمر الذيل*Lanius phoenicuroides*

Red-tailed Shrike, Isabelline Shrike, Turkestan Shrike

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

18 سم / 25 - 34 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من إيران إلى كازاخستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 7,000 كم باتجاه الجنوب الغربي في منطقة أفريقيا الساحلية والشرقية وعبر شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محدود. يُعدُّ هذا الـ «صدر» الموسيم مهاجراً عابراً شائعاً عبر المملكة (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، إذ يمرُّ على نطاق واسع غيرها. وتكثر أعدادها في فصل الخريف، وربما يكون أكثر شيوعاً في الشمال. بعض أعدادها تشبُّ في المنطقة الشرقية بالقرب من الرياض، وفي سفوح المرتفعات الجنوبية الغربية. **الموئل:** المناطق ذات الغطاء النباتي من الشجيرات، حيث المجاثم البارزة. وقد يوجد في أيِّ مكان على طول طريق الهجرة، وحتى في النفايات الرملية القاحلة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى على أيِّ من الحيوانات يمكنه مباغتته والتغلب عليه، لا سيَّما اللافقاريات، مثل



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جدة



الخنافس والبق والجراد، كذلك السحالي

والثدييات الصغيرة والطيور. ينقض هذا

الطائر على فرائسه من مجثم ما يارتفاع 2 -

3 م فوق سطح الأرض، وأحياناً يطارد فرائسه

في الغطاء النباتي، وهو يعلق ضحاياه أيضاً.

على الأشواك، أو الأسلاك الشائكة ويتناول رأسها بينما يُبقي على بقيتها ليتناولها

في وقت لاحق. ويتوجه إلى مكبات النفايات أيضاً، حيث تكثر الفرائس. **النشاط:**نهارى. **السلوك الاجتماعي:** غير معروف بما يكفي، لكن يوجد عادةً إما منفرداً، أوفي مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عندما يتبعه

أحد مراقبي الطيور، فإنه يختبئ أحياناً في الشجيرات عوضاً عن الطيران بعيداً، وقد يثق

به ما لم يشعر بالتهديد، علماً أن هذا النوع عُرف مسبقاً بطير «صدر داوري» المدرج كنوع

فرعي، ويُشار إليه أحياناً باسم «صدر تركستاني».

من المحتمل عبور جميع

التعدادات العالمية من الصدر

أحمر الذيل عبر شبه الجزيرة

العربية كل عام أثناء الهجرة.

صدر أحمر الظهر

دغناش أمغر

Lanius collurio

Red-backed Shrike

غير مهدد

يتناقص

-

-

17 سم / 23 - 34 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى صدر أحمر الظهر

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا حتى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 9,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في شرق وجنوب أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. يُعدُّ هذا الطائر حادّ المظهر أحد أبرز الطيور

يقطع هذا الـ «صدر» البديع

خلال الهجرة 22,000 كم

سنوياً في حلقة متميزة.

وفي الخريف يتجه جنوباً عبر

أفريقيا، ثم شمالاً عبر المملكة


في الربيع.



ذكر صدر أحمر الظهر

الخنافس والبق والجراد، إلى جانب السحالي والثدييات الصغيرة والطيور. يصطاد عادةً عن طريق الجلوس فوق مجثم ما، أو كابل بارز منتظراً ومراقباً أي حركة، ثم ينقض ويصطاد الفرائس بعد غطس مباشر ضحل. بعد ذلك يعود بالفريسة إلى مجتمه، حيث يضرب اللافقاريات مراراً وتكراراً لإزالة أطرافها. علاوةً على ذلك، يتحين الفرص لاصطياد الفراخ عندما يجدها. ويعلق هذا الطائر فرائسه على الأشواك أو الأسلاك الشائكة، بعد قطع رأس الفرائس الفقارية وتناول أمخاها الغنية بالمغذيات. وفي حال توافر الطعام، فإنه يخزن الفائض من أجزاء فرائسه بتعليقها على الأشواك ليتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يُرى عادةً أثناء الهجرة في مجموعات تضم ستة طيور، أو أكثر، لكن توجد مشاهدات عدة مسجلة عن انخفاض التعدادات المهاجرة في الربيع، وظهور المئات فجأة ليلاً في منطقة

صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)



صرد رمادي صغير*Lanius minor*

Lesser Grey Shrike

غير مهدد

يتناقص

19 - 23 سم / 41 - 62 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من جنوب أوروبا حتى كازاخستان والعراق جنوباً، بينما يقضي الشتاء على بُعد 8,000 - 12,000 كم جنوباً في جنوب أفريقيا. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر غير شائع.** يعبر هذا الـ «صرد» الكثير الانتحال المملكة بشكل سريع خلال الهجرة (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، وهو غير شائع في أنحاء المملكة، ما يدعو للاستغراب، لكون شبه الجزيرة العربية تقع مباشرة بين نطاقي موسم التكاثر وفصل الشتاء لنصف تعداد العالم من هذا النوع، بل إنه في بعض السنوات يغيب على نحو غامض. ويُفترض أن معظم التعدادات المتكاثرة الآسيوية تهاجر في البداية غرباً باتجاه شرق أوروبا قبل أن تتوجه جنوباً عبر أفريقيا. **الموئل:** الحدائق والمناطق ذات الشجيرات الكثيفة والمزارع. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات والجنادب والصراصير والخنافس واليرقات، وأحياناً



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)

**صرد داوري***Lanius isabellinus*

Isabelline Shrike, Daurian Shrike

غير مهدد

مستقر

18 سم / 25 - 34 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى صرد داوري


النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر حول منغوليا وشمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 9,000 كم باتجاه جنوب غرب أفريقيا الشمالية الشرقية، مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى شمال الهند. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع.** يُعدُّ هذا الـ «صرد» الأنيق،

ذو اللون الأصفر المائل للرمادي، مهاجراً عابراً شائعاً وزائراً شتوياً محلياً للمناطق الوسطى والساحلية، علماً أن أحد الأنواع الفرعية الثلاثة المعروفة *L. i. isabellinus*، وهو يقضي فصل الشتاء بالمملكة، ويُشار إليه أحياناً باسم صرد أشهب. **الموئل:** يفضل المناطق ذات الغطاء النباتي من الشجيرات بالقرب

من الأراضي الرطبة والأراضي الزراعية والمنتزهات والحدائق. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات والتدبيبات الصغيرة والطيور التي يمكنه اصطيادها، كما يصطاد الضفادع والسحالي. ومن المعروف أيضاً، أنه يأكل الأسماك في شبه الجزيرة العربية. ويهاجم هذا الطائر فرائسه على الأرض من مجثم منخفض، ثم يعود بها مسرعاً إلى مجتمه ليتناولها. وكذلك يعلق اللافقاريات واللافقاريات الكبيرة على الأشواك، أو الأسلاك الشائكة بينما يقرب بطن الطريدة، أو يقطع رأسها، ويحتفظ بجسمها غالباً ليتناولها لاحقاً، علماً أنه لا يجذب السير على الأرض، وتقتصر مطاردته الأرضية على ثنائية أو ثنائيين فقط، كما أنه يصطاد الحشرات جواً. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في مجموعات مهاجرة صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عندما يُحلق هذا الطائر بين المجاثم، فإنه عادة ما يقفز للأسفل ويطير على ارتفاع منخفض حتى يبلغ مجتمه التالي، حيث يرتفع إلى أعلى نقطة من أي شجيرة، أو معلم بارز في اللحظة الأخيرة. كما أن هذا الطائر كان يُعرف في السابق بطير «صرد أحمر الذيل» بوصفه نوعاً فرعياً.



ذكر صرد داوري



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل



صرد شامي*Lanius senator*

Woodchat Shrike

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

غير معروف

18 - 19 سم / 21 - 59 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر حول منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في منطقة الساحل بأفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، مهاجر متكاثر محتمل. قد يكون هذا الـ «صرد» الجميل محدوداً في مناطق عديدة من المملكة أثناء الهجرة (مارس - أبريل، أغسطس - أكتوبر)، وعلى الرغم من أنه في بعض السنوات قد تكثر أعداده في فصل الخريف في تبوك، إلا أنه بشكل عام يُعدُّ نادراً. وأحياناً ما تُسجل رؤيته في فصل الشتاء بمنطقة تهامة. كما يمكن ملاحظة بعض سلوكيات بدء موسم التكاثر لديه في الربيع، مثل غناء الذكر وتشكل الأزواج، الأمر الذي يوحي أنه قد يتكاثر في المملكة أحياناً. **الموئل:** الحدائق والمزارع والأماكن ذات الغطاء النباتي من الشجيرات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، لاسيما الخنافس واليرقات والجنادب التي يعمد إلى قبضها بعد الانقضاض، أو الهبوط عليها من مجثمه العالي. كما أنه يقنط على السحالي والطيور، خاصة الجريحة منها. وقد تم تسجيله يأكل طيور فئرة متوجة وفضي المنقار الأفريقي وزوراء شائعة في شبه الجزيرة العربية. في حين يقع هو بدوره فريسة لطائر صقر الغروب الذي يصطاده بانتظام عندما يعبر البحر الأحمر. ويصطاد الصرد الشامي الفريسة بعد مطاردة جوية، أو أنه يحاول سرقة المواد الغذائية من أفراد جنسه. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد في الغالب، ولكن قد يوجد عديد منه في منطقة واحدة أثناء الهجرة. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** لدى هذا الطائر طبيعة تسليية نوعاً ما، وأحياناً ما يختبئ في الشجيرات. طيرانه مباشر وهادف أكثر من أنواع طيور الـ «صرد» الأخرى.

بالنظر إلى ميل الصرد نحو

غرز الحيوانات على الأشواك

وتميزها بمنقاره، فإنه أحياناً

ما يُطلق عليه الطائر الجزار.



مهاجر عابر، زائر صيفي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجل تكاثره (مع إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: جدة

**صرد رمادي كبير***Lanius excubitor*

Great Grey Shrike, Steppe, Arabian and Southern Grey Shrike

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

يتزايد (على الأرجح)

24 - 25 سم / 48 - 81 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تُوجد التعدادات المقيمة في أنحاء شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية حتى بنجلاديش، ومن فرنسا حتى كازاخستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أوروبا حتى روسيا الوسطى، ويهاجر للشتية حتى 4,000 كم جنوباً من بريطانيا إلى كازاخستان، وضمن نطاق إقامته. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. من بين الأنواع الفرعية المعروفة من هذا الطائر، والبالغ عددها اثنا عشر طائراً، يوجد اثنان منها على الأقل في المملكة، وهما صرد رمادي كبير *L. e. pallidirostris* وينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة أثناء الهجرة وفي الشتاء، وصدرد رمادي عربي *L. e. aucheri* الذي يتكاثر في أنحاء كثيرة من المملكة باستثناء السهول الشمالية والربع الخالي. **الموئل:** عند ارتفاع دون 2800 م في المناطق الصحراوية المكشوفة إلى حد ما التي تنتثر فيها الأشجار الشوكية والشجيرات المنخفضة، خاصة أشجار الطلم. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على الفقاريات الصغيرة والمفصليات الكبيرة التي يلتقطها عن طريق الهبوط من مجثم، على ارتفاع يصل إلى 15 م، وكثيراً ما يرغز فريسته على الأشواك، أو الأسلاك الشائكة، فيقطع رأس الفريسة الفقارية ويحتفظ ببقية الجسم لوقت لاحق. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يرعى منفرداً، أو في أزواج.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة

مناطق أحادية الزواج اجتماعياً، أو في

أحيان قليلة جداً يكون متعدد التزاوج، حيث

يعشش ذكر واحد مع أكثر من أنثى. **الأدوار**

الاجتماعية: يتشارك الطائران البالغان في بناء

العش ورعاية الصغار. وتؤدي الأنثى معظم

الحضانة، ويدافع الذكر عن منطقة السيادة.

العش: على شكل وعاء غير مرتب مكون من

الغصينات والأعشاب والجذور، ويكون مبطناً

بالشعر والصوف والأعشاب الناعمة والخيوط وأحياناً الورق والقماش، ويوضع على

ارتفاع 2 - 3 م فوق الأرض في شجرة، أو شجيرة صغيرة. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض.**الحضانة:** 15 - 17 يوماً. **مدة التعشيش:** 16 - 19 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.

مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 150,000

منطقة النشاط: حرض

العقق العسيري*Pica asirensis*
Asir Magpie, Eurasian Magpie

مهدد بالانقراض

يتناقص

مهدد بالانقراض

يتناقص

46 سم / 240 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في المملكة. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. أصبح الآن محصوراً في رقعة صغيرة من جبال عسير. **الموئل:** عند ارتفاع يفوق 2,100 م في غابات العرعر وفيرة الظلال، وغالباً على المنحدرات المتجهة جنوباً. ويوجد كذلك في المناطق المزروعة وسفوح التلال المكشوفة ذات الأشجار المتناثرة من العرعر والطلع والأشجار عريضة الأوراق. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي. لكنه قارت وانتهازي، ومن ضمن ما يتغذى عليه اللافقاريات والحيوانات الميتة جراء حوادث الطرق والمواد النباتية وبقايا طعام الإنسان.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يرضى في مجموعات عائلية تصل إلى سبعة طيور. **سلوك التكاثر:**

نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار. وتتولى الأنثى حضانة البيض. **العش:** على شكل صحن كبير مكون من العيدان ومبطن بصحن سميكة مصنوع من الطين. وقد يكون مبطناً أيضاً، بالغصينات والجذريات الدقيقة، وبينه هذا الطائر قبة ضخمة من الغصينات فوق الصحن، تاركاً مدخلاً عند حافة الصحن.

ويوضع العش على ارتفاع 3 - 8 م فوق سطح الأرض على شجرة، خاصة أشجار العرعر والطلع. ورغم أن العش يكون متيناً وقد يدوم لسنوات عدة، إلا أنه يُبنى بوصفه عُشاً جديداً كل عام. **البيض المحضون:** غير معروف (عادةً ما يتم الإبلاغ عن وجود 2 - 5 فراخ، أو صغار قادرة على الطيران؛ 2 - 8 بيوض في الأنواع المماثلة). **الحضانة:** 21 - 22 يوماً. **مدة التعشيش:** 24 - 30 يوماً. **الحضنة:** غير معروفة. **ملاحظة:** كان هذا الطائر يُعد في السابق نوعاً فرعياً من العققق الأوروبي. **حالة الحماية:** مهدد بالانقراض عالمياً بسبب حجم تعداده الصغير جداً، ووجود أفراده كافة في تعدادٍ فرعي واحد، علماً أنه كان يوجد مسبقاً في شمال الطائف، غير أن التعداد المتبقي منه أخذ في التناقص بفعل إزالة موائل العرعر لأغراض السياحة والتطوير العمراني وخشب البناء والحطب.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100

منطقة النشاط: التثوية

**صرد مبرقع***Lanius nubicus*

Masked Shrike

غير مهدد بالانقراض

يتناقص

غير مهدد

غير معروف

17 - 19 سم / 20 - 23 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر صرد مبرقع

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شرق البحر الأبيض المتوسط ومرتفعات غرب إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في منطقة الساحل بأفريقيا وجنوب غرب الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محلي، مهاجر متكاثر محتمل. يوجد طائر الصرد المبرقع الصغير والجميل بشكل خاص بوصفه مهاجراً عابراً (أبريل - مايو، سبتمبر) بأعداد متفاوتة في أنحاء المملكة، وهو يقضي الشتاء بانتظام في السفوح المجاورة

لجنوب تهامة، وأحياناً قليلة في الظهران والرياض وينبع. وقد تم تسجيل هذه الطيور في جبال الحجاز طوال الصيف، كما تم الإبلاغ عن وجود صغارها، ما يوحي بوجود بعض حالات التكاثر. **الموئل:** المناطق ذات الشجيرات الكثيفة في المتنزهات والحدائق والمناطق الزراعية والغابات المفتوحة.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات، مثل الجنادب واليعاسيب والنمل والخنافس، وأحياناً السحالي. كما يهاجم الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

يُوجد على وجه هذا الطائر ما يُشبه القناع الذي يساعده في التغلب على وهج الشمس، وهو ما يخوّله تحديد فريسته براحة تامة، ثم يياغتها من دون تنبّه الضحية للهجوم الوشيك.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.


الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.

الطيور المصابة، أو يخطف الفراخ الصغيرة إذا سنحت الفرصة. وعادةً ما يجلس بهدوء على الحافة، أو أسفل فروع شجرة متفتحة، أو شجيرة وينتظر فريسة لينقض عليها. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلحقها في الجو. ولديه عادة قديمة من عادات طيور الصرد، وهي غرز الفريسة على الأشواك، أو سلك شائك وأكل الدماغ أولاً، ثم الاحتفاظ ببقيتها لتناولها لاحقاً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره بعد في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** هذا الطائر خجول، ومتهور في الوقت نفسه لكن ليس بالقدر ذاته من الجراءة، أو القوة كأشكال طيور الصرد الأخرى. لديه ذيل طويل نسبياً، وغالباً ما يكون مرتفعاً إلى الأعلى.



أنثى صرد مبرقع



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجَل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: متنزه سيسد الوطني (الطائف)



غراب مروحي الذيل

غذاف
Corvus rhipidurus
 Fan-tailed Raven
 غير مهدد بالانقراض
 يتناقص
 غير مهدد
 مستقر
 47 - 46 سم / 512 - 734 غم

الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم، يوجد في شمال أفريقيا (من مالي إلى الصومال) وشبه الجزيرة العربية إلى فلسطين والأردن شمالاً. وتم التعرف إلى نوعين فرعيين منه، أحدهما *C. r. stanleyi* الذي يتوطن شبه الجزيرة العربية إلى حد كبير. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** يمكن رصد هذا الغراب الجميل ذي الذيل المروحي الشكل المتميز في المناطق الجبلية أو الصخرية في المنطقتين الغربية والوسطى بالمملكة.

الموئل: المناطق الجبلية ذات الجروف الشاهقة في المرتفعات والمناطق الصخرية غرب شبه الجزيرة العربية. وكذلك؛ المنحدرات الصخرية وسط شبه الجزيرة العربية، لا سيما جرف طويق. كما يوجد في مناطق وقوف السيارات على طول الطرق الجبلية ومختلف المواقع البشرية، خاصة مقابل القمامة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات والحبوب والتوت والبلح وبقايا طعام الإنسان. **النشاط:** نهارى.

السلوك الاجتماعي: يوجد في أزواج، أو في مجموعات عائلية، ويشكل أسراباً من منتصف الصيف إلى شهر ديسمبر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، على الأرجح مع روابط زوجية طويلة الأجل. وغالباً ما توجد أعشاش عديدة مجمعة على طول امتداد جرف صخري. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي، غير أن كلا الطائرين البالغين يتشاركان رعاية الصغار. **العش:** يُبنى على شكل صحن من العيدان، وقبطن في الغالب بالصوف والشعر، وربما أيضاً القماش أو الخيوط أو الحطام. وعادةً ما يوجد في تجويف، أو شق أو أحياناً على حافة وفيرة الظل، أو جرف صخري شديد الانحدار، أو بروز صخري شاهق الارتفاع بحيث يصعب الوصول إليه. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 18 - 20 يوماً. **مدة التعشيش:** 35 - 40 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

تمتلك الغرابان أكبر حجم للدماغ المقدم نسبة إلى الدماغ المؤخر، مقارنة بأي نوع آخر من طيور في العالم، وهو ما يمكنها من صناعة الأدوات، وحلّ المشكلات، وابتكار طرق جديدة لإيجاد الطعام.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 90,000

منطقة النشاط: أباها

**غراب بني الرقبة**

غراب أدرع
Corvus ruficollis
 Brown-necked Raven
 غير مهدد بالانقراض
 يتزايد
 غير مهدد
 يتناقص
 52 - 56 سم / 500 - 647 غم


الاسم العربي:
 الاسم العربي الآخر:
 الاسم العلمي:
 الاسم الشائع:
 حالة الحماية العالمية:
 المنحى العالمي للمجموعة:
 حالة الحماية الإقليمية:
 المنحى الإقليمي للمجموعة:
 الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم، يوجد في شتى أنحاء حزام الصحراء بالعالم القديم، بداية من جزر الرأس الأخضر شرقاً مروراً بأفريقيا وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى كازاخستان وغرب باكستان. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع جداً.** يتسم هذا الطائر بقوة لا يمكن إنكارها، وهو منتشر في أنحاء المملكة (ومن ذلك بعض الجزر وحتى الريح الخالي)، ولكنه شائع بصفة خاصة في المنطقتين الوسطى والغربية. **الموئل:** منتشر، لكنه مترکز على الطرق السريعة، خاصة في باحات وقوف السيارات، حيث تكثر الحيوانات النافقة جراء تعرضها للدهس على الطرق ومخلفات الطعام التي توفر له الغذاء، وأبراج الكهرباء وغيرها من المنشآت العمودية التي يستخدمها للتعشيش. كما يوجد في المعسكرات والمدن وأماكن التخلص من النفايات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** قارت وانتهازي، ويتغذى على الفقاريات واللافقاريات الصغيرة والجيف (لا سيما النافقة بسبب حوادث الطرق) وبقايا الطعام والمواد النباتية. ويعمد إلى سرقة البيض والفراخ. **النشاط:** نهارى.

السلوك الاجتماعي: يربى منفرداً، أو في أزواج، أو في مجموعات صغيرة، ويشكل أسراباً غير متكاثرة يصل عدد أفرادها إلى 500. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وربما أحادية الزواج مدى الحياة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران البالغان في بناء العش والدفاع عنه ورعاية الصغار، وتؤدي الأنثى معظم الحضانة. **العش:** على شكل صحن كبير من العيدان، وغالباً ما يكون مزوداً بالخزق أو الحطام، وقبطناً بالشعر والصوف والعشب والقماش والورق. ويوضع على ارتفاع يتجاوز 5 م فوق سطح الأرض على شجرة، خاصة أشجار الطلح، أو قد ينخفض الارتفاع إلى متر واحد على شجيرة في منطقة خالية من الأشجار، أو حتى ارتفاع 100 م على جرف ما، أو برج اتصالات، أو برج كهرباء. وقد يوجد أيضاً، في مواقع غير عادية، مثلاً على حجارة هاتف عمومي، أو عمود كرة سلة، أو كومة من الأسلاك الصدئة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 20 - 23 يوماً. **مدة التعشيش:** 38 - 42 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

يعرف عن هذا الطائر الذكي اصطياًه للضب على نحو تعاوني، حيث يقف طائران لسد جحر الضب ومنعه من التراجع إلى تحت الأرض، فيما تهاجمه الطيور الأخرى.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 120,000

منطقة النشاط: جبل الحمراء (بالقرب من جدة)

الاسم العربي:	مكاء
الاسم العلمي:	<i>Alaemon alaudipes</i>
الاسم الشائع:	Greater Hoopoe-lark
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد بالانقراض
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	19 - 23 سم / 30 - 51 غم



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أرجاء الحزام الصحراوي بشمال أفريقيا، مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى شمال غرب الهند. **حالته بالمملكة:** **مقيم متكاثر شائع جداً.** يعيش هذا الطائر في معظم صحارى المملكة، ومن ذلك الصحارى الرملية شديدة الجفاف، ويتجنب المرتفعات الغربية الرطبة نسبياً. **الموئل:** عند ارتفاع دون 1,800 م في المناطق المفتوحة، مثل السهول الرملية والحصوية والحرث وبحار الرمال والسهول الساحلية والشواطئ والمزارع والحقول المرورية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتناول اللافقاريات إلى جانب بعض النباتات الخضراء والبذور، وأحياناً يعتمد على تناول السحالي الصغيرة وصغار الفقاريات الأخرى. ويحفر في الرمال حتى عمق 5 سم لاستخراج الطعام. وقد تم توثيقه وهو يكسر أصداف القواقع بإسقاطها، أو ضربها على الصخور. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً، أو في أزواج، وفي أحيان أخرى ضمن مجموعات عائلية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار**



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 600,000

منطقة النشاط: محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز (مجازة الصيد)

الأبوية: تبني الأنثى العش وتقوم بحضانة العش. ويشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن مكوّن من الغصينات، أو العشب، وميطن بالعشب الدقيق والألياف وزغب النبات وأحياناً رؤوس البذور والصوف والقماش والورق، ويكون موضعاً إما في تجويف محفور في الأرض (في العراء أو أسفل شجيرة)، وإما أعلى قاعدة عش مكوّنة من

العيدان ترتفع عن الأرض بمقدار 30 سم، فوق شجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 - 13 يوماً. **الحضنة:** طائر انتهائي؛ حضنة مزدوجة في سنوات الرخاء، وقد يمتنع بعض الأزواج عن محاولة التكاثر في السنوات غير المطيرة.

يتمتع طائر الـ «مكاء» الجريء بقدرة فائقة على التكيف مع الحياة في الصحراء، بل إنه على الأرجح، الطائر الصغير الوحيد الذي يمكنه التعشيش في شتى أنحاء الربع الخالي.




الاسم العربي:	قرقفنة أوراسية
الاسم العلمي:	<i>Remiz pendulinus</i>
الاسم الشائع:	Eurasian Penduline-tit
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد بالانقراض
المنحى العالمي للمجموعة:	يتزايد
حالة الحماية الإقليمية:	لا تتوافر بيانات كافية
المنحى الإقليمي للمجموعة:	غير معروف
الحجم والوزن:	10 - 11 سم / 8 - 13 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة في أنحاء جنوب أوروبا إلى بحر قزوين، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في نطاق يمتد من أوروبا الوسطى إلى كازاخستان، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم جنوباً في جنوب أوروبا إلى إيران، وجنوباً إلى شمال الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر.** يصل هذا الطائر الصغير إلى المملكة لقضاء فصل الشتاء في تبوك وسكاكا والرياض والمنطقة الشرقية إلى بقيق جنوباً، والتي تمثل الحد الجنوبي لنطاق تشتيته الطبيعي. **الموئل:** الأراضي الرطبة التي تضم مزيج

من المستنقعات والأشجار والشجيرات والنباتات المنتشرة بشكل بارز. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غالباً يتناول اللافقاريات، مثل الحشرات ويرقاتها، بما فيها يرقات الفراشات والعناكب. ويبحث بإمعان في حقول القصب بصورة متواصلة ومفعمة بالنشاط، إذ قد يجد ما يبحث عنه من مواد غذائية من خلال الفروع الخارجية للشجيرات والأشجار الموجودة بالقرب من المياه. كما أنه يتغذى على البذور الصغيرة، كبذور البردي. وقد يمسك رؤوس البذور بقدمه أثناء تناوله البذور. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في مجموعات صغيرة خلال فصل الشتاء، وغالباً ما يُشاهد في المملكة ضمن مجموعة من ثمانية أفراد، ولا يختلط بالأنواع الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** من السهل جداً عدم الانتباه لهذا الطائر الصغير الذي يتسم بكثرة الرفرفة أثناء الطيران، ولكن أنصت لصوته المرتفع، وهو ينادي «سيو».

على مدار الشتاء، يستوطن هذا الطائر المملكة، حيث يعيش حياة خجولة وهادئة. وفي الربيع، يطير إلى أوروبا للانخراط في نظام تزاوج معقد تشوبه كثرة الانفصال وتبادل الشركاء.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة


منطقة النشاط: الزلفي

حمرّة صبغاء	الاسم العربي:
<i>Ammomanes cinctura</i>	الاسم العلمي:
Bar-tailed Lark	الاسم الشائع:
غير مهدد بالانقراض	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد بالانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
14 سم / 14 - 23 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أرجاء الحزام الصحراوي بشمال أفريقيا، مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى باكستان. **حاليته بالمملكة:** **مقيم متكاثر شائع جداً.** يمكن العثور على هذه القُبرة الصغيرة بنية اللون في نطاق واسع في أنحاء السهول الرملية، أو الحصوية المكشوفة، لا سيّما المناطق الوسطى والشمالية والشرقية بالمملكة. **الموئل:** عند ارتفاع دون 1,200 م حتى مستوى سطح البحر في الشرق، ولكن يغيب بصورة رئيسة عن سهول تهامة في الغرب والسهول الرملية، أو الحصوية القاحلة المكشوفة التي غالباً ما تكون بعيدة عن المستوطنات البشرية، ومنها المناطق الصخرية المسطحة والحرث والسبخات الحصوية الصلبة بين الكثبان الرملية في الربع الخالي. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور والحشرات الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد منفرداً، أو في أزواج،

مثل غيرها من القُبرات التي تكيفت للعيش في الصحراء، يتميز هذا الطائر الذي يطوف الأرض بحثاً عن غذائه، بلون رملي في أعلى جسمه ولون أبيض في أسفله للحد من امتصاص حرارة الصحراء الحارقة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 700,000

منطقة النشاط: الدبدبة




قُبرة سميكة المنقار	الاسم العربي:
قُبرة شذقاء	الاسم العربي الآخر:
<i>Ramphocoris clotbey</i>	الاسم العلمي:
Thick-billed Lark	الاسم الشائع:
غير مهدد بالانقراض	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد بالانقراض	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 - 18 سم / 45 - 55 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال غرب أفريقيا (الصحراء الغربية إلى ليبيا)، علماً أنه توجد تعدادات معزولة منه في شمال المملكة العربية السعودية والأردن والكويت. **حاليته بالمملكة:** **مقيم متكاثر شائع.** ويتكاثر هذا الطائر المتميز على الرغم من قلة الدراسات التي تُعنى به، في محمية الملك سلمان (حرة الحرة) وفي الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويتوغل أكثر في شمال ووسط شبه الجزيرة العربية خلال الشتاء. **الموئل:** يتكاثر في الصحارى الحجرية والهضاب وعلى سفوح التلال ذات الصخور والحصى، لا سيّما الحمم البركانية السوداء في محمية الملك سلمان (حرة الحرة). ويوجد أيضاً خلال فصل الشتاء في السهول القاحلة والمزارع والمعسكرات المهجورة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى غالباً على البذور واللافقاريات والمواد النباتية الخضراء وأحياناً الزواحف الصغيرة وصغار الفقاريات الأخرى. **النشاط:** نهارى.

يمتلك هذا الطائر، غير المعروف بما يكفي، أكبر منقار، مقارنةً بأي قُبرة في العالم. ويستخدم منقاره القوي، الشبيه بالكماشة، على الأرجح في تكسير البذور.

السلوك الاجتماعي: يربى منفرداً، أو في أسراب صغيرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران البالغان في بناء العش ورعاية الصغار، في حين تتولى الأنثى حضنة البيض. **العش:** تجويف صغير في الأرض مُبطّن بالغصينات الصغيرة والأعشاب ورؤوس النباتات الرغباء ويكون مظللاً بنبتة ما، أو صخرة وعادةً ما تكون على الجانب الشمالي من العش، مع وجود متراس من الحصى على الجانب المكشوف من العش. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 20,000

منطقة النشاط: محمية الملك سلمان (حرة الحرة)



قُبْرَة سوداء متوجة

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

10 - 11 سم / 12 - 16 غم

Black-crowned Sparrow-lark, Black-crowned Finch-lark

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر

ذكر قُبْرَة سوداء متوجة



أنثى قُبْرَة سوداء متوجة

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أرجاء منطقة الساحل الأفريقي عبر شبه الجزيرة العربية إلى شمال غرب الهند. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. تُوجد هذه القُبْرَة الصغيرة المتميزة التي تشبه الحسون في مختلف المناطق الرملية بمعظم أنحاء الأطراف الوسطى والساحلية من المملكة، ومنها الجزر الرملية في الخليج والبحر الأحمر. **الموئل:** عند ارتفاع دون 1,800 م في المناطق الرملية المكشوفة ذات الغطاء النباتي المتناثر (الأعشاب بشكل أساس)، ومنها السهول القاحلة وحقول البرسيم المروية ومزارع الألبان. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غالباً البذور، بالإضافة إلى الحشرات والعناكب التي يلتقطها من الأرض أو من النبات مباشرة. كما أنه يعتمد أحياناً إلى اصطياد الحشرات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يربى في أسراب تتألف من 50 طائراً

يحد أقصى، رغم أن أسراب الشتاء يمكن أن تضم طيوراً أكثر بكثير. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن سرب يضم 700 طائر بالقرب من الطائف في الشتاء. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. الأدوار الأبوية: تبني الأنثى العش (بحضور الذكر) وتتولى حضنة البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** تجوف صغير ومحفور في الأرض ومبطن بصحن مكوّن من الأعشاب وزغب النبات وأحياناً الخيط أو الشعر أو الريش، وعادة ما يكون موضوعاً بجانب كتلة ترابية أو أجمة من العشب أو نبات أو صخرة وأحياناً يوجد متراس من الحصى الصغيرة أو الأتربة حول الجانب المكشوف من العش. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضنة:** 10 - 11 يوماً. **الفراخ:** تغادر الفراخ العش بعد 8 أيام، وتختبئ في منطقة قريبة ثم تطير بعد 12 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

يَعُدُّ هذا الطائر أصغر قُبْرَة في المملكة، وأكثر القُبْرَات جرأةً.

ويتميز الذكر بالسواد الحالك الذي يغطي قناع وجهه وتاجه وبطنه، بينما تتسم الأنثى باللون البني الرملي والأبيض.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 170,000

منطقة النشاط: حرص

**قُبْرَة صحراوية**

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

15 - 17 سم / 20 - 30 غم

Ammomanes deserti

Desert Lark

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أرجاء الحزام الصحراوي بشمال أفريقيا مروراً بشبه الجزيرة العربية ووصولاً إلى باكستان. وقد تم التعرف إلى أربع وعشرين نوعاً فرعياً منه، وعديد منها يوجد في المملكة، بل ويتوطن المملكة اثنتان من هذه الطيور المدرجة ضمن الطيور الفرعية؛ وهما *A. d. azizi* الذي يوجد حول منطقة الهفوف و *A. d. saturate* ويمكن العثور عليه في الحرات. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر واسع الانتشار. تُصنّف هذه القُبْرَة الرائعة المتكيفة مع العيش في الصحراء على أنها طائر مقيم منتشر في معظم أنحاء المملكة، على الرغم من أنها تغيب عن منطقة الربع الخالي ومناطق كبرى من المرتفعات الجنوبية الغربية، لا سيما الجرف الغربي الأكثر رطوبة. **الموئل:** زُصد في معظم الأحيان عند ارتفاع دون 2,000 م ولكنه زُصد أيضاً عند ارتفاع يصل إلى 2,700 م في عسير الشرقية بالمناطق الصخرية والحجرية المفتوحة وسفوح التلال الصخرية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: صغار البذور والحشرات التي يلتقطها عادةً أثناء المشي على الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجّل منفرداً أو في أزواج، رغم أنه قد يُشكّل مجموعات صغيرة خلال الشتاء. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً.

يَعُدُّ هذا الطائر، المحب

للصحراء، من أكثر الطيور

انتشاراً في المملكة، إذ يتكاثر

نحو 4,5 ملايين زوج منه

في ربيعها كل سنة.

الأنثى حضنة البيض. **العش:** حفرة عميقة في الأرض ومبطن أساساً بالعشب وزغب النبات، ووفيرة الظل من جانب واحد بصخرة أو نبتة مع وجود متراس من الأحجار الصغيرة أو الأتربة حول الجانب المكشوف من العش. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضنة:** 13 - 14 يوماً. **الفراخ:** تغادر الفراخ العش بعد 10 - 11 يوماً وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير بعد بضعة أيام قليلة. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **ملاحظة:** عادة ما يكون للطيور الموجودة في الحرات السوداء ريش أكثر قتامة بينما تلك الطيور الموجودة في الصحاري الرملية يكون ريشها فاتح اللون. وعلى ما يبدو أنه من المستحيل دفع القُبْرَات داكنة اللون للعيش على الأراضي الفاتحة اللون، والعكس صحيح أيضاً.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 4,500,000

منطقة النشاط: جبل الحمراء (بالقرب من جدة)

قُبْرَة عربية	الاسم العربي:
<i>Eremalauda eremodites</i>	الاسم العلمي:
Arabian Lark	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
ينخفض سريعاً ¹	المنحى الإقليمي للمجموعة:
10 - 11 سم / 12 - 16 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية. ويتكاثر بانتظام في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان واليمن مع وجود تعدادات صغيرة معزولة منه في الأردن وجنوب سوريا. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. توجد هذه القُبْرَة البنية المتواضعة بصفة رئيسية في السهول الوسطى والشمالية، وهي من الطيور الرخالة والغازية بعد نزول الأمطار. ويبدو أنها قد عانت من انخفاض سريع في تعدادها خلال السنوات الأخيرة. **الموئل:** السهول الرملية أو الحصوية المرصوفة ذات مجموعة متنوعة من الشجيرات المتناثرة إلى حد ما والأعشاب والنباتات الموسمية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يشمل البذور والحشرات البالغة ويرقاتها، ومنها يرقات الفراشات والجنادب. ويرعى على الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يربى منفرداً، أو في أزواج أثناء موسم التكاثر وغالباً ما يوجد في مجموعات صغيرة تتألف من 20 طائراً بحد أقصى خارج موسم التكاثر. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 17,000

منطقة النشاط: محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز (محاذاة الصيد)

كانت هذه القُبْرَة، شبه المتوطنة في الماضي، من الطيور واسعة الانتشار في المناطق النائية عبر وسط المملكة، ولكنها أضحت لا تُشاهد إلا نادراً جداً، وقد تكون أعدادها في انخفاض شديد.

3 - 4 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (13 - 16 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (10 أيام في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** على الأرجح حضنة مفردة. **ملاحظة:** هذا الطائر كان يُعتبر في السابق نوعاً فرعياً من قُبْرَة الرمال، ولكنه يُعتقد الآن أنه نوع مستقل ينحصر نطاقه إلى حد كبير في شبه الجزيرة العربية. وهو من الطيور الرحالة والمغرية، ما يجعل من الصعب إيجاده في معظم السنوات.



¹ أدرج التقييم الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هذا النوع ضمن فئة الأنواع المستقرة (سايمز وآخرون 2015). وقد خفضنا التصنيف إلى الانخفاض السريع استناداً إلى ندرة السجلات الحديثة.

قُبْرَة الشجر	الاسم العربي:
حمرة شجرية	الاسم العربي الآخر:
<i>Mirafra javanica</i>	الاسم العلمي:
Horsfield's Bushlark, Singing Bushlark	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر (ربما يتزايد)	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 سم / 15 - 21 غم	الحجم والوزن:




طيران الغناء

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في الساحل وشرق أفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية والهند وجنوب شرق آسيا إلى أستراليا. وتم التعرف إلى عشرين طائراً فرعياً منه، أحدها *M. c. simplex* المتوطن في شبه الجزيرة العربية، والذي يوجد في المملكة واليمن وغرب سلطنة عُمان. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. **في المملكة:** تُوجد هذه القُبْرَة الموسيقية فقط في أقصى الجنوب الغربي بالقرب من الحد اليمني. **الموئل:** الحقول الزراعية في أقصى جنوب تهامة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكن يشمل قُوته البذور والحشرات مثل الخنافس والنمل واليرقات. ويرعى على الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يربى منفرداً، أو في أزواج أو مجموعات صغيرة متفرقة تتألف من 15 طائراً كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: غير معروف (غالباً ما تشكل الأنواع المماثلة أزواجاً متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً).

يُصدر هذا الطائر، المعروف أيضاً باسم القُبْرَة المغردة، أغنيته الجميلة الرنانة بصورة متكررة وحماس فوار، إما من مجثم ما أو حتى أثناء الطيران. كما هي الحال غالباً.

المحزون: 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة. **مدة التعشيش:** غير معروفة (10 - 12 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة أحياناً. **ملاحظة:** يشدو هذا الطائر البني الصغير بأغنيته الجميلة والمتغيرة بكل حماسة إما من مجثم منخفض، أو أثناء طيرانه التفردي الذي عادةً ما يكون مرتفعاً ومذهلاً. وكثيراً ما يُقلد أصوات الطيور الأخرى في نوبة تغريدته التي يمكن أن تدوم لدقائق عدة.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثر سنوياً: 200
منطقة النشاط: صبياء



قُبْرَة شرقية صغيرة	الاسم العربي:
عليعل	الاسم العربي الآخر:
<i>Melanocorypha bimaculata</i>	الاسم العلمي:
Bimaculated Lark	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 - 18 سم / 47 - 62 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً، تتكاثر التعدادات المقيمة في نطاق يمتد من أفغانستان إلى كازاخستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من تركيا وسوريا إلى كازاخستان، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً في شمال شرق أفريقيا وشمال الجزيرة العربية ومن أفغانستان إلى شمال الهند. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، زائر شتوي شائع أحياناً. تُعدُّ هذه القُبْرَة المرقطة بشكل كثيف زائراً شتوياً (أكتوبر - مارس) بأعدادٍ متفاوتة في النصف الشمالي من المملكة غالباً. وقد تم تسجيل تكاثرها في أقصى الشمال ومن المؤكد أنها تتكاثر بشكل انتهازي ربما بعد موسم أمطار جيد في الشتاء فقط. **الموئل:** السهول المكشوفة وصحراء البادية في أقصى الشمال، ومنها محمية الملك سلمان (حرة الحرة). وخلال فصل الشتاء يوجد أيضاً، في المزارع والحقول المزروعة، خاصة الحقول المحروثة. وقد يتكاثر في المناطق الحجرية المكشوفة وذات الغطاء النباتي المتناثر والتلال الجافة ذات الأحجار والحقول المحروثة غير المستوية (كما تم التسجيل في تركيا). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بصفة رئيسة على



مهاجر متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: صفر - 5
منطقة النشاط: محمية الملك سلمان (حرة الحرة)




قُبْرَة صبيعاء صغيرة	الاسم العربي:
<i>Alaudala rufescens</i>	الاسم العلمي:
Lesser Short-toed Lark	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 - 14 سم / 20 - 27 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً، تتكاثر التعدادات المقيمة في إسبانيا وأندلس شمال أفريقيا مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى شمال الصين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من أوكرانيا إلى منغوليا، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً في نطاق إقامتها ومعظم أنحاء شمال وشرق شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر، زائر شتوي شائع. تُعدُّ هذه القُبْرَة المرقطة بشكل كثيف زائراً شتوياً شائعاً ومنتشراً في أنحاء المملكة، وتتكاثر في المنطقتين الشمالية والشرقية، وذلك يشمل طوال ساحل الخليج، وربما في المناطق الوسطى كذلك. **الموئل:** السهول الرملية أو الحصوية المكشوفة ذات الأعشاب والحشائش أو المناطق المزروعة، ويوجد أيضاً في السبخات ذات الغطاء النباتي الواقعة بجوار ساحل الخليج. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بصفة رئيسة على اللافقاريات في الربيع والبيدور في الشتاء، بالإضافة إلى الفواكه والبيصلات التي يلتقطها أثناء المشي على الأرض. **النشاط: نهارى. السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يربى منفرداً، أو في أزواج، أو في مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:**

بالرغم من ندرة وجود هذا الطائر في المملكة عادةً، فقد تتكاثر الآلاف منه في المملكة بعد شتاءٍ ممطر على نحوٍ خاص.

أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتؤدي معظم الحضنة، ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** حفرة صغيرة في الأرض مبطنّة بصحن مصنوع من الأعشاب أو الغصينات الصغيرة أو الجذيرات أو أحياناً الشعر والصوف، وغالباً ما تكون مظلمة بشجيرة منخفضة أو أجمة صغيرة من النباتات. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضنة:** 12 يوماً. **الفراخ:** تغادر الفراخ العش بعد 9 أيام وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير بعد يومين، أو ثلاثة أيام. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: 450
منطقة النشاط: جبل النعيرية



قُبْرَة صبيعاء كبيرة*Calandrella brachydactyla*

Greater Short-toed Lark

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

مستقر

14 - 15 سم / 20 - 26 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا إلى منغوليا. ويقضي فصل الشتاء حتى 3,000 كم جنوباً في منطقة الساحل بأفريقيا ومن شبه الجزيرة العربية إلى شمال الهند. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر شائع جداً، زائر شتوي شائع. ينتشر هذا الطائر المهاجر على نطاق واسع أثناء الهجرة وخلال الشتاء. ويتكاثر بأعداد صغيرة، ربما تزداد تلك الأعداد في السنوات التي تلي هطول أمطار جيدة في فصل الشتاء. **الموئل:** يتكاثر في المناطق المرورية والمزروعة ذات الغطاء النباتي المتناثر والمنخفض، ويقضي الشتاء في السهول الصحراوية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بصفة رئيسة على اللافقاريات خلال موسم التكاثر وعلى البذور خلال موسم عدم التكاثر بحيث يلتقطها أثناء المشي ببطء على الأرض.

تمزّ الملايين من هذه القُبْرَات الصغيرة الأنيقة عبر المملكة أو تقضي فصل الشتاء فيها كل عام، فيما تفضل بضع مئات منها البقاء حتى موسم التكاثر.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200

منطقة النشاط: حرض

النشاط: نهارى. ويمكن أن يهاجر ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يرعى منفرداً أو في أزواج أو في أسراب صغيرة، رغم أنه من الشائع وجود مجموعات تتألف من 100 طائر أو أكثر في الشتاء، وقد تم تسجيل أسراب من 5,000 طائر أثناء الهجرة في مارس. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً مع وجود مستويات منخفضة من الأبوة خارج نطاق الزوجية. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** تجويف صغير ومحفور في الأرض ومبطن بصحن مكوّن من العشب والجذور وزغب النبات والشعر والصوف وأحياناً الريش. وعادة ما يكون مظللاً بنبته، أو أجمة من العشب مع وجود منتراس من الحصى، أو الاتربة على الجانب المكشوف من العش. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 11-13 يوماً. **مدة التعشيش:** تغادر الفراخ العش بعد 9 - 10 أيام وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير بعد 12 - 15 يوماً. **الحضانة:** حضنة مزدوجة.

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

قُبْرَة صبيعاء عربية*Calandrella eremica*

Rufous-capped Lark

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

مستقر

13 - 14 سم / غير معروف

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في إثيوبيا والصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. وقد تم التعرف إلى اثنين من الأنواع الفرعية، منها *C. b. eremica*، وهو متوطن في شبه الجزيرة العربية ويوجد فقط في جنوب غرب المملكة وغرب اليمن، مع وجود توثيق واحد من سلطنة عُمان. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يمكن العثور على هذه القُبْرَة البنية الصغيرة في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة وفي الباحة جنوباً. **الموئل:** مهاجر ارتفاعي، يتكاثر على ارتفاع يتجاوز 1,900 م في المناطق المكشوفة المستوية أو المتموجة قليلاً التي تتسم بغطاء نباتي متناثر في المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنها القمم الجبلية الجرداء والهضاب والحقول المدرجة والأرض الحجرية. وخلال الشتاء ينتقل إلى ارتفاعات منخفضة في السهول الصحراوية ذات الحصى والأشجار المنخفضة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف. تقتات الأنواع المماثلة البذور واللافقاريات، وهو يرعى أيضاً أثناء الركض، أو المشي بسرعة على الأرض.

مثل معظم القُبْرَات في المملكة، يؤدي ذكر هذه القُبْرَة عرض طيران مليئاً بالحماسة؛ إذ يرتفع عالياً في الهواء، ثم ينطلق في هبوط أشبه بالهبوط المظلي في شكل دائري، مغرداً أثناء هبوطه.

أحياناً في أسراب تتألف من 40 طائراً كحد أقصى طوال المواسم الأخرى. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: غير معروف (عادةً ما تشكل الأنواع المماثلة أزواجاً متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً). **الأدوار الأبوية:** غير معروفة. **العش:** غير معروف (تبني الأنواع المماثلة عشاً على شكل صحن مفتوح مبطناً بالعشب في حفرة ضحلة في الأرض). **البيض المحضون:** غير معروف (2 - 5 بيوض في الأنواع المماثلة). **الحضانة:** غير معروفة (12 - 15 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (9 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضانة:** غير معروفة. **ملاحظة:** حتى عهد قريب، كان هذا النوع يُعدّ نوعاً فرعياً من قُبْرَة بلانفورد *C. blanfordi* التي يُعتقد أنها توجد الآن فقط في شرق أفريقيا.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 25,000

منطقة النشاط: جبل السودة

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

قُبْرَة سماوية أوراسية*Alauda arvensis*

Eurasian Skylark

غير مهدد

يتناقص

-

-

18 - 19 سم / الذكر 35 - 50 غم؛ الأنثى 26 - 40 غم (أخف وزناً بنسبة 20%)

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة في غرب أوروبا وحول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلى بحر قزوين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من شمال أوروبا والوسطى إلى اليابان وشرق روسيا وتهاجر لقضاء فصل الشتاء حتى 5,000 كم جنوباً في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط إلى الهند وشرق الصين. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي غير شائع. تُعدُّ القُبْرَة السماوية هذه، المألوفة لدى المزارعين، زائراً شتوياً غير شائع في المملكة، لا سيما في المنطقة الشرقية، وبالقرب من الرياض وتبوك، وعلى الساحل الغربي شمالاً من ينبع. **الموائل:** أراضي المحاصيل، خاصة الحقول المروية محورياً والحقول المحروثة ومحاصيل الأعلاف، مثل البرسيم، كما يوجد أيضاً، في الحدائق المفتوحة الكبيرة والمناطق المشبعة بالماء والقريبة من الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية المنخفضة والمزروعة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: تبوك

ما يثير الدهشة هو أن طائر القُبْرَة عالي الجودة يُغرَّد بصوتٍ مرتفعٍ لدى تعرضه للمطاردة من جانب أحد الصقور، وهو بذلك يحاول إقناع الصقر بأنه في تمام صحته، وأن الأمر لا يستحق عناء المطاردة.

الصغيرة في الشتاء، إلى جانب بعض أوراق الأعشاب والحشائش. ويرعى على الأرض، ولكن ليس في النباتات الطويلة أبداً، ويلتقط المواد التي يأكلها أثناء المشي، أو أحياناً بالحفر في الأرض. وعند إزعاجه يتميز طيرانه بكثرة الرفرفة والمستوى المنخفض، وغالباً ما يهبط في منطقة قريبة بعد التحويم لفترة وجيزة. وبالعكس، قد يبقى ساكناً حتى يكون أسفل القدمين تقريباً، ثم يطير فزعاً. وأحياناً ما يجثم في الشجيرات ولكن ليس في الأشجار أبداً، ولا يذهب إلى المياه ليشرب. ويُغرَّد أغنيته الجميلة في أراضي تكاثره، ولكن للأسف لا تُسمع في شبه الجزيرة العربية. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً وهو يرعى في مجموعات صغيرة، رغم أنه قد شوهد في مجموعة يصل عدد أفرادها إلى 50 طائراً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

قُبْرَة مقرنة

حمرة قرناء صحراوية

Eremophila bilopha

Temminck's Lark

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

13 - 15 سم / 38 - 39 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال أفريقيا وشمال شبه الجزيرة العربية إلى سوريا. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يمكن أن توجد هذه القُبْرَة المقرنة الفريدة من نوعها في السهول الصحراوية الشمالية بالمملكة إلى الرياض جنوباً في بعض السنوات. **الموائل:** عند ارتفاع دون 800 م في المناطق الصحراوية الحجرية الصلبة أو الرملية التي تنتشر فيها الصخور والأجمات الصغيرة من النباتات المتناثرة، ويتجنب التلال

والصخور الجرداء. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بصفة رئيسة على البذور بجانب بعض الحشرات والفواكه، ويرعى على الأرض غالباً أثناء المشي السريع أو الركض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد وهو يرعى في أزواج أو مجموعات صغيرة خلال موسم التكاثر، أو في أسراب كبيرة تتألف من 150 طائراً يحد أقصى خلال موسم عدم التكاثر. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تؤدي الأنثى معظم أعمال بناء العش وربما أيضاً معظم الحضنة، ويتشارك الطائران البالغان رعاية الصغار. **العش:** تجويف عميق محفور في الأرض ومبطن بالجذريات والأعشاب وزغب النبات والصوف، وأحياناً الورق أو الريش. وعادةً ما يكون مظللاً بنبتة، أو صخرة منخفضة تكون على الجانب الشمالي من العش، مع وجود متراس من الأحجار الصغيرة، أو الأتربة على الجانب المكشوف من العش. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** تغادر الفراخ العش بعد 10-11 أيام وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير بعد 15 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.




مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 750,000**منطقة النشاط:** محمية الملك سلمان (حرة الحرة)

قُبْرَة متوجة	الاسم العربي:
قُبْرَة شائعة	الاسم العربي الآخر:
<i>Galerida cristata</i>	الاسم العلمي:
Crested Lark	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 - 19 سم / 35 - 50 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم، يوجد في معظم أنحاء شمال أفريقيا وأوروبا مروراً بشبه الجزيرة العربية وآسيا الوسطى ووصولاً إلى الهند وكوريا، ويمكن رؤيته بتنوعات ألوان متعددة حسب الظروف المحلية، وتم التعرف حالياً إلى سبعة وثلاثين نوعاً فرعياً منه، أحدها *G. c. tardinata* المتوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد في جنوب غرب المملكة واليمن وسلطنة عُمان. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر واسع الانتشار.** يمكن العثور على هذه القُبْرَة المألوفة تقريباً في كل قرية وبلدة بالمملكة، وهي شائعة بصفة خاصة في المناطق الساحلية، وتُعدُّ ثاني أكثر الطيور المتكاثرة انتشاراً في المملكة. **الموئل:** المزارع والمناطق المزروعة والصحارى القريبة ذات الأشجار المنخفضة والأراضي المخصصة للنفائات حول القرى والحدائق الموجودة في المدن والبلدات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بصفة رئيسية على اللافقاريات أثناء موسم التكاثر والبيذور والمواد النباتية الخضراء أثناء موسم عدم التكاثر، ويرعى أثناء المشي، أو الركض على الأرض، أو أحياناً عن طريق إنشاء



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 4,000,000

منطقة النشاط: حرص

حفر في الأرض الرملية. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يعى منفرداً، أو في أزواج أثناء موسم التكاثر، أو في مجموعات صغيرة خلال الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار. وتؤدي الأنثى معظم الحضنة. **العش:** على شكل فنانج مصنوع من العشب والغصينات الصغيرة والجذيرات، ومبطن بالأعشاب الدقيقة والشعر وأحياناً الصوف أو الريش، ويكون موضوعاً في تجويف طبيعي أو محفور في الأرض، وغالباً ما يكون مظللاً بأجمة من النباتات أو بصخرة منخفضة على الجانب الشمالي من العش عادةً. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 12 - 13 يوماً. **مدة التعشيش:** تغادر الفراخ العش بعد 9 - 11 يوماً وتختبئ في منطقة قريبة، ثم تطير بعد 15 - 16 يوماً.

تتعرض الإناث الجالسات في العش لمعدلات افتراس مرتفعة للغاية، لدرجة أنه بنهاية موسم التكاثر يمكن للذكور أن تفوق أعداد الإناث بأكثر من أربعة ذكور لكل أنثى.



قُبْرَة سماوية مشرقية	الاسم العربي:
<i>Alauda gulgula</i>	الاسم العلمي:
Oriental Skylark, Small Skylark	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
16 - 18 سم / 24 - 30 غم	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئياً، توجد التعدادات المقيمة في نطاق يمتد من باكستان إلى الفلبين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في إيران وكازاخستان إلى الصين، ويقضي فصل الشتاء في نطاق التعدادات المقيمة وأحياناً ضمن بقاع مختلفة في أنحاء شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة: زائر شتوي نادر جداً.** في المملكة، تم تسجيل هذا الطائر الغامض ذي اللون الأصفر البرتقالي في الغالب بالقرب من ساحل الخليج (عند سبخة الفصل والجيبيل والظهران)، ولكن تم تسجيله كذلك داخل اليابسة حتى الثمامة. **الموئل:** المناطق المروية مثل الحقول المروية محورياً

هذا الطائر زائر نادر جداً في المملكة، ولا يتأقلم جيداً مع البيئة الصحراوية. وللبقاء على قيد الحياة في تلك البيئة، فإنه يحتاج إلى شرب مياه أكثر بنسبة 30% من القُبْرَة العربية المتأقلمة مع العيش في الصحراء.

تم تسجيلها في المملكة كانت مجموعة من 25 طائراً تم تسجيلها في أبو علي في شهر فبراير عام 1991. وقد تم تسجيله وهو يتغذى بشكل جماعي مع القُبْرَة السماوية الأوراسية والقُبْرَة قصيرة الأصابع. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمكن الخلط بين هذه القُبْرَة الصغيرة ذات التاج المنتصب قليلاً وبين القُبْرَة السماوية الأوراسية لولا طنين نداها المتميز، وبروز قوادم الجناحين القصيرة، وألوانها الأكثر دفئاً. كما أنه لا يوجد لديها بياض تلك الحافة الخلفية في جناحها. يُعزَدُّ هذا الطائر أغنية مماثلة لأغنية القُبْرَة السماوية الأوراسية التي تؤدي أغنياتها بالمثل أثناء الطيران، أو من مجثم.

والمروج الخضراء، وكذلك الأراضي الرطبة الساحلية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غير معروف بما يكفي، ولكنه يشمل البيذور والحشرات الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجَل منفرداً، أو في أزواج أو مجموعات صغيرة تتألف من 25 طائراً كحد أقصى. ويبدو أن أكبر مجموعة تم تسجيلها في المملكة كانت مجموعة من 25 طائراً تم تسجيلها في أبو علي في شهر فبراير عام 1991. وقد تم تسجيله وهو يتغذى بشكل جماعي مع القُبْرَة السماوية الأوراسية والقُبْرَة قصيرة الأصابع. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمكن الخلط بين هذه القُبْرَة الصغيرة ذات التاج المنتصب قليلاً وبين القُبْرَة السماوية الأوراسية لولا طنين نداها المتميز، وبروز قوادم الجناحين القصيرة، وألوانها الأكثر دفئاً. كما أنه لا يوجد لديها بياض تلك الحافة الخلفية في جناحها. يُعزَدُّ هذا الطائر أغنية مماثلة لأغنية القُبْرَة السماوية الأوراسية التي تؤدي أغنياتها بالمثل أثناء الطيران، أو من مجثم.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل



نمنة ذنوب	الاسم العربي:
<i>Prinia gracilis</i>	الاسم العلمي:
Graceful Prinia	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
10 - 13 سم / 8 - 6 غم	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق منطقة البحر الأبيض المتوسط ووادي النيل والقرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط حتى بنغلاديش. وقد تم التعرف إلى اثني عشر نوعاً فرعياً منه، اثنان منها متوطنان في شبه الجزيرة العربية: *P. g. hufufae* ويوجد في شمال شرق المملكة والبحرين؛ و *P. g. yemenensis* ويوجد على الساحل الغربي للمملكة وفي اليمن وجنوب سلطنة عُمان. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** يتكاثر هذا الطائر المُغرَّد الرقيق في المناطق الغربية والوسطى والشرقية. **الموائل:** الغطاء النباتي الكثيف الذي غالباً ما توجد فيه مياه سطحية مثل قنوات تصريف الري ومزارع مياه الصرف وأحواض القصب والأسل وأجمات الطرفاء وشجيرات النباتات الملحية والأرض العشبية الرطبة. كما يوجد في الأماكن الأكثر جفافاً، مثل مناطق زراعة المحاصيل ومزارع النخيل والأراضي الزراعية المدرجة وحدائق الضواحي والمناطق ذات الشجيرات الكثيفة في متنزهات المدن. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات والعناكب وبعض المواد النباتية. ويلتقط الفرائس في النباتات

يحتفظ هذا الطائر الصغير، الأخف وزناً في المملكة، بمناطقه على مدار العام.

وتجرى منازعات على الحدود بين ذكوره في شكل مبارزات غنائية واستعراضات لريش الذيل.

الكثيفة من ارتفاع يقل عن المترين فوق الأرض، وغالباً ما يكون مُعلقاً بسيقان النباتات أثناء البحث عن الغذاء. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج، أو مجموعات عائلية. وتشكل الفراخ الشاردة أسراباً من 10 - 12 طائراً كحد أقصى.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً مع روابط زوجية طويلة الأجل على ما يبدو. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران البالغان في بناء العش والدفاع عنه وحضن البيض ورعاية الصغار. ويدافع الذكر عن منطقة السيادة. **العش:** قبة بيضاوية الشكل مكونة من الأعشاب والجذيرات وزغب النبات وخيوط العنكبوت وأحياناً خيوط الأنسجة، بمدخل قريب من القمة. ويكون العش مبطناً بزغب النبات أو الشعر ويوضع عادةً عند ارتفاع 30 - 90 سم فوق الأرض بين أعشاب طويلة، أو حوض قصب، أو أسل، أو الطرفاء، أو مشتل زهور، أو شجيرة. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 11 - 13 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 45,000
منطقة النشاط: بحيرات الأحساء



نمنة مخططة	الاسم العربي:
<i>Cisticola juncidis</i>	الاسم العلمي:
Zitting Cisticola	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
10 سم / الذكر 7 - 12 غم؛ الأنثى 5 - 8 غم (أخف وزناً بـ 30%)	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جنوب أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب غرب الجزيرة العربية وشمال أستراليا. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** يوجد هذا الطائر المخطط الصغير بصفة رئيسية في أقصى جنوب تهامة، جنوب أبها. **الموائل:** يُرصد في معظم الأحيان عند ارتفاع دون 500 م في الريف الحار والجاف والبرّام والمناطق ذات الغطاء النباتي الجيد، خاصة الأراضي العشبية وحقول زراعة المحاصيل، لا سيما الذرة الرفيعة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات واللافقاريات الصغيرة الأخرى، مثل العناكب والقواقع التي يلتهمها في الغالب عن طريق التقاط

الفرائس من قاعدة الأجمات النباتية أو عن طريق مطاردة الحشرات في الهواء. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل وهو يرضع منفرداً، أو في أزواج أو مجموعات عائلية صغيرة. وقد تشكل الفراخ الشاردة أسراباً من 10 طيور كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً بوجوه عام، أو أحياناً متعددة التزاوج، حيث يعيش ذكر واحد مع ما يصل إلى 11 أنثى معاً، أو بالتعاقب. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن منطقة السيادة وينني العش. تتولى الأنثى تبطين العش وتحضن البيض والاعتناء بالصغار. **العش:** عبارة عن دورق كُمثري الشكل مكون من الأعشاب وزغب النبات وخيوط العنكبوت بمدخل في الأعلى، ومحاط بخيوط العنكبوت حول عديد من السيقان المستقيمة للأعشاب الطويلة أو المحاصيل، ويكون موضعاً على ارتفاع 10 - 90 سم فوق سطح الأرض ومخفياً جيداً بين النباتات في العراء. يبني الذكر أعشاشاً عديدة وتختار الأنثى واحداً، ثم تبطنه بالأعشاب الدقيقة وزغب النبات وخيوط العنكبوت، وأحياناً الصوف. **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض. **الحضانة:** 13 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.

تغريدات هذا الطائر أقرب ما تكون لصوت الحشرات وأزيزها، ومن هنا جاء اسمه بالإنجليزية Zitting Cisticola. ويصدر الطائر هذه التغريدات بصورة متكررة أثناء الطيران بحيث تقابل كل نغمة رفرقة واحدة من جناحيه.

بالتعاقب. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن منطقة السيادة وينني العش. تتولى الأنثى تبطين العش وتحضن البيض والاعتناء بالصغار. **العش:** عبارة عن دورق كُمثري الشكل مكون من الأعشاب وزغب النبات وخيوط العنكبوت بمدخل في الأعلى، ومحاط بخيوط العنكبوت حول عديد من



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,500
منطقة النشاط: صبياء



دخلة وادية	الاسم العربي:
<i>Hippolais languida</i>	الاسم العلمي:
Upcher's Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
15 - 10 سم / 20 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر، يتكاثر في نطاق يمتد من فلسطين وتركيا إلى أفغانستان وكازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في شرق أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. هذا الطائر الصغير النشط ذو اللون الينبي والرمادي مهاجر عابر غير شائع ولكنه ينتشر في جميع أنحاء المملكة. ويُعدُّ سلوك هجرته نادراً، حيث إن الأغلبية منه تعبر المملكة في أواخر فصل الربيع (أواخر مايو) وغالباً ما تكون قد شكّلت أزواجاً بالفعل. **الموائل:** الشجيرات ذات المساحات الشاسعة والغطاء النباتي الصحراوي المنخفض (ومنه النباتات الملحية) وشجيرات الطلح وسفوح التلال المغطاة بالشجيرات المنخفضة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يشمل الحشرات واللافقاريات الصغيرة الأخرى التي يجدها أثناء البحث عن الغذاء في الشجيرات والنباتات المنخفضة، والقفز بنشاط بين سيقان النباتات وفروع الشجر، وعادةً ما يخفق بجناحيه ويهز ذيله مراراً وتكراراً، كما لو كان الذيل مرتخياً، ربما لكشف اللافقاريات المستقرة على أوراق الشجر القريبة، كما أنه عادةً ما يصطاد فريسته أثناء الطيران ويهبط إلى الأرض.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الملك سلمان
(حرة الحرة)




دخلة زيتونية شرقية	الاسم العربي:
<i>Iduna pallida</i>	الاسم العلمي:
Olivaceous Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
14 - 12 سم / 8 - 16 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة بمناطق متفرقة في أنحاء شمال أفريقيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من شمال أفريقيا وجنوب شرق أوروبا، مروراً بشبه الجزيرة العربية، ووصولاً إلى غرب الصين، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً في شرق أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر. في المملكة، توجد هذه الهاجرة الصغيرة في نطاق واسع أثناء الهجرة (أبريل - مايو، سبتمبر - أكتوبر) وتتكاثر بصفة رئيسية في النصف الشمالي من المملكة، وهي شائعة محلياً في المنطقة الشرقية والأجزاء الوسطى من المملكة. **الموائل:** الأشجار الكثيفة ذات الظلل (وبالأخص الطرفاء) بالقرب من المياه، مثل المزارع المروية وبساتين النخيل والمنتزهات والحدائق. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات والعناكب وبعض أنواع الفاكهة. وعادةً ما يلتقط هذا الطائر فريسته من أوراق الشجر والغصينات المرتفعة في ظللة الأشجار، ولكنه يتغذى أيضاً في الشجيرات المنخفضة جداً أثناء الهجرة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج عادةً أو مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** تحاول هذه الهاجرة بناء

أفضل وأصغر عش قدر الإمكان، لأن الإناث التي تبني أعشاشاً أصغر في هذا النوع يقل تعرضها لافتراس الأعشاش بنسبة كبيرة.

نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش منفردة أو في مجموعة حرة في موئل جيد جداً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (ببعض المواد التي يحضرها الذكر) وتتولى حضانة البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن مضغوط متقن الصنع، منسوج من العشب وسيقان النبات وأوراق الشجر والغصينات الرقيقة وخيوط العنكبوت، ومبطن بزغب النبات والأعشاب الدقيقة وأحياناً الشعر أو الريش، ويكون موضعاً على ارتفاع 1 - 9 م فوق الأرض في فروع الشجرة الخارجية، خاصة الطرفاء. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 11 - 13 يوماً. **مدة التعشيش:** 11 - 15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة. **ملاحظة:** هذا الطائر دائماً ما يحرك، أو يهز ذيله باتجاه الأسفل، ثم يرتفع للأعلى في حركة سريعة، ومع كل هزة تتزامن عادةً نغمة واحدة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,000
منطقة النشاط: الظهران



دخلة ليمونية*Hippolais icterina*

Icterine Warbler

غير مهدد

يتناقص

-

-

الحجم والوزن: 14 - 11 سم / 16 - 13 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر، يتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا والدول الإسكندنافية إلى شمال كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 8,000 كم جنوباً في جنوب أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر. تُعدُّ هذه الهاجرة ذات اللون الرمادي الضارب إلى الخضرة طائراً مهاجراً عابراً نادراً (مارس - أبريل، أغسطس - سبتمبر) تمر خلال المملكة، علماً أنه توجد سجلات لطيور فردية من شتى أنحاء المملكة. وتشير سجلات الطيور الفردية هذه إما إلى أفراد انحرفت عن مسار الهجرة الذي يحتمل مروره بالكامل عبر المملكة، وإما إلى أن أغلبية هذه الطيور المهاجرة العابرة تسلك مساراً غربياً أكثر عبر أفريقيا. **الموائل:** الشجيرات المعزولة إلى حدٍ ما أو شجيرات الطلج، في الصحراء أو الوديان غالباً. ولا يوجد بصفة خاصة في المناطق الخضراء التي تأوي في العادة معظم الهواجر المهاجرة الأخرى. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بصفة رئيسة على الحشرات ويرقاتها، ومنها

حتى الهواجر الصفراء الصغيرة

تثير الإعجاب حقاً، فقدرات هذا

النوع لا تتوقف عند الهجرة

لمسافات مذهلة تصل إلى

16,000 كم كل سنة فحسب،


بل إن بإمكانه أيضاً أن يحاكي

بشكلٍ دقيق نداءات الكثير من

الطيور الأخرى.

الفراشات والبعث واليعسوب والجراد والخنافس والذباب. إضافة إلى العناكب والرخويات الصغيرة. كما أنه يتغذى على التوت والفاكهة، وهو من الطيور التي تتغذى في ظل الأشجار على أراضي تكاثره وتوحي المشاهدات المحدودة له في شبه الجزيرة العربية بأنه يرضع بالمثل بصورة متواصلة ومفعمة بالنشاط في الأجزاء

الأعلى والأكثر اتساعاً في الأشجار والشجيرات. كذلك؛ يصطاد فريسته أثناء الطيران وأحياناً ما يهبط إلى الأرض للتغذي. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** رصدت معظم السجلات في السعودية طيوراً منفردة. وعادةً ما ينطوي على نفسه بدلاً من أن ينخرط مع الأنواع الأخرى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الوديان القريبة من الرياض

**دخلة شجر زيتون***Hippolais olivetorum*

Olive-tree Warbler

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

الحجم والوزن: 18 - 16 سم / 23 - 14 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في المناطق الساحلية في شرق منطقة البحر الأبيض المتوسط وغرب البحر الأسود، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 7,000 كم جنوباً في جنوب أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر. تُعدُّ هذه الهاجرة الرمادية الكبيرة نسبياً طائراً مهاجراً عابراً نادراً في فصلي الربيع والخريف. ونظراً لأن توزيعها العالمي غرب شبه الجزيرة العربية في الأصل، فمن المُرجَّح أن تهاجر معظم هذه الطيور عبر أفريقيا، في حين يهاجر عدد قليل منها على طول الجانب الشرقي من البحر الأحمر، وربما يعبر مضيق باب المندب قبالة اليمن. لذلك، عادةً ما يوجد على طول المناطق الساحلية للبحر الأحمر مع وجود تسجيلات قليلة منه في الرياض ومنطقة الخليج العربي. **الموائل:** الشجيرات والبساتين، وغالباً ما يكون بالقرب من المياه، أو المناطق الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات والتوت والتين. وغالباً ما يتغذى في الظلة العلوية

بعد التعشيش في أشجار

الزيتون في شرق منطقة

البحر الأبيض المتوسط،

تهاجر هذه الهاجرة النادرة

7,000 كم جنوباً نحو جنوب

أفريقيا، وبعضها يمر عبر غرب


السعودية.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً

ما يوجد منفرداً، أو في أزواج، أو في مجموعات

صغيرة تتكون من 3 - 4 طيور. **سلوك****التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذه الهاجرة ذات المنقار الكبير متسللة جداً،

وتتميز بحركتها البطيئة خلال الشجيرات وطيوران ثقيل ولكنه مباشر.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: ينبع




دخلة سعديّة	الاسم العربي:
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	الاسم العلمي:
Sedge Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 سم / 8.1 - 18 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من الجزر البريطانية والدول الإسكندنافية إلى روسيا الوسطى، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 7,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محلي. من المحدود جداً أن تمر هذه الهاجرة البنية الصغيرة في المملكة وتُعدّ من الطيور المهاجرة العابرة (فبراير - يونيو، سبتمبر - أكتوبر)، ولكن من الممكن لفترة وجيزة في مايو أن تكون شائعة في منطقة الرياض حيث تُغرّد عديد منها تغريدات كاملة. وربما تقضي الشتاء في جنوب تهامة، حيث رُصدت في مواقع عدة خلال يناير.

الموئل: الأراضي الرطبة والمستنقعات ذات الغطاء النباتي الكثيف المكسو بالأعشاب الكثيرة، خاصة أحواض القصب وأجمات الطرفاء بجانب المياه الراكدة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى تُضاعف هذه الهاجرة الصغيرة وزن جسمها تقريباً في تزودها لطريق هجرتها، ولكن هذا الوزن الزائد يكلفها ثمناً غالياً، فكلما سمنت الطيور ضعفت قدرتها على المراوغة والهروب من المفترسين.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)




دخلة مشوربة	الاسم العربي:
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	الاسم العلمي:
Moustached Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
12 - 13 سم / 8.5 - 13 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى إيران وشبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب أوروبا إلى جنوب كازاخستان وتمضي فصل الشتاء حول منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر، مهاجر عابر نادر، زائر شتوي محدود. تمتاز هذه الهاجرة ذات التاج الداكن بخط الحاجب الأبيض البارز إلى جانب خط الشارب الأسود، ويُسجّل وجودها في المملكة أثناء موسم الهجرة (مارس - أبريل، أكتوبر - نوفمبر) وخلال الشتاء (ديسمبر - مارس)، بصورة رئيسة في شمال المملكة. ويحدث معظم التكاثر في المنطقة الشرقية، باستثناء القليل من الأزواج بالقرب من الرياض. **الموئل:** الأراضي الرطبة الواسعة التي توجد فيها أحواض القصب والنباتات الكثيفة الأخرى النامية في

عند التكاثر، يغرد الذكر أغنية من جزأين؛ يكون الجزء الأول عبارة عن صفير حاد وقصير لطرد الذكور المنافسة، والجزء الآخر عبارة عن تغريدة طويلة وجميلة لجذب الإناث. **سلوك البحث عن الغذاء:** الماء أو بجانبها. **النظام الغذائي:** المفصليات الصغيرة، خاصة الخنافس والبق ويرقات الحشرات والعناكب والقواقع المائية فضلاً عن الفاكهة والتوت أحياناً. ويرعى بين السيقان الرأسية في أحواض القصب. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجّل منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش. ويتشارك الطائران البالغان في الحضنة والاعتناء بالصغار والدفاع عن منطقة السيادة. **العش:** على شكل صحن عميق من شرائح القصب وسيقان النباتات والعشب الخشن، ويكون مبطناً بالعشب الدقيق وأزهار القصب وأحياناً الريش، ومنسوجاً حول سيقان القصب أو الأسل الرأسية، ويكون موضوعاً على ارتفاع يتراوح بين 0.3 - 1.3 م فوق سطح المياه في حوض قصب. **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض، **الحضنة:** 14 - 15 يوماً، **مدة التعشيش:** 12 يوماً، **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200

منطقة النشاط: بحيرات الأحساء



دخلة أوراسية	الاسم العربي:
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	الاسم العلمي:
Common Reed-warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
بتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 سم / 8 - 20 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة في أنحاء أفريقيا وغرب شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا إلى كازاخستان، وهو يقطع مسافة 6,000 كم جنوباً لقضاء فصل الشتاء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع.** يُوجد في المملكة ثلاثة أنواع فرعية (تُعدّ أحياناً أنواعاً مستقلة)، وهي طائر هازجة القصب الأوراسية (*A. s. scirpaceus*) الذي يعبر المنطقة الشمالية الغربية؛ وطائر هازجة القصب القزوينية (*A. s. fuscus*) الذي يُعدّ مهاجراً متكاثراً إلى الشرق ومهاجراً عابراً؛ وأخيراً طائر هازجة قصب البحر الأحمر، أو ما يُعرف باسم هازجة المانغروف (*A. s. avicenniae*) ويسكن المنطقة الغربية. **الموتل:** هازجة القصب القزوينية والأوراسية؛ أحواض القصب الضحلة والأدغال المجاورة ذات الشجيرات النامية التحتية الكثيفة. هازجة المانغروف؛ مجموعات أشجار المانغروف السوداء الكثيفة على طول ساحل البحر الأحمر. **سلوك البحث**

تمتلك تعدادات هوازج

القصب المهاجرة أجنحة

طويلة ورفيعة معدة للطيران

مسافاتٍ طويلة، في حين

تمتلك التعدادات المقيمة

أجنحة قصيرة ومستديرة

تمنحها السرعة والرشاقة.

عن الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات

وبيرقاتها والعناكب، وبعض الفاكهة أحياناً.

في معظم الأحيان تلتقط الفريسة من

سيقان القصب ونصاله، أو من الشجيرات،

أو من على الأرض. **النشاط:** نهاري. ويهاجر

ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجّل

منفرداً، أو في أزواج، رغم أنه قد يربى عديداً

منه في المنطقة العامة نفسها. **سلوك**

التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مستعمرات


حرة صغيرة. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش. ويشترك كلا الطائرين البالغين

في الحضنة ورعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن عميق مصنوع من العشب

وأوراق الشجر وسيقان القصب المزهرة، ويكون مبطناً بمواد دقيقة ومنسوجة حول

السيقان المستقيمة في حوض قصب (أو أحياناً شجيرة). **البيض المحضون:** 4 بيوض.

الحضانة: 9-12 يوماً. **مدة التعشيش:** 10-12 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,900

منطقة النشاط: ينبع



دخلة مستنقعية	الاسم العربي:
<i>Acrocephalus palustris</i>	الاسم العلمي:
Marsh Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 سم / 10 - 13 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا حتى روسيا الوسطى، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد مسافة تزيد على 8,000 كم في جنوب شرق أفريقيا. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر شائع.** هذا المهاجر الاستثنائي الذي يقطع مسافات طويلة شائع ومنتشر في طريق عبوره خلال المملكة (مايو، أغسطس - سبتمبر). وفي فصل الربيع، تعبر جميع الطيور تقريباً المملكة في منتصف مايو، حيث تكون في ذلك الوقت ولفترة قصيرة شائعة جداً، وتغزّد بعضها تغريدات كاملة، ثم تختفي مجدداً. ويندر وجودها في فصل الخريف، ما يوحي بأنها تهاجر جنوباً عبر أفريقيا. **الموتل:** الغطاء النباتي الكثيف بجانب المياه، خاصة أحواض القصب ومجموعات عشب البوط وأجمات الطرفاء. **سلوك**

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى بصفة رئيسة على الحشرات، مثل البق واليمن وأسد المن

والرعاشات وأنواع شتى من اليرقات. إضافة

إلى العناكب وقمل الخشب والقواقع

الصغيرة والتوت أحياناً. ويرعى في النباتات

الكثيفة، غالباً بالقرب من مستوى سطح

الأرض، ويتنقل بين أعلى السيقان وأسفلها

وتحت أوراق الشجر بحثاً عن الأطعمة. ويلتهم

بعض الحشرات في الهواء كما يلتقطها من

الأرض. **النشاط:** نهاري. ويهاجر ليلاً. **السلوك**

الاجتماعي: عادةً ما يُسجّل منفرداً، أو في


مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يصعب تمييز

هذا النوع في الحقل عن هازجة القصب الشائعة، لدرجة أن مراقبين عدة يدمجون

ببساطة كلا النوعين، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عنه من مناطق كثيرة. ومع ذلك، تظهر

دراسات التحجيل والتحديد الدقيق أن هذا النوع لا يقل شيوعاً عن هازجة القصب

الشائعة أثناء الهجرة ولكن خلال فترة زمنية محدودة فقط.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)



دخلة كبيرة*Acrocephalus arundinaceus*

Great Reed-warbler

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

19 - 20 سم / 22 - 31 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر في شمال أفريقيا وغرب أوروبا إلى منغوليا وشبه الجزيرة العربية جنوباً، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 8,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر نادر، مهاجر عابر شائع. ينتشر هذا النوع من هاجرات القصب كثيرة الارتحال على نطاق واسع أثناء موسم الهجرة (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر) عبر المملكة، ويتكاثر بأعداد صغيرة في المنطقة الشرقية وجنوب الرياض. **الموئل:** يتكاثر في الأراضي الرطبة ذات القصب الكثيف الطويل في المياه الضحلة، ويفضل الأراضي الرطبة أثناء الهجرة، ولكنه يتخذ أيضاً من أي موئل ذي غطاء نباتي جيد ظلاً له، حتى الشجيرات الخفيضة الجافة في الصحراء. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بصفة رئيسة على الحشرات، إلى جانب العناكب والقواقع، وأحياناً الفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع، أو صفار السحالي، أو الأسماك، ويرعى في حقول القصب، حيث يقوم بقفزات قصيرة خلال النباتات، أو يركع أحياناً بالصيد أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل منفرداً، أو في أزواج، رغم أنه قد توجد

غالباً ما تجذب هذه الهاجرة الكبيرة مجموعة كبيرة من الإناث؛ فمن خلال السيطرة على أفضل المناطق وأكثرها أماناً، يمكن للذكور عالية الجودة أن تجذب حتى أربع إناث، وأن تعشش معها جميعاً في آنٍ واحد.

طيور عدة منه في المنطقة العامة نفسها. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً في العادة، إذ تعشش إما منفردة، أو في تجمعات متفرقة، أو تكون أحياناً متعددة التزاوج، بأن يعيش ذكر واحد مع 2 - 3 إناث معاً في آنٍ واحد. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** فنجان عميق مكوّن من سيقان النباتات وأوراق الشجر وأزهار القصب وزغب النبات، ويكون مبطناً بمواد أكثر دقة من السويقات وأوراق الشجر وأحياناً الشعيريات والریش، ويكون العش منسوجاً حول عيدان قصب مستقيمة، ويوضع عادةً على ارتفاع 0.6 - 1.2 م فوق سطح الماء في حوض قصب. **البيض المحضون:** 4-6 بيوض. **الحضانة:** 15-14 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 170
منطقة النشاط: سبخة الفصل

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

دخلة بصرية*Acrocephalus griseldis*

Basra Reed-Warbler

مهدد بالانقراض

مستقر

مهدد بالانقراض

غير معروف

17 - 18 سم / 12 - 29 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر بصفة أساس في الأراضي الرطبة في جنوب شرق العراق (جنوب نهر دجلة والفرات)، وفي شمال المملكة العربية السعودية والكويت وفلسطين، وربما جنوب غرب إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً في شرق أفريقيا (جنوب الصومال إلى موزمبيق)، ثم يتوجه إلى الجنوب الغربي عبر المملكة. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر محدود. تمر هذه الهاجرة المهددة بالانقراض عبر المملكة بوصفها مهاجرة عابرة، فتدخل المملكة من حول الكويت مسافرة باتجاه الجنوب والجنوب الغربي للخروج من المملكة في مكان ما بالقرب من جازان. كما أنه قد يعيش منها في نهر الرياض (مجرى وادي حائر) ما يصل إلى 20 زوجاً، بيد أن هذا قد لا يحدث كل عام. **الموئل:** يتكاثر هذا الطائر في الأراضي الرطبة ذات عيدان القصب الطويلة وأشجار الطرفاء المجاورة، ويوجد أيضاً أثناء الهجرة في حقول الأعلاف في المنطقة الشرقية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يشمل الحشرات. ومن المفترض أن لديه بيئة رعي مماثلة

لهاجرة القصب الشائعة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل منفرداً، أو في مجموعات متفرقة تتألف من خمسة طيور كحد أقصى. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة. **العش:** فنجان عميق مكوّن من شرائح القصب وأوراقه ورؤوس القصب، ويكون منسوجاً حول ساقين إلى أربع سيقان مستقيمة في حوض قصب. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (9 - 15 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (11 - 15 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مفردة. **حالة الحماية:** غير معروفة هذا النوع لانخفاض سريع للغاية في الماضي (1950 - 2003) عندما جف موئل تكاثره من الأراضي الرطبة والمستنقعات الضحلة. كما أن الجفاف ومشكلات إدارة المياه المستقبالية ما زالت تهدد التعداد الصغير.

تتكاثر هذه الهاجرة، المهددة بالانقراض، بكامل تعدادها تقريباً في الأراضي الرطبة جنوب شرقي العراق قبل أن تهاجر عبر المملكة لقضاء فصل الشتاء في شرق أفريقيا.




مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي حائر)

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

دخلة سافية	الاسم العربي:
<i>Locustella luscinioides</i>	الاسم العلمي:
Savi's Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 - 14 سم / 12 - 21 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال أفريقيا وغرب أوروبا وصولاً إلى كازاخستان، مع تكاثر قلة من أزواجه في شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً في منطقة أفريقيا الساحلية. **حالته بالمملكة: مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر.** تنتشر هازجة الجندب هذه ذات الألوان الهادئة والبسيطة نوعاً ما في جميع أنحاء المملكة خلال موسم الهجرة، رغم أنها غالباً ما تُسجل في الشرق. وأحياناً ما تُسجل خلال فصل الشتاء في الجنوب الغربي. وتتكاثر تعدادات صغيرة منها في حقول القصب الكثيفة، بيد أن هذا قد لا يحدث كل عام. **الموئل:** حقول القصب الكثيفة وغيره من النباتات المائية الطويلة التي تنتشر على نطاق واسع في الأراضي الرطبة الفسيحة، ومنها المستنقعات وأحواض ترسيب مياه الصرف وغير ذلك من الأراضي الرطبة الاصطناعية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً ما الحشرات. إضافة إلى العناكب وصغار القواقع، وهو يربى بين النباتات المنخفضة فيلتقط المواد من سيقان النبات، أو الأرض، أو سطح المياه. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل منفرداً، أو في أزواج، رغم أنه قد تُسجل طيور عدة منه في المنطقة العامة نفسها. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضانة البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل فنجان يتكون من سيقان عشبية منسوجة بإحكام، ومبطن بأوراق الشجر الناعمة والدقيقة ومحاط بطبقة خارجية هشة من أوراق النباتات المائية، وعادةً ما يوضع على ارتفاع أقل من 30 سم فوق سطح الماء (وأحياناً فوق سطح الأرض الجافة) في أجمة من القصب، أو نبات البردي، أو غيرها من النباتات المائية الكثيفة. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 12 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 - 14 يوماً. **الحضانة:** حضانة مزدوجة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10
منطقة النشاط: بحيرات الأحساء




دخلة صخباء	الاسم العربي:
<i>Acrocephalus stentoreus</i>	الاسم العلمي:
Clamorous Reed-warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
18 - 20 سم / 23 - 34 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مناطق متفرقة من وادي النيل وساحل البحر الأحمر مروراً بشبه الجزيرة العربية إلى الصين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال إيران وأفغانستان إلى كازاخستان، ويقضي فصل الشتاء على بُعد 2,500 كم جنوباً في شبه القارة الهندية (وربما أيضاً في شبه الجزيرة العربية). **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع، زائر شتوي محلي.** تتكاثر هازجة القصب الكبيرة هذه، بل تُعدُّ الأكبر ضمن العائلة بأسرها، على طول سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر وفي عديد من الأراضي الرطبة الداخلية. وقد تزور بعض التعدادات المهاجرة خلال فصل الشتاء. **الموئل:** أشجار المانغروف الكثيفة المنخفضة، كما يوجد هذا الطائر داخل اليابسة في الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة وأحواض القصب ومناطق المياه المفتوحة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بصفة أساس على الحشرات. إضافة إلى القواقع واليرقات وصغار الضفادع والبيوض المائية، وهو عادةً ما يربى في مستوى منخفض بين عيدان القصب، أو في الأشجار القريبة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل وهو يربى منفرداً، أو في أزواج، رغم أنه قد توجد طيور عدة منه في المنطقة العامة نفسها. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. مع وجود بعض حالات تعدد الزوجات حيث يعيش ذكر واحد مع عدة إناث. **الأدوار الأبوية:** تؤدي الأنثى معظم أعمال بناء العش والحضانة. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل فنجان كبير وعميق منسوج من العشب والريش

للتدفئة خلال الشتاء، يتميز هذا الطائر بقدرته على زيادة نسبة الدهون في جسمه بسرعة فائقة كل يوم، والتي سرعان ما يفقدها مجدداً بعد بضع ساعات بسبب برودة ليالي الشتاء في المملكة.

والأياف المانغروف أو أوراق القصب، ومدعوم عادةً بثلاثة فروع مستقيمة أو عيدان قصب، ويكون موضعاً على ارتفاع 1.5 - 3 م فوق سطح الأرض، أو المياه في شجرة مانغروف، أو حوض قصب. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 13 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 11 - 14 يوماً. **الحضانة:** أحياناً حضانة مزدوجة.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 2,000
منطقة النشاط: الجبيل




خطاف عجز	الاسم العربي:
<i>Delichon urbicum</i>	الاسم العلمي:
Northern House Martin	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 - 14 سم / 16 - 23 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر هذا الطائر في نطاق يمتد من الجزر البريطانية وشمال أفريقيا إلى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 8,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. هذا الخطاف الجميل الأبيض والأسود شائع ومنتشر في طريق عبوره المملكة، ولكنه لم يُسجَل بالقدر المتوقع رغم مرور الملايين منه كل عام. ومن المفترض أنه يهاجر على ارتفاع عال فوق شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي قد يفسر أيضاً سبب ظهوره فجأة مع اقتراب العواصف والسحب الرعدية. ومن المستغرب ندرته في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة. **الموئل:** جوي بالكامل، ولا ينزل إلى الأرض أبداً خلال الهجرة، يفضل المناطق المليئة بالحشرات الطائرة، مثل الأراضي الرطبة، أو المستنقعات، أو المحاصيل الخضراء، مثل البرسيم. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**

صغار الحشرات الطائرة كالذباب والبعوض والخنافس والنمل والعتن والنحل. ولديه طريقة طيران ثابتة تتسم بكثرة التحويم من دون الانقضاضات والمنعطفات التي يتسم بها طائر السنونو الأكثر منه استعراضاً للحركات البهلوانية الجوية، لكنه غالباً ما يرفع على ارتفاع أعلى، وقد ينضم إلى طيور السمامة للتغذي على ارتفاعات عالية في الهواء. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يرفع منفرداً، أو أحياناً في مجموعة صغيرة (أو قد يصل عدد الطيور إلى 75 طائراً أو أكثر في حالات استثنائية)، لكن من غير المعتاد وجود أكثر من 20 طائراً معاً في المملكة. وغالباً ما يرتبط بأنواع أخرى من نفس عائلته مثل طيور السنونو والسمامة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جرف الطائف




دخلة جندبية شائعة	الاسم العربي:
<i>Locustella naevia</i>	الاسم العلمي:
Common Grasshopper-warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
12 - 13 سم / 11 - 16 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال غرب أوروبا إلى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً، في حين تهاجر التعدادات الشرقية باتجاه الجنوب الشرقي للهند وتهاجر التعدادات الغربية باتجاه الجنوب الغربي لغرب أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، مهاجر متكاثر محتمل. نظراً لاتساع نطاق تكاثره شمال المملكة، فإنه من المستغرب أن يكون هذا الطائر ذو اللون البني الزيتوني مهاجراً عابراً محدوداً عبر المملكة (فبراير - مايو، أغسطس - نوفمبر)، ولم يُرصد إلا في شريط يمر عبر وسط المملكة من الطائف إلى المنطقة الشرقية. وقد تكون ندرته بسبب نطاقات التشتية المفصولة عن بعضها بمسافات واسعة، الأمر الذي يسمح للطيور بالمرور إما شرق شبه الجزيرة العربية، أو غربها. وتغريده ترجيحاً متميز سُجَل مرتين على مدى فترات طويلة، ما يشير إلى أنه ربما يتكاثر أحياناً في المملكة. **الموئل:** يفضل الغطاء النباتي الكثيف في الأراضي الخصبة، مثل مراعي الشجيرات الخفيفة بالقرب من الأراضي الرطبة، أو أراضي المحاصيل ذات السياج والشجيرات، ولكنه قد يوجد في أي مكان خلال موسم الهجرة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** صغار الحشرات والعناكب، إلى جانب القواقع الصغيرة جداً، وهو يرفع في الغطاء النباتي المنخفض، حيث يبحث عن الفرائس من أعلى الساق إلى أسفلها، أو يرفع على الأرض بين أوراق الشجر. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون منفرداً. **سلوك التكاثر:** لم يُسجَل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** حصل هذا النوع على اسمه الشائع واللاتيني -*Locustella* من تغريده ذي الطنين عالي الحدة والشبيه بأزيز الحشرات. في العادة هو نوع متسلل يجلس بهدوء ولا يخرج بسهولة ويتوارى ولو حتى بقطعة صغيرة من الغطاء النباتي الأرضي بالقرب من مراقب. ولكن عندما يتحرك بالفعل، فإنه يتحرك بسرعة كبيرة كالفار خلال النباتات، ويسمح فقط بنظرة خاطفة.

يبدو أن هذا الطائر غير قادر على الهجرة بسرعة عبر الصحاري الكبرى، ولذا عادةً ما يتجنب المملكة، ليظهر إما إلى غرب أفريقيا أو الهند.

يبدو أن هذا الطائر غير قادر على الهجرة بسرعة عبر الصحاري الكبرى، ولذا عادةً ما يتجنب المملكة، ليظهر إما إلى غرب أفريقيا أو الهند.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لم يُسجَل تكاثره (مع إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: سبخة الفصل



سنونو شائع*Hirundo rustica*

Barn Swallow

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

17 - 19 سم / 16 - 24 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أنحاء أميركا الشمالية وأوراسيا (أسفل الدائرة القطبية الشمالية)، ويهاجر حتى 6,000 كم لقضاء فصل الشتاء في أميركا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حتى شمال أستراليا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع جداً. يُعدُّ هذا النوع أحد أكثر الأنواع المهاجرة العابرة شيوماً في المملكة (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر). ويمكن مشاهدته في كل مكان، وغالباً في معظم أوقات السنة. إضافة إلى ذلك، سُجِّل تكاثر عدد قليل منه بالقرب من الرياض مؤخراً. **الموئل:** جوي بالكامل، ولا ينزل إلى الأرض أبداً أثناء الهجرة. ويفضل المناطق التي تحفل بالحشرات الطائرة، مثل الأراضي الرطبة والمحاصيل الخضراء. سلوك البحث عن الغذاء: **النظام الغذائي:** صغار الحشرات الطائرة، خاصة الذباب والمن والبق والخنافس والنمل والنحل التي يصطادها أثناء الطيران، وهو طائر بهلواني جوي ماهر وأنيق يتغذى على ارتفاع أقل من 7 م تقريباً، ولكن يتم رصده في الغالب على ارتفاع متر واحد فقط فوق سطح الأرض.

تُفضل إناث السنونو الذكور

ذات الأشرطة الذيلية الأكبر


(والأكثر تناسقاً)، حتى وإن مثلت

تلك الأشرطة الذيلية الطويلة

(في الواقع لأنها تمثل) عائفاً

ديناميكياً هوائياً.

الزواج اجتماعياً، تعشش في مستعمرات صغيرة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضانة البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل نصف فنجان مصنوع من كريات الطين ومبطن بالعشب الناعم والریش، ويكون ملتصقاً بسطح رأسي، عادةً أسفل جزء ناتئ من جرف صخري، وكذلك أسفل جسر أو فوق مبنى. وغالباً ما تلامس الأعشاش بعضها بعضاً. ويُعاد استخدام العش غالباً في السنوات اللاحقة ويمكن أن يدوم استخدامه لمدة 12 سنة (أو لمدة 48 سنة في بعض الحالات الاستثنائية). **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض. **الحضانة:** 13 - 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 18 - 27 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 5**منطقة النشاط:** أي مدينة أو بلدة في أبريل**سنونو أحمر عجز***Cecropis daurica*

Red-rumped Swallow

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

17 - 19 سم / 16 - 29 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب شبه الجزيرة العربية والهند إلى إندونيسيا. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أفريقيا وجنوب غرب أوروبا إلى اليابان، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً، خاصة في نطاق إقامتها. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع، مهاجر عابر غير شائع. ينتشر هذا الطائر بهلواني على نطاق واسع في المملكة خلال الهجرة (فبراير - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)، ويتكاثر في المرتفعات الجنوبية الغربية جنوب الطائف. **الموئل:** يتكاثر عادةً على ارتفاع يتجاوز 1,200 م في المناطق الصخرية الجرداء قرب الجروف الصخرية والمنحدرات المشجرة، وهو يفضل أيضاً، الأماكن التي تنتشر فيها الحشرات الطائرة، خاصة فوق الحقول والأراضي الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء:** **النظام الغذائي:** يتغذى بصفة رئيسة على الحشرات الطائرة، مثل النمل الطائر والخنافس والذباب والبق والنمل الأبيض (الأرضة) التي يلتقطها عادةً أثناء الطيران، سواء على مستوى منخفض فوق النباتات الخضراء أو على مستوى مرتفع في الهواء. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يسجل وهو يريعى منفرداً، أو في أزواج، أو

غالباً ما تعشش طيور

السنونو وطيور الخفاف في

مبانٍ معزولة، وإحدى مزايا هذا

السلوك هي حماية أعشاشها

من طيور الوقواق التي لا تدلف

إلى المنشآت البشرية.

في مجموعات صغيرة من 3 - 6 طيور، ولكن

أحياناً تم تسجيله في أسراب تتألف من 100

طائر كحد أقصى منها أنواع أخرى من طيور

السنونو. **سلوك التكاثر:** **نظام التزاوج:**

أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً.

الأدوار الأبوية: يتشارك الزوجان مسؤوليات


بناء العش وتحضين البيض ورعاية الفراخ.

العش: على شكل صحن من كريات الطين الممتدة في جانب لتشكيل فوهة مدخل

مستطيلة، ويكون مبطناً بالریش والشعر، ويوضع عادةً على ارتفاع يراوح بين متر واحد

إلى مترين فوق سطح الأرض (قد يصل ارتفاعه أحياناً إلى 20 م) وملتصقاً بالجانب

السفلي من سطح أفقي (كصخرة معلقة، أو سقف كهف، أو جسر، أو قناة مائية، أو داخل

مبنى مهجور). **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:**23 - 25 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.

مقيم متكاثر، مهاجر عابر


الأزواج المتكاثر سنوياً: 22,000**منطقة النشاط:** تنومة

خطاف الشواهدق الأوروبي

الاسم العربي:	خطاف الشواهدق الأوروبي
الاسم العربي الآخر:	عوهق جرفي أوراسي
الاسم العلمي:	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
الاسم الشائع:	Eurasian Crag Martin
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	15 سم / 17 - 33 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى العراق، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من جنوب أوروبا حتى الصين، وتهاجر لقضاء فصل الصيف حتى 2,500 كم جنوباً على امتداد وادي النيل والهند ونيبال. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. بوصفه سيد بيئته الجوية، فإن هذا الطائر البني الصغير مهاجر عابر غير شائع في شتى أنحاء المملكة (مارس - أبريل، أكتوبر - نوفمبر) بتعدادات صغيرة تم تسجيلها في المناطق كافة. وكان الاعتقاد السائد سابقاً، أنه يتكاثر في المرتفعات الغربية، ولكن لم يتم تأكيد هذا الأمر قط. **الموئل:** الجبال والجروف الصخرية والمياه الداخلية التي تتسم بوجود الفراش من الحشرات الجوية واسعة الانتشار. كما يوجد في المزارع المروية والمواقع الساحلية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** صغار الحشرات الجوية، لا سيما الذباب والبق والخنافس، إلى جانب العنكب التي يلتقطها أثناء الطيران، وهو يربى أمام الجروف الصخرية وعلى طول الوديان وكذلك على ارتفاع عال فوق الأراضي التي تحفل بطيور السنونو الأخرى. إنه طائر بطيء جداً، بل متثاقل، يتميز بقلعة ررفة الجناحين وطول التحويم، وغالباً ما يبقى بالقرب إلى جانب جرف صخري، حتى يستغل ذيله المتشعب قليلاً للسيطرة والتيارات الصاعدة للتقليل من الطاقة المستخدمة عند الانعطافات المفاجئة التي يجريها غالباً لصيد الحشرات. كما يلتقط الفراش أيضاً من الأسطح المائية، ولكنه لا يحط على الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما تنتقل هذه الطيور منفردة، أو في مجموعات صغيرة يصل عدد أفرادها إلى عشرة أو نحو ذلك، وغالباً ما تكون برفقة طيور السنونو الأخرى. **سلوك التكاثر:** لم يتم تأكيد تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** الوضع الحقيقي لهذا النوع غير مؤكد نظراً لاحتمال الخلط بينه وبين الطائر المقيم الشائع «خطاف الشواهدق الباهت».



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لم يُسجَل تكاثره (مع إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: جبل السودان



خطاف الشواهدق الباهت

الاسم العربي:	خطاف الشواهدق الباهت
الاسم العربي الآخر:	عوهق جرفي فاتح
الاسم العلمي:	<i>Ptyonoprogne obsoleta</i>
الاسم الشائع:	Pale Rock Martin, Pale Crag Martin
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	بتزايد
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	13 - 16 سم / 16 - 30 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في نطاق يمتد من شمال أفريقيا مروراً بالجزيرة العربية حتى باكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من إيران إلى باكستان، وتهاجر لقضاء فصل الشتاء حتى 300 كم جنوباً في نطاق إقامتها. وقد تم التعرف إلى ثمانية أنواع فرعية منه، ثلاثة في المملكة العربية، وأحدها *P. o. perpallida* المتوطن إلى حد كبير في شمال شرق المملكة، رغم أنه يتكاثر أيضاً بشكل غير منتظم في جنوب العراق. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يتكاثر هذا الخطاف الباهت في معظم أنحاء غرب المملكة وفي المنطقة الشرقية. ويتوغل شرقاً بشكل أكبر خلال الشتاء. **الموئل:** يتكاثر على ارتفاع دون 2,800 م في المناطق ذات الجوف والنتوءات الصخرية وبشكل متزايد على المباني والمنشآت، حتى في المناطق الحضرية المزدهمة. ويرعى في أي مكان تتوافر فيه الحشرات الطائرة بكثرة، مثل الأراضي الرطبة والمناطق الزراعية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الطائرة التي يلتقطها في الهواء، وعادةً في حدود متر واحد من جرف صخري، أو جبل بينما يحوم ذهاباً وإياباً على طول صفحة جرف أو مبنى.

قد لا يظهر هذا الطائر، بلونه

الرملي الباهت، بين الحشود،

ولكن هنا تكمن قوته؛ فهو

يحيّر مفترسيه بالاختلاط

في جبال الجزيرة العربية

المصبوغة بلونه أيضاً.

النشاط: شفقي. **السلوك الاجتماعي:**

عادةً ما يوجد في أزواج، أو مجموعات صغيرة،

مختلطاً بأنواع أخرى من طيور السنونو.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة

مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وشديدة الهيمنة على منطقتها حول العش. **الأدوار**

الأبوية: يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:**


على شكل نصف فنجان مفتوح مصنوع من كريات الطين ومبطن بالعشب الناعم

والريش وأحياناً الشعر والصوف وزغب النبات، ويكون ملتصقاً بسطح رأسي، عادةً أسفل

نتوء من جرف صخري، أو أسفل جسر أو فوق مبنى (لا سيما أسفل رف صخري، أو شرفة).

وغالباً ما يُعاد استخدام العش في السنوات اللاحقة. **البيض المحضون:** 3 بيوض.

الحضانة: 17 يوماً. **مدة التعشيش:** 19 - 21 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 75,000

منطقة النشاط: جبل الحمراء (بالقرب من جدة)



بلبل أبيض الأذن*Pycnonotus leucotis*

White-eared Bulbul

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

19 - 18 سم / 29 - 35 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في نطاق يمتد من جنوب العراق وشرق شبه الجزيرة العربية إلى شمال غرب الهند. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يوجد من هذا الطائر الصغير المزعج تعداداً قائم منذ عهد طويل في المنطقة الشرقية، التي شملتها التنمية بالتوسع الحضري. وليس من الواضح إذا كان هذا التعداد مُدخل أو هو نوع أصيل، ولكن قد تم تسجيله في الهفوف منذ عام 1923 على الأقل. وفي عام 1981، استوطن هذا الطائر الرياض وأصبح فيها الآن شائعاً، كما يوجد في مناطق أخرى عديدة، منها جدة وتبوك والجوف مع احتمال المزيد من الانتشار. **الموئل:** البساتين والحدائق (حتى في المدن الكبرى) والمزارع والشجيرات المحيطة بالقرى. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الفاكهة والبراعم والرحيق واللافقاريات ومنها اليرقات والنمل والأرضة. وهو متعايش مع البشر ويتغذى على بقايا الطعام الصغيرة مثل فئات الخبز. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل في أزواج، أو مجموعات صغيرة تتألف من 5 - 6 طيور، أو في أسراب صغيرة أحياناً من 20 - 30 طائراً. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض بينما يتولى الذكر حراستها. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل فنجان غير مرتب منسوج من العشب والغصينات الرقيقة والجذور وأحياناً الخيط أو الصوف أو الورق، ومبطن بالأعشاب الدقيقة والجذيرات والشعر، ويكون موضعاً على ارتفاع يراوح بين متر واحد إلى مترين فوق سطح الأرض (وقد يصل ارتفاعه أحياناً إلى 7 م) في شجرة، أو شجيرة، أو سعف نخلة، أو في بعض الأحيان فوق مبنى. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 10 - 12 يوماً. **مدة التعشيش:** 9 - 11 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 140,000

منطقة النشاط: الظهران

**خطاف رملي***Riparia riparia*

Collared Sand Martin, Sand Martin

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

غير معروف

12 سم / 11 - 20 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في أنحاء أمريكا الشمالية وأوراسيا (جنوب الدائرة القطبية الشمالية). بينما يقضي هذا الطائر فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 8,000 كم جنوباً في أمريكا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً. يُعدُّ هذا الخطاف الصغير مهاجراً عابراً شائعاً جداً وواسع الانتشار في أنحاء المملكة، ويتميز بهجرته الطويلة إلى حد ما، وأحياناً ما يعبر بأعداد كبيرة. فقد تم تسجيل ما يزيد على 2,000 منه في بحيرة دومة الجندل، في 24 أبريل خلال إحدى السنوات، ووجود 1,000 في المكان ذاته في 26 مايو. ويمكن مشاهدة أعداد قليلة منه في الشتاء، ولكن يبدو أن هذه التعدادات طيور شاردة. **الموئل:** يمكن أن يوجد في أي مكان أثناء الهجرة، ولكنه يفضل الأماكن التي تكثر فيها الحشرات الطائرة، مثل الأراضي الرطبة والمحاصيل الزراعية ومقالب النفايات.

تتمتع الخطافات وطيور

السنونو بصبر استثنائي

شديد الحساسية للحركة،

ما يمكنها من اصطيد

الحشرات الصغيرة سريعة

الطيران في الهواء.

السلوك الاجتماعي:

عادةً ما يهاجر ويتغذى


في مجموعات صغيرة تتكوّن من 30 كحدٍ أقصى وتختلط بحرية مع طيور سنونو

أخرى، رغم أنه تم تسجيل مجموعات يزيد عدد أفرادها على 2,000 طائر. **سلوك التكاثر:**لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر سريع نسبياً في الطيران، إذ يتميز برفقة

سريعة من جناحيه لكنها سطحية، وعلى الرغم من نشاطه الدائم، إلا أن طريقته

في الطيران تتسم إلى حد ما بكثرة الرفرفة، غير أنه يفتقر إلى رشاقة طائر السنونو، أو

ثبات التحويم لدى الخطافات الأخرى.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: دومة الجندل

نقشارة الغاب

دخلة غابية	Phylloscopus sibilatrix
Wood Warbler	غير مهدد
يتناقص	–
–	–
12 سم / 6.4 - 15 غم	


الاسم العربي:	دخلة غابية
الاسم العربي الآخر:	Phylloscopus sibilatrix
الاسم العلمي:	Wood Warbler
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	يتناقص
المنحى العالمي للمجموعة:	–
حالة الحماية الإقليمية:	–
المنحى الإقليمي للمجموعة:	–
الحجم والوزن:	12 سم / 6.4 - 15 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من الجزر البريطانية إلى شمال كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً في غابات أفريقيا الاستوائية. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر نادر.** يُعد طائر النقشارة الجميل هذا ذو اللون الأصفر الفاقع الضارب إلى الخضرة مهاجراً عابراً نادراً، لكنه ينتشر في جميع أنحاء المملكة، وأكثر ما يكون انتشاراً في أكتوبر. وقد تم تسجيل وجوده في تبوك وينبع والمرتفعات الجنوبية الغربية وسكاكا والرياح والظهران، لذلك فمن المحتمل أنه يهاجر على نطاق واسع عبر المملكة. **الموتل:** يمكن أن يوجد في أي شجيرة خلال الهجرة، غير أنه يفضل النباتات الخضراء النضرة بالقرب من الأراضي الرطبة والبساتين ومنتزهات المدن والحدائق. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات غالباً، لا سيما الذباب والبق والرعاشات والبعث، إضافة إلى اليرقات والعناكب والفاكهة والتوت، وهو يربى بنشاط في الفروع العلوية للأشجار والشجيرات حسب تفضيله، ولكنه في المملكة

تُعد طيور نقشارة الغاب تغريدات جميلة وبعديد من السياقات المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، يشكّل غناء الذكر بسرعة أكبر لدى اقتراب أي منافس إعلاناً فعلياً للحرب.

غالباً ما يضطر إلى الاكتفاء بأي شجيرات متوفرة، وعادة ما يتمغن في فحص أوراق الأشجار ولحائها وفروعها، وقد يحوم حولها لالتقاط فريسة ما، أو الهجوم عليها. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل منفرداً، أو في أسراب مهاجرة صغيرة تضم 15 طائراً كحد أقصى. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عند مقارنة طائر النقشارة هذا عن كثب بالأنواع الأقرب صلة به، سيلاحظ أن هذا الطائر كبير نسبياً، وقد يُقَي أجنحته منخفضة قليلاً. كما أنه يميز نفسه عن عديد من طيور نقشارة الأخرى بعدم خفق الجناحين وهز الذيل. ومن طبع هذا الطائر التوارى عن الأنظار، لذلك يمكن إغفاله بسهولة.

**بلبل أصفر العجز**

كعيت	Pycnonotus xanthopygos
White-spectacled Bulbul, Yellow-vented Bulbul	غير مهدد
يتزايد	–
–	–
19 سم / 31 - 46 غم	

الاسم العربي:	كعيت
الاسم العربي الآخر:	Pycnonotus xanthopygos
الاسم العلمي:	White-spectacled Bulbul, Yellow-vented Bulbul
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	يتزايد
المنحى العالمي للمجموعة:	–
حالة الحماية الإقليمية:	–
المنحى الإقليمي للمجموعة:	–
الحجم والوزن:	19 سم / 31 - 46 غم



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في نطاق يمتد من شبه الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة واليمن) حتى الشام شمالاً، ووصولاً إلى جنوب تركيا. وتضم شبه الجزيرة العربية أكثر من 90% من نطاقه العالمي. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر واسع الانتشار.** يوجد هذا الطائر الصغير الجميل في جميع أنحاء المناطق الغربية، بجانب مناطق أخرى شرق حائل والرياض. **الموتل:** الوديان الشجيرية وشجيرات الطلع والأجمات والمزارع وبساتين النخيل، كما يوجد في المتنزهات والحدائق في القرى والضواحي، وأحياناً في وسط المدن. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غالباً الفاكهة، إضافة إلى البذور واللافقاريات. وأحياناً يصطاد الحشرات في مطاردة جوية. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل في أزواج أو في مجموعات من 20 طائراً بحد أقصى في مصادر الغذاء الغنية. وقد تتشكل أسراب أكبر في نهاية موسم التكاثر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش، ويشارك كلا الطائرين البالغيين في الحضنة والاعتناء بالصغار والدفاع بصرارة عن منطقة السيادة. **العش:** على شكل فنجان غير مرتب، منسوج عادة من سيقان النبات والأعشاب والغصينات (أحياناً خيوط العنكبوت والخيوط العادي والورق والشعر والصوف)، ومبطن بالأعشاب الدقيقة والجذيرات ويوضع عادة على ارتفاع 2 - 3 م فوق سطح الأرض (10 - 5 م أحياناً) في شجيرة أو شجرة، أو فوق مبنى أحياناً. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.

يقتصر وجود هذا الطائر على شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط فحسب، ويُعد من أكثر الطيور انتشاراً في الوديان والغابات في غرب المملكة.




نقشارة

دخلة شائعة	الاسم العربي:
<i>Phylloscopus collybita</i>	الاسم العربي الآخر:
Common Chiffchaff	الاسم العلمي:
غير مهدد	الاسم الشائع:
يتزايد	حالة الحماية العالمية:
-	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
11 - 12 سم / 6 - 11 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة في جنوب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا إلى بحر قزوين، وتهاجر لقضاء فصل الشتاء حتى 4,000 كم جنوباً في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً، زائر شتوي شائع. يُعدُّ طائر النقشارة هذا البسيط إلى حد ما مهاجراً عابراً شائعاً ومنتشراً وذاً شتوياً في جميع أنحاء المملكة، ومنها المرتفعات الجنوبية الغربية. **الموائل:** الحدائق والمنتزهات والبساتين أو أيّ موقع توجد فيه أشجار وشجيرات نامية تحتية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات وبيوضها ويرقاتها، والمفصليات الأخرى، إلى جانب الرخويات الصغيرة، ويقطع على بعض البذور والتوت في الخريف، وهو يحوم لالتقاط فريسته، وفي بعض الأحيان يصطادها أثناء الطيران، وهو طائر رشيق يتحرك أثناء بحثه عن الغذاء للأمام خلال أوراق الشجر بحركة متقطعة كثيرة الرفرفة، ويستغل كل مستويات أوراق الشجر من قمم الأشجار إلى الشجيرات النامية تحتها ويقوم بزيارات قصيرة إلى الأرض للتغذي، ومن عادته خفق جناحيه وهز ذيله، ربما لإخافة فرائسه من الحشرات وطردها من بين أوراق الشجر. **النشاط:** نهارى.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: متنزه الدفي (الجبيل)



شأنه شأن عديد من الجوائم المهاجرة، تكون ذكوره أكبر حجماً وأكثر هيمنة على الإناث، لذا تهاجر الإناث إلى مواقع أبعد تقضي فيها الشتاء تجنباً لمنافسة الذكور.

ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** قد تتغذى مجموعات صغيرة معاً في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** حصلت طيور النقشارة على اسمها «الشفشافة» من تغريدتها المتميزة والمتكررة التي تشبه صوتاً على هيئة «شفشاف». يُذكر أنه يوجد تداخل بسيط في توقيت وجود هذا النوع ونوع آخر شبيه به وهو نقشارة الصفصاف.

دخلة صفصافية


<i>Phylloscopus trochilus</i>	الاسم العربي:
Willow Warbler	الاسم العلمي:
غير مهدد	الاسم الشائع:
يتناقص	حالة الحماية العالمية:
-	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
11 - 13 سم / 6.3 - 15 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر ضمن منطقة شاسعة تمتد من غرب أوروبا إلى شرق سيبيريا، بينما يقضي التعداد بأسره فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 12,000 كم جنوباً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يعني أن ملايين الطيور المعششة في آسيا تمر عبر المملكة العربية السعودية. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع جداً. يُعدُّ طائر النقشارة الجميل والصغير هذا، مهاجراً عابراً شائعاً وينتشر (أبريل - مايو، سبتمبر) في شتى أنحاء المملكة، خاصة في فصل الربيع، حيث يغلب العثور على المئات منه في المناطق الشجرية. **الموائل:** الأشجار الطويلة والشجيرات النامية تحتية والمناطق ذات الغطاء الشجري والشجيرات الساحلية وأحواض القصب والمنتزهات والحدائق، أو أي مكان يغطاه نباتي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بصفة أساس الحشرات، وبيوضها ويرقاتها والعناكب. إضافة إلى بعض المواد النباتية، مثل التوت في فصل الخريف. ويتحرك بين فروع

يُعدُّ هذا الطائر أحد أعظم الطيور المهاجرة في العالم. فرغم وزنه الذي لا يتعدى 10 غم فقط، إلا أنه يطير مسافات تصل إلى 24,000 كم في كل عام، والملايين منه تعبر المملكة مصدرة تغريدات جميلة على طول الطريق.

الأشجار بسرعة كبيرة، مواصلاً تفحص الأوراق والشقوق. ويلتقط قوته من أوراق الشجر، وفي بعض الأحيان يتحسسها بحثاً عن الفريسة في حركة مستمرة على ما يبدو. كما يصطاد فريسته أثناء الطيران ويحوم لالتقاطها. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل في مجموعات مهاجرة متفرقة تضم أحياناً مئات عدة من الطيور. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر النشاط «البنّي الصغير» (مصطلح يعني: صعب التمييز) يظهر تقريباً في كل مكان، بالمناطق الخضراء في أواخر فصل الربيع، وعادة ما يكون هادئاً ولا يغرد أثناء الهجرة، وغالباً ما يهز ذيله بشكل رأسي.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: تبوك



دخلة غابية بنية*Phylloscopus umbrovirens*

Brown Woodland-warbler

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتناقص

11 سم / 8.5 - 11 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق أفريقيا (من إريتريا باتجاه الجنوب إلى تنزانيا)، وفي جنوب غرب الجزيرة العربية. وقد تم التعرف إلى تسعة أنواع فرعية منه، أحدها «*S. u. yemenensis*»، وهو طائر مستوطن في شبه الجزيرة العربية ولا يوجد سوى في جنوب غرب المملكة وغرب اليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. إن هذا الطائر الصغير والبدين ذا المنقار الرفيع لا يقطن سوى المرتفعات الجنوبية الغربية، إلى الجنوب من مدينة الطائف. **الموئل:** عند ارتفاع يتجاوز 1,800 م في المناطق وفيرة الظل في غابات العرعر، أو غابات الطلح الكثيفة والأرض ذات الشجيرات المنخفضة بمنطقة الجرف الغربي الرطب. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات والعناكب التي يلتقطها من قمم الأشجار وأغصان الشجيرات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يسجل سلوكه منفرداً، أو في أزواج، أو أحياناً في مجموعات صغيرة تتألف من خمسة طيور كحد أقصى. وأحياناً ما يشكل



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40,000

منطقة النشاط: تنومة

**دخلة سيبيرية***Phylloscopus tristis*

Siberian Chiffchaff, Common Chiffchaff

غير مهدد

غير معروف

-

-

11 - 12 سم / 6 - 11 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في معظم أنحاء سيبيريا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 - 7,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمال الهند. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر جداً. يُعدُّ هذا النوع الذي تم التعرف إليه حديثاً، زائراً شتوياً نادراً للغاية في المملكة، أو ربما من الأنواع الشاردة. **الموئل:** الحدائق والمنتزهات والبساتين، أو المواقع التي تنمو فيها الأشجار والنباتات بشكل ملحوظ. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف. لكن

من المرجح أنه يشمل الحشرات وبيوضها ويرقاتها، إلى جانب مفصليات الأرجل الأخرى. كذلك التوت والبيذور في الشتاء. وعلى الأرجح يحوم هذا الطائر لالتقاط الفريسة، وقد ينجم في اصطليدها أحياناً. قد يكون رشيقاً في طيرانه، حيث يقوم بحركات متقطعة ومفاجئة بينما يرفرف بجناحيه عبر أوراق الشجر بحثاً عن الطعام. وسيكون من المثير للاهتمام ملاحظة ما إذا كان هذا النوع يستغل جميع مستويات أوراق الشجر، بدءاً من قمم الأشجار حتى الشجيرات التي تنمو هنا وهناك (كما تفعل طيور النقشارة عموماً)، أو ما إذا كان يختص بمستوى نباتي معين. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** غير معروف، ولكن يحتمل أن يوجد في مجموعات رعي صغيرة خلال الشتاء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا النوع كان يُعدُّ سابقاً نوعاً فرعياً من النقشارة، وقليلة جداً هي البيانات بشأن هذا النوع الذي عُرف حديثاً في المملكة.

سبب تسمية هذا النوع من الطيور بـ «شفشافة» يرجع إلى تغريدتها المتميزة والمتكررة التي تشبه صوت «شيف - شاف». جدير بالذكر أن طائر الدخلة السيبيرية وطيور النقشارة عموماً، لا تستجيب لتغريدات بعضها بعضاً.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل



أبو قلنسوة

هاجرة قلنسوة أوراسية
Sylvia atricapilla
Eurasian Blackcap
غير مهدد
يتزايد
غير مهدد
غير معروف
14 سم / 8.5 - 31 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر أبو قلنسوة




أنثى أبو قلنسوة

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة في شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من أوروبا إلى شرق روسيا وتهاجر لقضاء فصل الشتاء حتى 6,000 كم جنوباً حول منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي شرق أفريقيا وغربها. ويتجنب هذا الطائر الصغير التحليق فوق البحر الأبيض المتوسط، حيث يهاجر إما عبر مضيق جبل طارق إلى غرب أفريقيا، أو عبر الجزيرة العربية حتى يصل إلى شمال أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي نادر، مهاجر متكاثر محتمل. يُعدُّ هذا الطائر المبهج مهاجراً عابراً شائعاً ومنتشراً. وقد يقضي فصل الشتاء في ينبع وغيرها من المناطق الساحلية المعتدلة الأجزاء على البحر الأحمر. ويمكن سماع تغريده أحياناً في الربيع، ما يشير إلى أنه قد يتكاثر أحياناً بالمملكة. **الموئل:** المنتزهات والحدائق والبساتين، أو أي مناطق شجيرية ذات غطاء نباتي جيد. **سلوك البحث عن الغذاء:** يتغذى بصفة أساس على الحشرات

خلال موسم التكاثر، ولكن أثناء الهجرة في السعودية يقات على أنواع شتى من الفاكهة، بما فيها توت اللاتانا والأراك التي يتلغها كاملة، غير أنه ينقر في الفاكهة الأكبر حجماً على الأشجار، ومنها التمر. ويتغذى في مظلة الأشجار أكثر من أسفلها، ونادراً ما يتناول طعامه وهو على الأرض. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يتم رصده منفرداً، أو في مجموعات مهاجرة صغيرة. وقد تصل مجموعة ما منه تتألف أحياناً من 50 طائراً، أو أكثر إلى منطقة صغيرة بشكل مفاجئ في حال تعطلت الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، لكن ذلك قد يكون ممكناً. **ملاحظة:** بينما يمتلك الذكر بالتاكيد قلنسوة متميزة باللون الأسود، تمتلك الأنثى بالمثل قلنسوة متميزة ضاربة للحمرة. وعند استشعار الخطر قد يرفع كليهما القلنسوة لتتخذ شكل تاج صغير ويطلقان نداءات على هيئة صوت «تاك تاك».

صغار الطيور في هجرتها الأولى لا تعتمد على الاستدلال المغناطيسي لمجال الأرض فحسب، بل على الشمس والنجوم للاهتداء في طريقها من مواطنها الأصلية حتى تستقر في الأماكن المعتدلة للتكاثر ووضع البيوض.

أكثر إلى منطقة صغيرة بشكل مفاجئ في حال تعطلت الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية. **سلوك التكاثر:** لم يُسجل تكاثره في المملكة، لكن ذلك قد يكون ممكناً. **ملاحظة:** بينما يمتلك الذكر بالتاكيد قلنسوة متميزة باللون الأسود، تمتلك الأنثى بالمثل قلنسوة متميزة ضاربة للحمرة. وعند استشعار الخطر قد يرفع كليهما القلنسوة لتتخذ شكل تاج صغير ويطلقان نداءات على هيئة صوت «تاك تاك».



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لم يُسجل تكاثره (مع

إمكان حدوثه)

منطقة النشاط: أيها

**نممة الشجر**

دخلة شجيرية
Scotocerca inquieta
Streaked Scrub-warbler
غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
مستقر
10 سم / 6 - 10 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال أفريقيا والجزيرة العربية إلى باكستان وأوزبكستان. وتم التعرف إلى ثمانية أنواع فرعية منه، اثنان منها مستوطنان في شبه الجزيرة العربية؛ ونوع *S. i. buryi*، في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وغرب اليمن، ونوع *S. i. grisea*، في غرب المملكة العربية السعودية وشرق اليمن وسلطنة عُمان. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يُوجد هذا الطائر المخطط والجميل ذو الحجم الصغير بصفة رئيسة في المرتفعات الغربية والنفود الكبير والحرث الشمالية. **الموئل:** الوديان الصخرية وسفوح التلال ذات أشجار الطلح والشجيرات الأخرى، بما فيها الشجيرات المنخفضة وغابات العرعر ذات المناطق الصخرية المفتوحة في عسير، وكذلك الكثبان المغطاة بالشجيرات المنخفضة بمنطقة النفود الكبير والحرث الشمالية. كما يوجد أحياناً في الحدائق والمناطق المزروعة. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى بصفة أساس على الحشرات ويرقاتها، فضلاً عن العناكب وصغار القواقع.

كما يبحث عن البذور، خاصة في الشتاء. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يربى منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات عائلية أثناء موسم التكاثر، أو في أسراب صغيرة في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:**

نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وأحياناً يحتفظ بشريكه لمواسم متتالية. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** قبة مصنوعة من العشب وبعض الغصينات الرفيعة بمدخل جانبي، ويتم تبطينها بشكل كثيف بالريش والفراء وزغب النبات، وتشيد على ارتفاع 0.5 - 2 م فوق سطح الأرض في شجيرة. كما من شأن هذا الطائر أن يتخذ موقعا غير تقليدي، على سبيل المثال، في شقِّ جدار مدرج حجري. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 13 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 300,000

منطقة النشاط: تنومة



هاجرة صحراوية آسيوية*Sylvia nana*
Asian Desert Warbler

غير مهدد

مستقر

-

-

12 سم / 7 - 11 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من بحر قزوين إلى غرب الصين، ويقضي الشتاء على بُعد 4,000 كم باتجاه الجنوب الغربي (وهكذا يتجنب جبال الهيمالايا) في شمال شرق أفريقيا مروراً بالجزيرة العربية حتى شمال غرب الهند. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، زائر شتوي شائع. جزء كبير من التعداد العالمي لهذه الهاجرة الصحراوية الآسيوية الصغيرة ذات العينين الصفراوين الثاقبتين والذيل المنتصب تقضي الشتاء في أنحاء السهول القاحلة، بما فيها تهامة وجزر فرسان. وقد أشارت إحدى الدراسات الاستقصائية إلى احتمالية أن نحو 48,000 طائر قد تقضي الشتاء في الربع الشمالي من المملكة فقط. **الموئل:** السهول القاحلة ذات النباتات القليلة المتناثرة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات والبذور والتوت التي يلتقطها على ارتفاع - أو في حدود - متر واحد من سطح الأرض. قد يبدو على هذا الطائر الصغير أنه غير مؤهل للحياة في الصحراء خلال فصل الشتاء، لكن هذا الموئل، في واقع الأمر، مناسب له تماماً كما لو أنه في موطنه، حيث يتنقل فيها بنشاط هائل، وينطلق مسرعاً فوق سطح الأرض مباشرة بين الشجيرات مستعيناً بجناحيه اللذين يحدثان طنيناً مسموعاً. ودائماً ما يحط على السطح قبل أن يقفز داخل شجيرة ما، ويبدأ بالبحث عن الغذاء بإمعان فيها، وعلى الأرض الجرداء القريبة، وغالباً ما يبدو أشبه بفأر صغير

لدى هذه الهاجرة الصغيرة عادةً غريبة تتمثل في الرعي بالقرب من طيور الأبلق؛ وربما يكون السبب وراء ذلك هو أنها تستفيد من يقظة الأبلق الزائدة نحو المفترسات.

أكثر من كونه طائراً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يرضى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** لدى هذا الطائر عادةً غريبة تتمثل في اتباع الجوائم الصحراوية الأخرى، خاصة طيور الأبلق، وفي جميع الأوقات يبقى بعيداً عن الطائر الآخر في حدود 10 م تقريباً، ويواصل تناول طعامه إلى أن يتحرك طائر الأبلق، عندئذ يلاحقه ليبقى قريباً منه. من المفترض أن هذا الطائر يستفيد من قدرات طائر الأبلق في إيجاد الطعام، أو حتى في تحزي الكائنات المفترسة.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الدبدبة

**هاجرة حدائقية***Sylvia borin*

Garden Warbler

غير مهدد

يتناقص

-

-

14 سم / 16 - 22 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا إلى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 7,000 كم جنوباً في جنوب أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. يقطع هذا الطائر الصغير، مسافات طويلة غير عادية، وهو غير شائع ولكنه منتشر في جميع أنحاء المملكة أثناء عبوره. كما أن هناك توثيقاً واحداً لطيور منه تقضي فصل الشتاء في ينبع. **الموئل:** يمكن أن يوجد في أي مكان أثناء موسم الهجرة، خاصة البساتين والمناطق الحرجية الكثيفة. حتى أنه تم رصد طيور متعبة، وهي تستريح بين النباتات المتناثرة على الكثبان الرملية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات ويرقاتها. إضافة إلى مفصليات الأرجل أخرى، ويأكل أيضاً، حبات التوت الصغيرة وينقر في الفاكهة الأكبر حجماً. كذلك يتناول حبوب اللقاح والرحيق. كما أنه يبحث عن الطعام في أوراق الشجر والغصينات التي تكون أقل من 5 م، وأحياناً يعتمد إلى مطاردة الحشرات أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يسجل بشكل فردي، أو مثنى عند الهجرة.

يزداد حجم الجزء المستخدم من دماغ هذا الطائر في معالجة المعلومات المكانية (the hippocampus) أثناء موسم الهجرة للتكيف مع الاحتياجات الملاحية القصوى.


في إطار مشروعات التحجيل، ولكن حتى مراقبي الطيور المحنكين ذوي الخبرة في الموقع ذاته، لا يمكنهم سوى رؤية عدد قليل جداً منه. يتسم هذا الطائر بكونه غير نشط. وعندما يطير بين الأشجار الحرجية يبدو من طريقة طيرانه وثقاً، لكنه سرعان ما يختفي مجدداً للبحث عن منطقة حرجية كثيفة كلما أمكنه ذلك.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران



هاجرة عربية	الاسم العربي:
<i>Sylvia leucomelaena</i>	الاسم العلمي:
Arabian Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
16 سم / 11 - 16	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد على ضفتي البحر الأحمر، من الصومال إلى جنوب غرب مصر غرباً، وفي غرب وجنوب الجزيرة العربية شرقاً، مع وجود تعداد مستقل في فلسطين والأردن. ويغض النظر عن اسمه، فإن هذا النوع ليس متوطناً في شبه الجزيرة العربية. وقد تم التعرف إلى أربعة أنواع فرعية منه، أحدها *C. l. leucomelaena* المتوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد في غرب المملكة واليمن وجنوب غرب سلطنة عُمان. **حالته بالمملكة:** مقيم، متكاثر شائع. تم العثور على هذا الطائر أسود الرأس جنوب منطقة العلا في شمال الحجاز، ولا أثر له في جزر البحر الأحمر. **الموئل:** عند ارتفاع يقل عادةً عن 2,000 م (رغم إمكانية رصده على ارتفاعات تصل إلى 2,800 م في المناطق وفيرة الظل) في شجيرات الطلع الكثيفة في المناطق القاحلة، خاصة سفوح التلال المغطاة بالشجيرات المنخفضة.

يُعَدُّ هذا النوع الهاجرة المتكاثرة الأوسع انتشاراً في المملكة، وتُصدر ذكوره المناطقية تغريداتها الصادحة التي تبعث على الابتهاج، دون تحفظ من قِدم الأشجار والشجيرات.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يشمل بصفة أساس الحشرات ومفصليات الأرجل الأخرى، إلى جانب التوت. يلتقط الحشرات من أوراق الشجر واللحاء في قمم الأشجار والشجيرات الأطول. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجَّل في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كل من

الطائرَيْن البالغين في بناء العش، وحضانة الفراخ والاعتناء بهم والدفاع عن منطقة السيادة. **العش:** على شكل فنجان من الغصينات الرفيعة والأعشاب والألياف، الممزوجة بالشعر وخيوط العنكبوت، وهو مبطن بالأعشاب الدقيقة والجزيرات والشعيرات، ويكون موضوعاً على ارتفاع يراوح بين متر واحد إلى 1.5 م، أو أحياناً على ارتفاع يزيد على 3 م فوق سطح الأرض في الفروع الخارجية لأشجار الطلع (الأكاسيا)، البيض المحضون: 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 15 - 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 17 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



هاجرة كحلء	الاسم العربي:
<i>Sylvia nisoria</i>	الاسم العلمي:
Barred Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
16 سم / 20 - 29 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من شرق أوروبا إلى غرب منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم جنوباً في كينيا غالباً. وبذلك فإن نطاق تكاثره يُعَدُّ شاسعاً، مقارنة بتوزيعه غير التكاثري المحدود جداً. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. يُعَدُّ هذا الطائر أحد طيور الهاجرة في العالم القديم والأكبر في المملكة على الإطلاق، وهو مهاجر عابر غير شائع ولكنه واسع الانتشار في جميع أنحاء المملكة أثناء مروره ليلاً ومنفرداً. **الموئل:** أطراف الغابات والنباتات الكثيفة النامية تحت الأشجار والشجيرات الطويلة والحداق الكثيفة الأشجار والسياح الشجرية.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات والفاكهة، وللأخيرة أهمية خاصة أثناء موسم الهجرة. يربى بالقرب من الأرض بين الشجيرات، وأحياناً في مظلة الأشجار، حيث يلتقط الحشرات بين أوراق الشجر. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في مجموعات حرة يقل أفرادها

عن 10 طيور أثناء موسم الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر - هاجرة كحلء - رمادي اللون كبير، برزينة هلالية الشكل على الصدر وعينين بارزتين لونهما أصفر فاقع، ما يمنحه مظهراً وحشياً وجريئاً، وعندما يتعرض للمباغثة، يرفع تاجه فينتصب ويهز ذيله بتوتر شديد، وهو عادة ما يكون خجولاً ويتوارى عن الأنظار، غير أنه يظهر أحياناً في موضع مكشوف جداً، ثم سرعان ما يختفي مرة أخرى بين النباتات الكثيفة، وبسبب أسلوبه في التسلل، فقد يكون أكثر شيوعاً مما يبدو، أحياناً يُغرد في فصل الربيع.

أثناء هجرته عبر صحاري الجزيرة العربية، يفقد هذا الطائر نحو 25% من كتلة جسمه بسبب الجهد البدني المبذول، ومع ذلك تبقى أمامه مسافة أخرى ليقطعها تُقدر بنحو 2,000 كم.

مهاجر عابر الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة منطقة النشاط: بحيرة ملاكي




هاجرة يمنية	الاسم العربي:
<i>Sylvia buryi</i>	الاسم العلمي:
Yemen Warbler	الاسم الشائع:
قريب من التهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
15 سم / 22 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، ولا يوجد سوى في جنوب غرب السعودية وغرب اليمن. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. هذا الطائر غير المعروف بما يكفي لا يوجد سوى في المرتفعات، جنوب الباحة. **الموئل:** في الغالب عند ارتفاعات تتجاوز 2,400 م في غابات العرعر، لا سيما تلك التي يوجد فيها مزيج من أشجار الطلح وغيرها من الأشجار متساقطة الأوراق والشجيرات الكثيفة. كما يوجد في أجمات

الطلح، أو غيرها من الشجيرات الكثيفة حول الحقول المزروعة وقيعان الوديان. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، إلى جانب الفاكهة عند توافرها. ويبحث عن الفرائس عبر التسلل على طول جذوع وفروع الأشجار والشجيرات، خاصة أشجار الطلح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج

لم يتبق سوى 9,000 زوج من طيور الهاجرة اليمنية في أي مكان حول العالم، علماً أن أكثر من نصف هذا التعداد يوجد في جنوب غرب المملكة، في حين يوجد الباقي غرب اليمن.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 5,000
منطقة النشاط: جبل السوداء



هاجرة حدائقية شرقية	الاسم العربي:
<i>Sylvia crassirostris</i>	الاسم العلمي:
Eastern Orphean Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
15 سم / 15 - 35 غم	الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من كرواتيا مروراً بتركيا وشرق منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى إيران وباكستان وكازاخستان. ويهاجر في فصل الشتاء حتى 3,000 كم جنوباً في شمال شرق أفريقيا (من السودان إلى إثيوبيا) مروراً بشبه الجزيرة العربية حتى الهند. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محدود. يُعد هذا الطائر الكبير ذو الرأس الأسود مهاجراً عابراً غير شائع، ولكنه واسع الانتشار في جميع أنحاء السعودية (رغم عدم وجوده

في الشمال الغربي)، ويمضي الشتاء في الجنوب الغربي. **الموئل:** أثناء موسم الهجرة نجدته في الشجيرات الكثيفة، بما فيها الشجيرات العالية، أو السياج ذات الأشجار الطويلة. ويفضل خلال الشتاء سفوح الجبال المغطاة بالشجيرات، ومنها شجر العرعر. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات ويرقاتها وصغار مفصليات الأرجل الأخرى، إلى جانب التوت، مثل توت الأراك. ويتغذى في الأشجار والشجيرات العالية، ويبحث عن الفرائس في الأغصان وأوراق

الشجر. بوجه عام لا يرفع على ارتفاعات منخفضة، إلا إذا اضطر للنزول إلى الأرض للغذاء. أحياناً يصطاد أثناء الطيران ويفرش ذيله غالباً عند تناول الطعام. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل في مجموعات مهاجرة صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

ملاحظة: يتميز هذا الطائر بأنه طائر قوي إلى حد بعيد ويُحلق نحو هدفه بشكل مباشر، لكنه يبذل بين التحويم ورفرفة الجناحين لفترات قصيرة. لديه قننسة بلون أسود تكون تبرز بشكل أكبر لدى الذكر، مؤخرًا، تم تقسيمه إلى نوعين، هاجرة حدائقية غربية (*S. hortensis*)، وهذه الهاجرة، وقد سُمي بهذا الاسم تيمناً بموسيقى وشاعر من الأساطير اليونانية سحر جميع الكائنات الحية، وحتى الأحجار، بموسيقاه الرائعة. ففي كل ربيع يشدو هذا الطائر بأعذب الألحان المفعمة بالحياة، وتُبهج كل من يسمعه.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جرف الهدا



هاجرة رأساء

Sylvia mystacea
Ménétries's Warbler

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
غير معروف
13 سم / 7 - 12 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



ذكر



أنثى

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من شرق تركيا إلى كازاخستان شرقاً، وإلى العراق وباكستان جنوباً. ويهاجر حتى 2,000 كم باتجاه الجنوب الغربي في جنوب إيران وشبه الجزيرة العربية وشمال شرق أفريقيا لقضاء فصل الشتاء. **حالته بالمملكة:**


مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. ينتشر هذا الطائر الصغير واسع العينين في جميع أنحاء السعودية، بوصفه مهاجراً عابراً نادراً إلى حد بعيد وزائراً شتوياً إلى المنطقتين الوسطى والغربية. ليس سهلاً رصده خلال فصل الشتاء في السهول الشمالية والمناطق الرملية، كما يُعَدُّ وجوده محدوداً في المرتفعات الجنوبية الغربية. وقد

أظهرت الطيور المحجلة على نحو فردي التي تم الإمساك بها مرة أخرى بالقرب من الرياض أن بعض الأفراد تمضي فصل الشتاء في المناطق الحرجية نفسها لسنوات عدة لاحقة. **الموئل:** الشجيرات المنخفضة في المواقع المحمية، مثل المتنزهات والحدائق (حتى في وسط المدن) والبساتين وفي الأراضي شبه القاحلة التي يندر وجود أشجار فيها إلا من بعض الشجيرات المتناثرة هنا وهناك. إضافة إلى سفوح الجبال الجافة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي:

غالباً الحشرات وبقراتها، إلى جانب مفصليات الأرجل الأخرى. وفي الشتاء، يُنقَد نسبة كبيرة من البذور والفاكهة، مثل توت العوسج. من طبيعته التخفي أثناء الرعي، إذ يبحث عن الغذاء بهدوء ومنهجية في أوراق الشجر وأغصانها، ثم يطير إلى الشجيرة التالية، وغالباً ما ينتقل من أسفل شجيرة إلى قمة أخرى، وهكذا. وأحياناً يغرد في المملكة أثناء فصل الربيع. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** في الشتاء، قد يوجد ذكر وأنثى معاً في المنطقة نفسها كما لو كانا زوجين، ما يشير إلى احتمالية أن تكون الرابطة الزوجية طويلة الأجل. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

يمتلك هذا النوع من الطيور المهاجرة ذاكرة مكانية طويلة الأمد وُصفت بأنها مذهلة. فعلى سبيل المثال، كانت بعض الطيور التي تم الإمساك بها مرات متكررة بالقرب من الرياض، تمضي الشتاء في الأحراج نفسها عاماً تلو العام.

يتمتع هذا النوع من الطيور المهاجرة ذاكرة مكانية طويلة الأمد وُصفت بأنها مذهلة. فعلى سبيل المثال، كانت بعض الطيور التي تم الإمساك بها مرات متكررة بالقرب من الرياض، تمضي الشتاء في الأحراج نفسها عاماً تلو العام.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جدة

ديسمبر / نوفمبر / أكتوبر / سبتمبر / أغسطس

زوراء صغيرة

Sylvia curruca
Lesser Whitethroat

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
13 - 14 سم / 9.5 - 18 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق يمتد من غرب أوروبا إلى شمال الصين وفي الشتاء يهاجر حتى 5,000 كم جنوباً في منطقة الساحل وجنوب شرق أفريقيا مروراً بالجزيرة العربية حتى الهند وسريلانكا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. يوجد أربعة أنواع فرعية من ستة معروفة في المملكة، منها ثلاثة تُعَدُّ أحياناً أنواعاً متميزة: «زوراء صغيرة» *S. c. curruca* (من أوروبا)، وهو مهاجر عابر شائع وفي بعض الأحيان يقضي فصل الشتاء؛ و«زوراء الصحراء الصغيرة» *S. c. mimula* (من غرب الصين)؛ و«زوراء هيوم صغيرة» *S. c. althea* (من كازاخستان إلى إيران)؛ فضلاً عن *S. c. halimodendri* (من كازاخستان إلى منغوليا)، وجميعها تعتمد إلى قضاء فصل الشتاء في السعودية.

الموئل: يمكن العثور عليه أثناء موسم الهجرة في الحدائق الكثيفة الأشجار وأطراف الغابات والأجمات الصغيرة ذات الغطاء النباتي الكثيف. كما أنه يندر وجوده بعيداً عن شجر الظلم في الشتاء. **سلوك البحث**

عن الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات، خاصة اليرقات ومفصليات الأرجل الأخرى، والبرازقات وغيرها من الرخويات الصغيرة. ويبحث عن طعامه بالفحص الدقيق لأوراق الشجر وأغصانها ولحائها وجذوعها، وفي بعض الأحيان على الأرض، حيث يتحرك عن طريق القفز والركض لمسافات قصيرة. هذا الطائر غير فضولي الطبع، ويميل إلى البقاء متخفياً لفترات طويلة كلما أمكنه ذلك. وقد أثبتت دراسات التحجيل بالقرب من مدينة الرياض أن هذه الطيور غالباً ما تقضي الشتاء في مجموعة الأشجار نفسها لسنوات متتالية. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجَل في مجموعات صغيرة متفرقة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

يتمتع هذا النوع من الطيور المهاجرة ذاكرة مكانية طويلة الأمد وُصفت بأنها مذهلة. فعلى سبيل المثال، كانت بعض الطيور التي تم الإمساك بها مرات متكررة بالقرب من الرياض، تمضي الشتاء في الأحراج نفسها عاماً تلو العام.

يتمتع هذا النوع من الطيور المهاجرة ذاكرة مكانية طويلة الأمد وُصفت بأنها مذهلة. فعلى سبيل المثال، كانت بعض الطيور التي تم الإمساك بها مرات متكررة بالقرب من الرياض، تمضي الشتاء في الأحراج نفسها عاماً تلو العام.

ديسمبر / نوفمبر / أكتوبر / سبتمبر / أغسطس / يوليو / يونيو

هاجرة مغردة شرقية*Sylvia cantillans*

Subalpine warbler

غير مهدد

يتزايد

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن: 12 سم / 7 - 16 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط إلى تركيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً في منطقة الساحل بأفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر جداً. يُعدُّ هذا الطائر ذو الألوان الزاهية نسبياً، من الطيور النادرة للغاية في المملكة، ويمكن اعتباره شارداً. وبسبب توزيعه العالمي، فإن مسار الهجرة الرئيس يمتد إلى حد كبير حتى غرب المملكة، قليلة هي السجلات حول هذا الطائر من جدة وينبع وتبوك وخليج العقبة، غير أنه يوجد بشكل منتظم في شهر مارس بتبوك. **الموائل:** الشجيرات الشائكة الكثيفة التي تتخلها الشجيرات الطويلة والأشجار المنخفضة متساقطة الأوراق، خاصة على سفوح التلال وفي الوديان. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات ويرقاتها، إلى جانب التوت والبيذور، بما في ذلك بذور الأعشاب. ويتغذى هذا الطائر عن طريق التقاط الحشرات من أوراق الأشجار وجذوعها وسيقانها أثناء بحثه في النباتات.

لأن هذه الهاجرة تتكاثر في غرب تركيا وتقضي فصل الشتاء في أفريقيا، فإنها محدودة وتتعدّر رؤيتها في المملكة، علماً أن معظم مشاهداتها المبلغ عنها كانت في المنطقة الغربية.

لا يصل إلى الأرض، بل يميل إلى البقاء ضمن مستويات ارتفاع منخفضة إلى متوسطة بين النباتات والشجيرات. ومع حركته المستمرة أثناء تناول الطعام، يتخذ وضعاً أفقياً، ويخفق جناحيه وينصب ذيله. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجّل منفرداً، أو في مجموعات مهاجرة صغيرة متفرقة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** من طبيعة هذا الطائر التخفي، رغم أنه في بعض الأحيان يُظهر نفسه جيداً للمراقبين بشكل غير متوقع.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تبوك

**هاجرة سردينية***Sylvia melanocephala*

Sardinian Warbler

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

14 سم / 12 - 25 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في نطاق يمتد من مقدونيا إلى تركيا، وتهاجر في الشتاء حتى 2,000 كم جنوباً في شمال أفريقيا وغرب السعودية. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي محدود. يوجد هذا الطائر أسود الرأس وأحمر العينين بانتظام خلال الشتاء في المناطق الغربية وحتى القصيم شرقاً. **الموائل:** في معظم الأحيان يتم رصده عند ارتفاع يقل عن 2000 م، في الأراضي الجافة المنخفضة والمكشوفة ذات الشجيرات والأشجار المنخفضة (مثل شجر الطلح والطرفاء) والشجيرات الموجودة في سفح التلال والحدائق والمنتزهات والمناطق الزراعية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات ويرقاتها والعناكب وصغار القواقع، فضلاً عن كمية كبيرة من التوت وأنواع الثمار الصغيرة، خاصة في الشتاء. غالباً ما يرعى في الشجيرات، وفي بعض الأحيان على الأرض، أو في الأشجار المنخفضة. كما يتوجه إلى أبراج تغذية الطيور في جدة. هذا

على الرغم من تشابه الطيور الهاجرة ظاهرياً، إلا أنها متميزة وراثياً، وبالتالي تكون غير قادرة على التهاجن، فهي تُعدُّ أنواعاً مستقلة.

الطائر جريء وفضولي إلى حد بعيد ويبدو سعيداً جداً بقضاء فصل الشتاء في حديقة خاصة، لكن في الوقت نفسه قد تصعب رؤيته رغم نداءه الصاخب. ففي لحظة يظهر بشكل جريء على قمة شجرة حرجية، وفي اللحظة التالية يخجل ويتوارى عن الأنظار، حيث يندفع مسرعاً بين الأحراج، أو يعمد للاختفاء في الغطاء النباتي. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجّل منفرداً، أو في مجموعات صغيرة متفرقة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تبوك




زوراء شائعة	الاسم العربي:
<i>Sylvia communis</i>	الاسم العلمي:
Common Whitethroat	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
14 سم / 14 - 17 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال شرق أفريقيا وأوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. هذا الطائر الصغير المحبوب ذو الرقبة (اللحية) البيضاء المنفوشة مهاجر شائع وواسع الانتشار في جميع أنحاء المملكة، خاصة في فصل الربيع. وشوهدت تعدادات منه مرات عدة في يناير بمنطقة تبوك والرياح، ما يشير إلى احتمال قضاؤه لفصل الشتاء في المنطقة. لكن هذه التعدادات من الطيور قد تكون هاجرت فبكراً قبل حلول فصل الشتاء. **الموئل:** المساحات المفتوحة من الأعشاب الطويلة بالقرب من الأراضي الرطبة وأشجار الطلح الخفيضة وشجيرات الطرفاء والشياح النباتية الضخمة والحدائق والمتنزهات الكبيرة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل رئيس على الحشرات، خاصة الخنافس، خلال موسم التكاثر، غير أنه وخلال هجرته في المملكة، يستهلك الكثير من الفاكهة والتوت، وهو يبحث عن الطعام داخل الشجيرات والكلا. وعلى الأرض في بعض الأحيان. كما أنه يطارد الحشرات الطائرة ويلتقطها. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما تتم مشاهدته ضمن أسراب مهاجرة متفرقة.

سلوك التكاثر: لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمكن لهذا الطائر أن يكون الطائر أليفاً وفضولياً، ويُظهر نفسه جيداً عند التقاط الطعام فوق الأوراق الخارجية للشجيرات. ويرفع رأسه عالياً، ويرفع ذيله أحياناً. طيرانه بين الشجيرات غير منتظم وغير مألوف إلى حد ما.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة




هاجرة روبلية	الاسم العربي:
<i>Sylvia ruppeli</i>	الاسم العلمي:
Rüppell's Warbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
14 سم / 9 - 15 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق محدود حول شرق البحر الأبيض المتوسط (اليونان وتركيا وسورية). بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,500 كم جنوباً في نطاق محدود أيضاً، وبالقدر نفسه، في شرق أفريقيا (من تشاد حتى ساحل البحر الأحمر في السودان). **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. بالنظر إلى أن معظم نطاق تكاثر هذا الطائر ومكان قضاؤه لفصل الشتاء يقعان في شرق المملكة، فليس من المستغرب أن يقطع القليل من تعداداته المهاجرة العابرة حدود المملكة الشمالية الغربية في كل عام، ووفقاً لذلك، تم تسجيل وجوده في تبوك وينبع، ومن المُرجح وجوده أيضاً، على طول خليج العقبة. ولما لم يتم تسجيل أي طائر منه في فصل الخريف، فمن المفترض أن هذا النوع يهاجر بشكل حلقي، متجهاً نحو الشمال عبر أفريقيا كلها، متجاوزاً شبه الجزيرة العربية. **الموئل:** الأراضي ذات الأشجار المنخفضة والنباتات الشائكة، لا سيما على سفوح التلال أو في الوديان. ويوجد أيضاً، في الأراضي الحرجية المنخفضة ذات النمو الجيد والغابات المفتوحة كثيفة الأشجار.

الغذائي: غير معروف بشكل جيد، لكنه يشمل اللافقاريات وبقراتها، فضلاً عن حبات التوت الصغيرة، وثمار الكبر وغيرهما من أنواع الفاكهة خلال فصل الشتاء. ويلتقط هذا الطائر فرائسه من الأوراق والسيقان في الأجزاء المنخفضة أو المتوسطة من الأشجار والشجيرات بشكل أساس، أو ينزل أحياناً إلى الأرض حيث يتب ملتقظاً فرائسه من السطح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل مفرداً، أو في أعداد صغيرة جداً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر ليس خجولاً، لكنه قد يتمايل في وضعياته، وفي بعض الأحيان يكون بطيئاً إلى حد ما في تحركاته. يبدو أقل نشاطاً بشكل ملحوظ، مقارنة بعدد من طيور الهاجرة الأخرى. وفي بعض الأحيان، ينفذ أجنحته ويرفع ذيله.

الغذائي: غير معروف بشكل جيد، لكنه يشمل اللافقاريات وبقراتها، فضلاً عن حبات التوت الصغيرة، وثمار الكبر وغيرهما من أنواع الفاكهة خلال فصل الشتاء. ويلتقط هذا الطائر فرائسه من الأوراق والسيقان في الأجزاء المنخفضة أو المتوسطة من الأشجار والشجيرات بشكل أساس، أو ينزل أحياناً إلى الأرض حيث يتب ملتقظاً فرائسه من السطح. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل مفرداً، أو في أعداد صغيرة جداً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر ليس خجولاً، لكنه قد يتمايل في وضعياته، وفي بعض الأحيان يكون بطيئاً إلى حد ما في تحركاته. يبدو أقل نشاطاً بشكل ملحوظ، مقارنة بعدد من طيور الهاجرة الأخرى. وفي بعض الأحيان، ينفذ أجنحته ويرفع ذيله.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: تبوك




ثرثرة عربي	الاسم العربي:
<i>Argya squamiceps</i>	الاسم العلمي:
Arabian Babbler	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
29 - 26 سم / 83 - 64 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية التي تضم ما يزيد على 98% من نطاق وجوده العالمي. ويوجد في المملكة واليمن وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، وشمالاً حتى شرق سينا وجنوب فلسطين وجنوب الأردن. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. ينتشر في الغرب حتى حائل والرياض. ويوجد اثنان من أصل ثلاثة أنواع فرعية معروفة منه في المملكة العربية السعودية: *A. s. yemensis* في الجنوب الغربي، و *A. s. squamiceps* في المناطق الغربية والوسطى. **الموائل:** غابات الطلح والأرض ذات أشجار الطلح الخفيضة، خاصة المناطق التي تشبه السفانا ومصحات الرياح والأحراج والحدائق. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات والعناكب والعقارب والحريشة (أم أربع وأربعين) والسحالي الصغيرة والثعابين (حتى 20 سم) والنباتات الملتقطة من الشجيرات، أو فوق الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في مجموعات تتألف من 25 طائراً كحد أقصى، ومن 7 - 12 عادة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: مجموعات متكاثرة تعاونياً شديدة التعقيد، تقوم على وجود زوج متكاثر مهيمن تدعمه مجموعة مستقرة تضم بشكل عام نحو 7 - 21 طائراً مساعداً في العش. وفي بعض الأحيان، يعتمد أكثر من ذكر أو أنثى إلى التزاوج في العش نفسه على سبيل فرض سيطرتهم. **الأدوار الأبوية:** يؤدي الزوج

بفضل سلوكه الاجتماعي المعقد وسلوكه التكاثري التعاوني المكثف، يُعدُّ هذا الطائر، بلا شك، أحد أكثر الطيور روعة في العالم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 75,000
منطقة النشاط: وادي ريداء



أبيض العين الحبشي

مغربة حبشية	الاسم العربي:
<i>Zosterops abyssinicus</i>	الاسم العلمي:
Abyssinian White-eye	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
10 سم / 7.2 - 12 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ في كل من إثيوبيا إلى إريتريا والصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. ويُعرف منه أربعة أنواع فرعية، منها *Z. a. arabs* الذي يتوطن شبه الجزيرة العربية، ويوجد في جنوب غرب المملكة وجنوب سلطنة عُمان واليمن. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يوجد هذا الطائر البديع في المرتفعات الجنوبية الغربية إلى الجنوب من الطائف، ومن المثير للاهتمام أن تعدادات منعزلة غير محددة منه تقطن أشجار المانغروف على طول ساحل البحر الأحمر. **الموائل:** عادةً على ارتفاعات تتجاوز 1,000 م في المناطق ذات الغطاء الشجري الجيد، بما في ذلك من تلال ووديان وحدائق وغابات عرعر. كما يمكن العثور عليه عند مستوى سطح البحر ضمن أحراج المانغروف الكثيفة في أقصى الجنوب الغربي. **سلوك البحث عن الغذاء:**

النظام الغذائي: المن وغيره من الحشرات الصغيرة، بما فيها اليرقات، إلى جانب الفاكهة. كما يرفع في ظل الأشجار الطويلة. ويتغذى على الزهور، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى أن يتغفر جبينه بغبار حبوب اللقاح. كما شوهد فرد منه في جزيرة سقطرى (اليمن) يستخدم عصا صغيرة ورفيعة للتنقيب في الثقوب والشقوق الموجودة في لحاء الشجر بحثاً عن الطعام.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يرفع في أسراب من 10 - 20 طائراً. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش وحض البيض ورعاية الفراخ. **العش:** يشبه الفنجان، أنيق ومصنوع من الأعشاب الناعمة وأنسجة العنكبوت وفي بعض الأحيان من الخيوط والقطن، وهو مبطن بالشعر ومزخرف أحياناً بأجزاء من الطحالب، ويوضع على ارتفاع يصل إلى 2 - 4 م فوق سطح الأرض، إما متصلاً بالجانب السفلي لفروع عدة متدلّية في شجرة العرعر، أو متدلّياً كأرجوحة بين فروع جانبية لشجرة طلع. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 11 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة على وجه الاحتمال.



مقيم متكاثر


الأزواج المتكاثرة سنوياً: 200,000
منطقة النشاط: محمية ريدة



زرزور وردى	الاسم العربي:
<i>Pastor roseus</i>	الاسم العلمي:
Rosy Starling, Rose-colored Starling	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
غير معروف	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
21 سم / 60 - 88 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من اليونان والبحر الأسود حتى إيران وكازاخستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم باتجاه الجنوب الشرقي في الهند وسريلانكا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، ورائر شتوي أحياناً. عادةً ما يتجاوز هذا الطائر الجميل المملكة إلى الشمال والشرق وهو في مسار هجرته الطبيعي. ولحسن الحظ، تمرّ بعض أفراده القادمة من نطاق تكاثر في الجزء الشرقي عبر شمال المملكة أحياناً، خاصة في فصل الخريف، وهو زائر غير منتظم في أوقات أخرى من العام. تم توثيق وجوده في ينبع خلال فصل الشتاء. **الموئل:** الحدائق والمواقع الزراعية، مثل الحقول المحروثة وأكوام السماد الطبيعي ومقالب النفايات ومناطق معالجة مياه الصرف الصحي. **سلوك**



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة




زرزور شائع	الاسم العربي:
<i>Sturnus vulgaris</i>	الاسم العلمي:
Common Starling	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
21 سم / 55 - 100 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تتكاثر التعدادات المقيمة منه بدءاً من الجزر البريطانية عبر تركيا وإيران حتى باكستان، في حين تتكاثر التعدادات المهاجرة في شبه الجزيرة الإسكندنافية ووسط أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً حول البحر المتوسط وشمال الجزيرة العربية وشرقها حتى شمال الهند. علاوةً على ذلك، تم إدخال هذا النوع في أميركا الشمالية وأستراليا. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي شائع. يوجد هذا الطائر المغرد، بوصفه زائراً شتوياً، في النصف الشمالي من المملكة. وقد تم الإبلاغ عن أسراب منه تتألف من مئات عدة في المنطقة الشرقية، لكن وجوده محدود في غيرها من المناطق، مع مشاهدة واحدة فقط في الجنوب الغربي. **الموئل:** المحاصيل والمروج والمناطق الحضرية وأماكن معالجة مياه

الصرف الصحي ومقالب القمامة وبساتين التمر والمتنزهات الحضرية، وغالباً ما يجثم في الأشجار العالية بالمدن. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** نهم وانتهازي، إذ يمكنه أن يأكل مجموعة واسعة من الأطعمة سواء من الحيوانات أو النباتات، بما فيها الحشرات والعناكب وسرطان البحر والديدان والقواقع والحريشة (أم أربعة وأربعين)، كذلك يتناول الفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع والسحالي الصغيرة، فضلاً عن التوت والبذور والنباتات المزروعة وبقايا الطعام. عادةً ما يرعى على الأرض ويتميز بخفة حركته ومشيته التي يهز فيها رأسه كثيراً. يتسم بأجنحة مثلثة الشكل، ويطير بشكل مستقيم وسريع لكنه مرن بما يكفي ليكون قادراً على اصطيد الحشرات الطائرة في الهواء عالياً حين تكون كثيرة العدد. يستخدم حاسة الشم في تحديد ماهية الطعام وموقعه. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يرعى في مجموعات صغيرة، أو في أسراب تصل إلى مئات عدة، حيث يكون الغذاء وفيراً. طائر مشاكس إلى حد ما، فقد يصبح عدوانياً تجاه أقرانه داخل السرب وتجاه الأنواع الأخرى بالقرب من الطعام. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



زرزور مجوف: الاسم العربي:
Cinnyricinclus leucogaster: الاسم العلمي:
 Violet-backed Starling: الاسم الشائع:
 غير مهدد: حالة الحماية العالمية:
 يتناقص: المنحى العالمي للمجموعة:
 - حالة الحماية الإقليمية:
 - المنحى الإقليمي للمجموعة:
 16 سم / 33 - 56 غم: الحجم والوزن:



ذكر زرزور مجوف




أنثى زرزور مجوف

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 500 كم على الأقل باتجاه الجنوب الغربي (ربما أبعد من ذلك بكثير) ضمن نطاق إقامته في أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شائع. يتكاثر هذا الطائر الذي يُعَدُّ من أجمل الطيور في المملكة بظهوره البنفسجي المتميز على الجرف الغربي (جنوب الطائف) بشكل أساس، كذلك يتكاثر على الحواف الشرقية من مرتفعات تهامة. **الموئل:** يوجد على ارتفاع 600 - 2,800 م في الغابات والمساحات المفتوحة ذات الأشجار المتناثرة وفي البساتين والمنتزهات، وأحياناً الحدائق مع ثقوب في الأشجار مناسبة للتعشيش. **سلوك البحث عن الغذاء:** في كل عام يطير نحو 40,000 زوج من هذا الطائر البديع عبر البحر الأحمر للتعشيش في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

في كل عام يطير نحو 40,000 زوج من هذا الطائر البديع عبر البحر الأحمر للتعشيش في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

في أنه يقضي القليل من الوقت على الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أزواج، أو مجموعات عائلية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار. وتتولى الأنثى حضن البيض. **العش:** عبارة عن وسادة مصنوعة من الأوراق الخضراء تغطي قاعدة من الأغصان والعشب، يوضع على ارتفاع يصل إلى مترين أو أكثر فوق سطح الأرض في ثقب جذع شجرة، خاصة في أحد ثقوب التعشيش المهجورة (أو المستولى عليها مؤخراً) لنقار الخشب العربي. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 20 - 22 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

في أنه يقضي القليل من الوقت على الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أزواج، أو مجموعات عائلية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار. وتتولى الأنثى حضن البيض. **العش:** عبارة عن وسادة مصنوعة من الأوراق الخضراء تغطي قاعدة من الأغصان والعشب، يوضع على ارتفاع يصل إلى مترين أو أكثر فوق سطح الأرض في ثقب جذع شجرة، خاصة في أحد ثقوب التعشيش المهجورة (أو المستولى عليها مؤخراً) لنقار الخشب العربي. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 20 - 22 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40,000
منطقة النشاط: تنومة




زرزور أسود: الاسم العربي:
 ضوعة: الاسم العربي الآخر:
Onychognathus tristramii: الاسم العلمي:
 Tristram's Starling, Tristram's Grackle: الاسم الشائع:
 غير مهدد: حالة الحماية العالمية:
 مستقر: المنحى العالمي للمجموعة:
 غير مهدد: حالة الحماية الإقليمية:
 مستقر: المنحى الإقليمي للمجموعة:
 25 سم / 115 - 131 غم: الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية التي تضم ما يزيد على 98% من نطاق وجوده العالمي. ويوجد في غرب المملكة وغرب سلطنة عُمان واليمن، مع وجود تعداد صغير منه في شرق سيناء وفلسطين والأردن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. هذا الطائر الأسود الجسور يتكاثر في جميع أنحاء المرتفعات الغربية. وفي حين يقتصر وجوده على مناطق المرتفعات في المملكة، فإنه يوجد أيضاً على ارتفاعات منخفضة وبالقرب من الساحل في شرق اليمن ووظفار (سلطنة عُمان). **الموئل:** المناطق الصخرية ذات المنحدرات العالية والأخاديد والوديان والتنوعات الصخرية. وغالباً ما يوجد بالقرب من المساكن البشرية والمستوطنات ومقالب القمامة. **سلوك البحث عن الغذاء:** يتغذى بشكل أساس على الفاكهة والحشرات، إضافة إلى القواقع الصغيرة وبقايا الطعام البشري. ويلتقط القزاد من جلود الوعول والإبل والحمير وغيرها من الثدييات الكبيرة. وفي بعض الأحيان، تسافر الطيور التي تعيش في الموائل الطبيعية إلى المدن والبلدات بحثاً عن الطعام. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أزواج أو مجموعات عائلية خلال موسم التكاثر، أو في أسراب تضم أكثر من 100 طائر خلال فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. تعشش إما منفردة، أو في مستعمرات متفرقة. **الأدوار الأبوية:** يشارك كل من الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار، بينما تتولى الأنثى حضن البيض. **العش:** على شكل فنان غير مرتب مصنوع من الأعشاب والأغصان والأوراق، مبطن بالأعشاب الناعمة وأحياناً بالشعر والريش والصوف والورق والقماش، ويوضع على ارتفاع يناهز 5 أمتار فوق سطح الأرض في شق أو كهف، أو أحياناً على حافة محمية على منحدر، أو مبنى مهجور في أحيان أخرى. **موقع غريب:** عمود إنارة في عسير. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 28 - 31 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.

تأتي الثدييات الكبيرة، كالعول والإبل، إلى «محطات التنظيف» التقليدية التي يقيمها هذا الطائر، حيث يباشر بإزالة القزاد من جلودها.

حضانة البيض. **العش:** على شكل فنان غير مرتب مصنوع من الأعشاب والأغصان والأوراق، مبطن بالأعشاب الناعمة وأحياناً بالشعر والريش والصوف والورق والقماش، ويوضع على ارتفاع يناهز 5 أمتار فوق سطح الأرض في شق أو كهف، أو أحياناً على حافة محمية على منحدر، أو مبنى مهجور في أحيان أخرى. **موقع غريب:** عمود إنارة في عسير. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 16 يوماً. **مدة التعشيش:** 28 - 31 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 35,000
منطقة النشاط: محمية تنومة



حمراء جناح*Turdus iliacus*

Redwing

قريب من التهدد

يتناقص

20 - 24 سم / 46 - 80 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من أيسلندا وشمال أوروبا حتى شمال شرق سيبيريا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 - 8,000 كم باتجاه الجنوب الغربي في شمال أفريقيا وغرب أوروبا حتى شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب بحر قزوين. وفي بعض الأحيان، يصل بعضها إلى شمال شبه الجزيرة العربية، **حاليته بالمملكة: زائر شتوي نادر جداً.** تقع المملكة إلى الجنوب من نطاق فصل الشتاء لهذا الطائر البرتقالي الجناحين.

وبالتالي، يُعدُّ زائراً شتوياً نادراً جداً للمملكة، مع كون معظم المشاهدات من منطقة الخليج العربي.

الموئل: المناطق ذات الأشجار والأرض الرطبة المفتوحة. وقد يوجد أيضاً في الحقول المفتوحة ذات العشب القصير والمراعي وحقول العلف (كما هو مسجل في فصل الشتاء في أوروبا). **سلوك البحث عن**

على عكس البشر، يستطيع

هذا الطائر رؤية الألوان فوق

البنفسجية، وبالتالي يمكنه

تقييم مدى نضج الفاكهة

باستخدام هذه الميزة، رغم

أنها قد تبدو متطابقة لأعيننا.

الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات والفاكهة

وثمار التوت، مع أهمية خاصة للأخيرة في

فصل الشتاء. يبحث عن فرائسه على الأرض،

أو يلتقط الحشرات والتوت من الغطاء

النباتي المنخفض. **النشاط:** نهاري. **السلوك**

الاجتماعي: من الأنواع الاجتماعية عموماً،

وقد شوهد ما يصل إلى خمسة طيور مجتمعة منه في المملكة. **سلوك التكاثر:**

لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر، حمراء جناح، أصغر وأقل استقامة من طائر


سمنة مغردة الذي يمكن الخلط بينهما، وهو يتميز بعينين فاتحتين بارزتين وأشرطة

شارب وأجنحة بلون الصدا. وعندما يشعر هذا الطائر بالثقة، يخرج من مخبئه ليتغذى في

العراء، وفي ذلك تتبعه الطيور الأخرى، واحداً تلو الآخر، حتى تبدأ المجموعة بأكملها

في البحث عن الطعام مرة أخرى. ولكن عند الإحساس بالخطر، يعود أفراد السرب كافة

إلى الأشجار العالية.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: بقيق



ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

مارس

فبراير

يناير

سمنة مغردة*Turdus philomelos*

Song Thrush

غير مهدد

يتزايد

20 - 23 سم / 50 - 107 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً، توجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وغرب أوروبا حتى شمال إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من وسط أوروبا وشبه الجزيرة الإسكندنافية حتى شمال منغوليا، بينما يقضي الشتاء حتى 6,000 كم باتجاه الجنوب الغربي حول البحر الأبيض المتوسط ووادي النيل وساحل البحر الأحمر الأفريقي والشرق الأوسط جنوباً إلى شبه الجزيرة العربية. **حاليته بالمملكة: مهاجر عابر محدود، زائر شتوي محلي.**

يُعدُّ هذا الطائر المغرّد الشهير مهاجراً عابراً محدوداً، غير أنه واسع الانتشار (مارس - أبريل، أكتوبر - نوفمبر) وزائر شتوي (نوفمبر - مارس) غير منتظم، ويكون أوفر عدداً في المرتفعات الغربية ولكن الأرقام تختلف من سنة إلى أخرى. **الموئل:** الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف مع الكثير من الشجيرات، مثل البساتين

وبساتين التمر والغابات وسفوح التلال

الصخرية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: اللافقاريات والتوت والفاكهة

المتساقطة. كما يتناول أي فريسة يمكنه

الإمسك بها تقريباً، بما في ذلك الزواحف

الصغيرة. ومن فرائسه المفضلة الحلزون،

حيث يفتح صدفته عبر تهشيمها بقوة على حجر، وقد تدل مجموعات من أصداف

الحلزون المكسورة محيطية بحجر، ويسمى السندان، على وجوده. وغالباً ما يربى

هذا الطائر تحت غطاء أو بالقرب منه، ويبحث عن طعامه عن طريق إخلاء الحطام، أو

سحبه باستخدام منقاره. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:**

لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** طائر خجول يتقن التخفي، وعند تعرضه للإزعاج

يطير بسرعة وبشكل مستقيم، ويتحرك برشاقة عبر الأشجار.

يشتهر طائر السمنة


المغردة بخصلتين، وهما

مهاراته الصوتية الرائعة،

واستخدامه سنداناً حجرياً

لتكسير أصداف الحلزون حتى

يمكن من تناول محتواها.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جبل السوداء



ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

مارس


فبراير

يناير

اسمنا يمنية	الاسم العربي:
<i>Turdus menachensis</i>	الاسم العلمي:
Yemen Thrush	الاسم الشائع:
قريب من التهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
23 سم / 72 - 79 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية. ولا يوجد سوى في جنوب غرب المملكة وغربي اليمن. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. يظهر هذا الطائر ذو اللون البني - الزيتوني فقط في المرتفعات جنوب مدينة الطائف. **الموئل:** يوجد عادة ضمن ارتفاعات تزيد على 2,100 م في غابات العرعر ذات الغطاء النباتي الكثيف مع خليط لا بأس به من أشجار الطلح. ويمكن العثور عليه أيضاً، في الحدائق ذات الغطاء النباتي الكثيف والمناطق المزروعة والمدرجات المورقة وقيعان الوديان ذات الشجيرات الكثيفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف جيداً، ولكن من المحتمل أن يشمل اللافقاريات بشكل رئيس خلال موسم التكاثر، والفاكهة في أواخر الصيف حتى أواخر الشتاء. يبحث عن الغذاء بشكل أساسي على الأرض، وعادة ما يكون ذلك بين الشجيرات والنباتات، وغالباً ما يقذف أوراق الشجر المتساقطة والمخلفات بنقرة سريعة من الرأس أثناء بحثه عن فرائسه من اللافقاريات. وربما يستخدم سندان حجري لسحق أصداف الحلزون عليه (كما تم توثيقه جيداً في السمينة المغردة). **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادة في أزواج، أو مجموعات عائلية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,000

منطقة النشاط: جبل السوداء

الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (في حراسة الذكر) وتحضن البيض. يشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** قاعدة عش ثابتة من العشب والأغصان والطحالب وشرائح اللحاء وأحياناً أوراق النباتات، مع وعاء داخلي مصنوع من الطين ومبطن بالعشب والجذور. ويوجد عادة على ارتفاع يصل إلى مترين فوق سطح الأرض (وفي بعض الأحيان 1 - 5 م) في شجرة (أو شجيرة كبيرة)، وغالباً ما يكون مخفياً وسط أوراق شجر كثيفة، أو طحالب متدلّية. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (12 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (13 - 15 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.




شحرور أوراسي

الاسم العربي:	شحرور أوراسي
الاسم العلمي:	<i>Turdus merula</i>
الاسم الشائع:	Eurasian Blackbird
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتزايد
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	غير معروف
الحجم والوزن:	24 - 27 سم / 85 - 105 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وأوروبا حتى غرب الصين. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق أوروبا وشبه الجزيرة الإسكندنافية، وفي فصل الشتاء يصل إلى ما يناهز 3,500 كم جنوباً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفي بعض الأحيان يصل إلى أقصى شمال المملكة ومنطقة الخليج العربي. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي نادر جداً وغير منتظم. النطاق الشتوي الطبيعي لهذا الطائر المشهور بتغيرياته في جوف الليل المعتاد يقع في شمال المملكة. وبالتالي، فهو زائر شتوي نادر جداً للمملكة، رغم أن معظم مشاهداته تمت في الشمال الغربي للمملكة ومنطقة الخليج العربي. **الموئل:** المناطق المشجرة (غالباً بالقرب من الأراضي الرطبة الكبيرة) والبساتين. وقد يوجد أيضاً، في المتنزهات العامة الكبيرة جيدة التشجير (كما هو مسجل في مكان آخر). **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات، الفاكهة والبذور، خاصة في فصل الشتاء. ويجد غالبية طعامه على الأرض. أحياناً يتغذى من خلال نفض حطام الأرض بعيداً عن طريقه لكشف الفرائس، أو حفر الأرض بمنقاره. ويعتمد إلى وثبات قصيرة مع توقف مفاجئ للبحث عن الفرائس وسماع صوتها. كما أنه يسرق أحياناً الطعام من الطيور الأخرى. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** على عكس الوقفة العمودية لبعض أنواع طيور السمينة، يتميز هذا الطائر بوقفة أفقية إلى حد ما عندما يكون على الأرض، بإسقاط ذيله في وضع مستقيم، أو مرتفع قليلاً وفدلياً جناحيه. طائر خجول يتقن الاختفاء في المملكة، ولهذا يتبع نمط طيران سريع عند الهروب، ويتحرك برشاقة عبر الأشجار والغطاء النباتي الكثيف.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تبوك



سمنة سوداء الزور*Turdus atrogularis*

Black-throated Thrush

غير مهدد

غير معروف

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

24 - 27 سم / 54 - 110 غم




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في وسط روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 5,000 كم باتجاه الجنوب الغربي من إيران حتى شمال الهند. **حالته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر وغير منتظم.** يقضي هذا الطائر فصل الشتاء أحياناً في المملكة، ويغيب إلى حد كبير في أحيين أخرى. ويُفترض أنه يصل المملكة خلال السنوات التي تكون فيها الظروف قاسية في مواطن تَشْتِيته المعتادة في آسيا الوسطى باتجاه الشمال الشرقي، وعند وصوله، يكون أكثر شيوعاً في المنطقة الشرقية غرباً إلى منطقة الرياض. **الموئل:** المناطق العشبية ذات الأشجار المتاخمة للأراضي الرطبة، ويُعثر عليه أيضاً، في بساتين النخيل وبالقرب من الأشجار في الحقول المرورية بنظام الري المحوري. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الافقاريات

بعد قضاء فصل الشتاء بحثاً عن الطعام في المنطقة الشرقية من المملكة، يقطع هذا الطائر مسافة 5,000 كم باتجاه الشمال الشرقي، للتكاثر في وسط روسيا.

والفاكهة والبذور، وهو يرعى على الأرض بشكل أساس، وفي الشجيرات والأشجار وتحتها. ويلتقط التوت مباشرة من الشجيرات أو الأشجار؛ وقد يأكل الفاكهة المتساقطة على الأرض. **النشاط:** نهاري.

السلوك الاجتماعي: يظهر في مجموعات من 30 طائراً أو أكثر في المملكة، وينضم إلى أنواع أخرى في أسراب مختلطة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يوجد على مسافات ليست بالبعيدة عن الشجيرات والأشجار. ولكونه طائر خجول، فإنه سرعان ما يلجأ إلى الاحتماء في أي غطاء نباتي، أو شجرة عالية، خاصة عندما يشعر بالتهديد. ويظهر بضربات قوية قصيرة من جناحيه، في مسار مباشر وسريع مع تموجات طفيفة. وعند الهبوط على الأرض، قد يبرز ذيله في وقفة مستقيمة. يُنظر إلى هذا الطائر في بعض الأحيان على أنه من نفس نوع «غطاس صغير» *T. ruficollis*.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: منتزه الدفي (الجبيل)

**سمنة حقلية***Turdus pilaris*

Fieldfare

غير مهدد

مستقر

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:


24 - 28 سم / 81 - 141 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال أوروبا حتى غرب روسيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية إلى سيبيريا. وفي الشتاء تصل لمسافة 6,000 كم باتجاه الجنوب الغربي من غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وحوض بحر قزوين، وفي بعض الأحيان جنوب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** **زائر شتوي نادر.** يُصنّف هذا الطائر الكبير والصاحب على أنه زائر شتوي نادر لمنطقة الخليج العربي وتبوك. **الموئل:** الأماكن المفتوحة ذات الأشجار، مثل الحقول المرورية بنظام الري المحوري التي يتوافر بها محاصيل قليلة، أو بقايا الأشجار والأشجار القريبة من مصدات الريام. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الافقاريات، إلى جانب التوت والفاكهة، خاصة في فصل الشتاء. وغالباً

غالباً ما يبحث هذا الطائر الاجتماعي عن الغذاء إلى جانب طائر حمراء جناح الذي يشبهه إلى حد كبير، كما أنه يراقب سلوك هذا الأخير بعناية بحثاً عن أدلة تساعد في العثور على الفرائس.

ما يبحث عن الافقاريات على الأرض بين النباتات القصيرة، ويأكل الفاكهة مباشرة من الأشجار والشجيرات الصغيرة. ولا يحفر الأرض بمنقاره من أجل الطعام، مثل بعض أنواع طيور السمينة ويتحرك بالوثب. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي على وجه العموم، غير أنه لم يتم رصده إلا بشكل منفرد، أو في مجموعات من 2 - 3 طيور في المملكة. كما يختلط أيضاً، بأنواع من طيور السمينة الأخرى، وتتميز أسرابه بالطيران الصاحب. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** أثناء وجوده على الأرض، يتخذ وقفة عمودية، باسطاً ذيله وفدلياً جناحيه. يطير بتأن مع رفرفات من جناحيه متبوعة بانزلاقات فحديتاً تموجات طفيفة. وإذا ما أحس بالتهديد على الأرض، فإنه يميل إلى الطيران نحو الأشجار القريبة، حيث يجلس ظاهراً في الفروع العليا إلى حين زوال الخطر.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: حرض



أبو الحناء الأحمر

الاسم العربي:

شوالة

الاسم العربي الآخر:

Cercotrichas galactotes

الاسم العلمي:

Rufous-tailed Scrub-Robin, Rufous Scrub Robin, Rufous Bush Chat

الاسم الشائع:

غير مهدد

حالة الحماية العالمية:

مستقر

المنحى العالمي للمجموعة:

غير مهدد

حالة الحماية الإقليمية:

يتزايد

المنحى الإقليمي للمجموعة:

15 سم / 20 - 28 غم

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر جزئي؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر حول البحر المتوسط عبر شبه الجزيرة العربية حتى باكستان وكازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي داخل نطاق إقامته في أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع، مهاجر عابر غير شائع. ينتشر صائد الذباب الصغير هذا في موسم الهجرة

(مارس - مايو، أغسطس - سبتمبر). علاوة على ذلك، تطير بعض أفرادها إلى المملكة للتكاثر، خاصة في المنطقة الشرقية وتهاجر عبر البحر الأحمر لقضاء فصل الشتاء. **الموئل:** يتكاثر في المناطق المورقة وفيرة الظل، بما في ذلك المتنزهات والحدائق وبساتين التمور والحقول المزروعة ذات السياج النباتي وغيرها من المناطق ذات الغطاء النباتي الجيد. وقد يوجد أيضاً، ضمن أي مكان في طريق هجرته، بما في ذلك المناطق شديدة الجفاف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، إلى جانب العناكب والحريشة

والديدان والفاكهة والبذور والتوت. كما أنه يربى على الأرض. **النشاط:** نهاري، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية

الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش والدفاع عنه ورعاية الصغار. وتتولى الأنثى حضن البيض. **العش:** على شكل وعاء غير مرتب مصنوع من الأغصان والأعشاب وأجزاء من لحاء الأشجار، وفي أحيان أخرى من الخيوط أو الصوف، مبطن بالشعر والأياف النخيل وأحياناً الريش، ويوجد عادةً على ارتفاع دون 2م فوق سطح الأرض (وفي بعض الأحيان على ارتفاع يصل حتى 5 م) في شجرة، أو جذع نخلة بين النباتات المتسلقة، أو بين الكروم، أو في تجويف شجرة مفتوح (أو ربما على الأرض، كما هو مسجل في مكان آخر). **البيض المحضون:** 3-5 بيوض. **الحضانة:** 13-14 يوماً. **مدة التعشيش:** 12-13 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,000
منطقة النشاط: الظهران

**أبو الحناء الأسود**

الاسم العربي:

سوادية

الاسم العربي الآخر:

Cercotrichas podobe

الاسم العلمي:

Black Bush-robin, Black Scrub-Robin

الاسم الشائع:

غير مهدد

حالة الحماية العالمية:

غير معروف

المنحى العالمي للمجموعة:

-

حالة الحماية الإقليمية:

-

المنحى الإقليمي للمجموعة:

24 - 27 سم / 54 - 110 غم

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه بمنطقة الساحل الأفريقي وفي غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية، ويبدو أن بعض التعدادات التي تتكاثر في المملكة وفلسطين تقطع مسافة تصل إلى 1,500 كم جنوباً لقضاء فصل الشتاء ضمن نطاق إقامتها. تم التعرف إلى اثنين منه بوصفهما نوعين فرعيين، أحدهما *C. p. melanoptera* الذي يتوطن شبه الجزيرة العربية ويوجد بشكل أساسي في غرب المملكة واليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. حتى عام 1970، كان وجود هذا الطائر الأسود المتميز ذي الذيل المحدب يقتصر على جنوب غرب المملكة، ولكنه

انتشر منذ ذلك الحين شمالاً وشرقاً بعد التوسع الزراعي، على الرغم من أنه لا يزال شائعاً أكثر في الجنوب الغربي. **الموئل:** على ارتفاع دون 1,500 م في الأراضي ذات الأشجار المنخفضة وشجيرات الطلح الجافة، أو الوديان ذات الغطاء النباتي الكثيف. ويوجد أيضاً، في الأراضي المفتوحة حول القرى والحدائق ومزارع التمر والمناطق المزروعة ذات الغطاء النباتي الجيد، مثل سياج النباتات الشائكة حول الحقول. **سلوك**

هذا الطائر الودود مغرد بارع،

بل إنه غالباً ما يكون الطائر

المغرد الوحيد في منتصف

النهار في تهامة.

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: غير

معروف جيداً، يشمل الحشرات وغيرها من


اللافقاريات، إلى جانب الفاكهة وربما البذور أيضاً، مع تزايد أهمية المواد النباتية في

فصل الشتاء. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** أزواج أو مجموعات عائلية صغيرة.**سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار****الأبوية:** غير معروفة. **العش:** على شكل وعاء مزين مصنوع من الأغصان والأعشاب

والأوراق والجذور، مبطن بالشعر والأعشاب الناعمة والصوف أو النباتات في بعض

الأحيان، ويوضع على ارتفاع يراوح بين 0.2 - 1 م فوق سطح الأرض (وفي حالات استثنائية

يوجد على ارتفاع 6 م)، وعادةً ما يكون مخبأً بشكل جيد تحت غطاء شجيرة شائكة،

أو شجرة. **مواقع غير عادية:** التجاويف في الأشجار، أو الجدران، أو المنحدرات الصخرية،أو داخل العش القبابي لطائر الوقواق أبيض الحاجب. **البيض المحضون:** 3 بيوض.**الحضانة:** غير معروفة (13 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة(13 - 10 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.

مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 250,000

منطقة النشاط: بحيرات معالجة مياه الصرف

الصحي في صيباء



صائد ذباب أرقط*Muscicapa striata*

Spotted Flycatcher

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

غير معروف

الحجم والوزن: 15 - 11 سم / 11 - 22 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال شرق أفريقيا وغرب أوروبا شرقاً حتى منغوليا وجنوباً حتى إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 9,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. هذا الطائر البديع مهاجر عابر شائع وواسع الانتشار في المملكة. وتتركز هجرته في الربيع (أبريل - مايو)، مقارنةً بالخريف (أواخر أغسطس - نوفمبر). **الموائل:** المناطق الكثيفة ذات المجاثم المناسبة لرؤية الفرائس، بما في ذلك الحدائق ومنتزهات المدن والأراضي المفتوحة ذات الأشجار المنخفضة، وسياج النباتات، وأبي مكان تتوافر فيه الحشرات، خاصة القريبة من المناطق الحضرية والمنازل البشرية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات الطائرة. ويحط على مجثم مرتفع على الشجيرات، أو بالقرب من الماء، وغالباً ما يبدو أحذب فُخفياً رأسه في كتفيه.

متّع ناظريك بجمال هذا الطائر، حيث التاج المزّين بالخطوط الملونة بالأبيض والأسود والبني، والنقط الدقيقة على الذقن والصدر، وجناحيه المزخرفين باللون الأبيض.. سبحان الخالق.

ومن مجثمه، ينطلق فُسرماً لالتقاط الحشرات الطائرة القريبة منه. وهذه الهجمات قد تكون في شكل انزلاقات رأسية مستقيمة باتجاه الفريسة، أو في شكل مطاردة توصف بكونها علاقة سعياً وراء فريسة أكثر رشاقة. وهذه

الهجمات عادةً ما تكون ناجحة، حيث يعود الطائر سريعاً إلى مجثمه الأصلي. ويتضمن نمط الطيران العادي ضربات من الجناحين متبوعة بتحويم، ما ينتج نمطاً تمويجياً. كما ينفذ ذيله وجناحيه، ولكنه لا يبرز ذيله مثل بعض أنواع الطيور الهازجة الأخرى. وغالباً ما تتم مشاهدته جاثماً على أسلاك علوية ونادراً ما يكون على الأرض. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، على الرغم من أنه يمكن رؤية العشرات منه في النهار خلال «الخمول» الربيعي عندما تتوقف الهجرة مؤقتاً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران

**صائد ذباب جامباجي***Muscicapa gambagae*

Gambaga Flycatcher

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

غير معروف

الحجم والوزن: 13 - 12 سم / 12 - 14 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مناطق الأراضي الجافة في أفريقيا (من غانا حتى الصومال)، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب غرب الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء في الجنوب الغربي من أفريقيا، رغم عدم وضوح مكان محدد له في أفريقيا. **حاليته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شائع. يهاجر هذا الطائر الاستثنائي ذو اللون الرمادي والبني عبر البحر الأحمر للتكاثر في المملكة. ويوجد في المرتفعات الجنوبية الغربية جنوب مكة المكرمة. **الموئل:** فوق 700 م في المرتفعات التي تضم المناطق الحرجية الخفيفة والغابات المتاخمة للريف المفتوح، خاصة في غابات الطلح التي يزيد ارتفاعها على 1,500 م. ويوجد أيضاً، في غابات العرعر وأنواع الطلح المختلفة

في المناطق الأعلى. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غير معروف بما يكفي، غير أنه يتألف على الأغلب من الحشرات الطائرة التي تؤخذ بعد مهاجمتها من مجثم. وغالباً ما يربى ضمن ارتفاعات متوسطة من الأشجار. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً. قد تكون مناطقية. **الأدوار الأبوية:** رغم أنها غير معروفة بما يكفي إلا أن كلا الطائرين البالغين يتشاركان في رعاية الصغار. **العش:** على شكل وعاء أبيض مصنوع من الأعشاب الناعمة والأغصان الرقيقة وأحياناً شرائح من اللحاء والأوراق، مربوطة بأعواد خيوط العنكبوت ومبطنة بالعشب الناعم والغصينات الرفيعة والشعر والریش، ويوضع على ارتفاع 1.5 - 3 م فوق سطح الأرض على فرع جانبي، أو في تشعب شجرة ما، خاصة الطلح أو العرعر؛ وغالباً ما يكون مكشوفاً ولكن مخفي بطريقة جيدة. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** غير معروفة (13 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مفردة على الأرجح. **ملاحظة:** سُمي هذا الطائر باسم منطقة جامباجا في غانا، حيث تم اكتشافه للمرة الأولى.



مهاجر متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 50,000

منطقة النشاط: تنومة



حنائي أزور*Irania gutturalis*

White-throated Irania

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

غير معروف

15 - 17 سم / 18 - 30 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر حنائي أزور



أنثى حنائي أزور

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في تركيا وفلسطين حتى طاجيكستان وإيران، بينما يقضي الشتاء على بُعد 5,000 كم جنوباً في إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. **حالته بالمملكة:**

مهاجر عابر محدود. هذا الطائر الأنيق مهاجر عابر محدود في المملكة، ولكنه واسع الانتشار في معظم أنحاءها (رغم أنه لم يُسجَل في تبوك). **الموئل:** أي بقعة ذات شجيرات كثيفة، بما في ذلك المتنزهات والحدائق والمناطق الزراعية، والأراضي ذات أشجار الطلع الخفيفة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الحشرات، خاصة الخنافس واليرقات وغيرها من اللافقاريات، وكذلك

بعض أنواع الفاكهة والتوت. وتشتد أهمية الحشرات بالنسبة إليه في فصل الشتاء، ويتغذى في الغالب على الأرض وبين الأغصان المنخفضة، ولكن دائماً ما يلزم الشجيرات.

النشاط: نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يميل هذا الطائر الجميل إلى أن يكون نوعاً يؤثر التسلسل عبر

الفروع المنخفضة عند شعوره بالتهديد، وهو لا يطير بسهولة ويُحجم عن الظهور أمام المراقبين. لكن عندما يفعل ذلك، يكافئ المشاهدين بريشه الأنيق وطبيعته القوية، وأجنحته المتدلّية وذيله الأسود البارز. ويمكن سماعه أحياناً، يشدو بتغريدة كاملة في فصل الربيع مع إطلاق الذكر

نداءً قوياً ونشطاً ذو طابع موسيقي، وغالباً أثناء الطيران.

يمرّ معظم التعداد العالمي


من هذا الطائر الجريء عبر

شبه الجزيرة العربية خلال

الربيع. ولحسن الحظ، يُطلق

تغريداته العالية والصاخبة

على طول الطريق.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

حنائي أوروبي*Erithacus rubecula*

European Robin

غير مهدد

يتزايد

-

-

14 سم / 14 - 25 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال شرق أفريقيا، وفي غرب وجنوب أوروبا حتى شمال إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق

أوروبا وشبه الجزيرة الإسكندنافية إلى وسط روسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً حول البحر الأبيض المتوسط حتى كازاخستان وإيران، مع وصول

بعض الطيور جنوباً إلى شمال المملكة. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. لا يتوافر سوى بضع عشرات من المشاهدات المسجلة لهذا الطائر الصغير في الركن الشمالي الشرقي للمملكة خلال فصل الشتاء (سجل واحد في أغسطس). **الموئل:**

الشجيرات المنخفضة الكثيفة والغطاء النباتي على حافة المناطق المشجرة، خاصة التي تكثر فيها المياه السطحية القريبة، مثل مجرى مائي أو بركة، فضلاً عن

الحدائق الهادئة النامية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل

أساس على الحشرات، ولكن أيضاً على الفاكهة المتساقطة وبعض البذور، كما أنه يعتمد على الرؤية بدلاً من البحث لتحديد

موقع الفريسة الحية المتحركة التي يلتقطها بعد عملية انقباض متميزة من مجثم منخفض، أو قفزة سريعة على السطح. يتقن

هذا الطائر الاختفاء، ويتغذى على الأرض فتجنباً كل الأماكن المفتوحة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً منفرد.

سلوك التكاثر: لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يُعرف هذا الطائر في الجزر البريطانية بأنه جريء وأنيق، ويألف عمال الحدائق لكنه في الوقت نفسه، خجول ومتسلل في


البر القاري، وهذا النوع الأخير هو الذي يأتي إلى المملكة. وعندما لا يكون متحفظاً، يظهر كطائر أبو بليق مزهواً بصدر أحمر بارز، وذيل نصف قائم، وهو ينفذ ذيله وجناحيه بانتظام ويتمايل بجسمه صعوداً وهبوطاً مطلقاً نداءً متميزاً «تيك تيك»، ما يسمح

للطيور غير المرئية المختبئة في النبات التحتي بالتعرف إليه بسهولة.

للوزن خلال فصل الشتاء.

للوزن خلال فصل الشتاء.

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر



زائر شتوي


الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الخفجي

يناير فبراير مارس أبريل مايو

العندليب	الاسم العربي:
<i>Luscinia luscinia</i>	الاسم العلمي:
Thrush Nightingale	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
16 - 17 سم / 14 - 37 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من جنوب شبه الجزيرة الإسكندنافية وشرق أوروبا باتجاه الشرق حتى شمال كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 9,000 كم جنوباً في زامبيا والبلدان المجاورة. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. من المحتمل أن يكون هذا المهاجر لمسافات طويلة منتشراً في جميع أنحاء المملكة أثناء موسم الهجرة، لكن سجل مشاهداته يقتصر على نطاق ضيق نسبياً، بين ينبع وجدة في الغرب، والجبيل وحرص في الشرق، وعلى الرغم من ندرة ما يتم تسجيله من قبل مراقبي الطيور، إلا أن دراسات التحجيل تشير إلى أنه وفير العدد، مثل «العندليب الأوروبي». **الموئل:** المناطق الرطبة ذات الغطاء الكثيف والأوراق المتساقطة، مثل بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي وبرك الزينة ذات الغطاء العشبي الكثيف. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل رئيس على الحشرات وغيرها من مفصليات الأرجل والقواقع الصغيرة، إلى جانب بعض أنواع الفاكهة وثمار التوت. يبحث عن الطعام في الأماكن المنعزلة ووفرة الظل والهادئة، ونادراً ما يطير في إثر الحشرات. ويشاهد في الغالب على الأرض، حيث يجد فريسته، وهو طائر خجول ومتسلل، يجري على الأرض أو يثب عبر الشجيرات عندما يشعر بتهديد ما. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مقارنة مع العندليب الأوروبي، يتميز هذا النوع بخط منتشر على الصدر، وذقن بريش فاتح وذيل وردف أقل حمرة، وكلا النوعين يحافظان على وضعية الجناح المتدلّية.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة




زرقاء زور	الاسم العربي:
<i>Cyanecula svecica</i>	الاسم العلمي:
Bluethroat	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 - 15 سم / 12 - 25 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء شمال أوراسيا وشمال الأسكا، بدءاً من الدائرة القطبية جنوباً وصولاً إلى فرنسا وإيران والصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 10,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في البحر المتوسط ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوب آسيا، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع. هذا الطائر الصغير ذو الريش الملون البديع شائع وينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة بوصفه مهاجراً عابراً (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، وزائراً شتوياً (أكتوبر - مارس).

الموئل: المناطق الرطبة، مثل مناطق معالجة مياه الصرف الصحي والمستنقعات، وأراضي المحاصيل وبرك القصب والأعشاب الكثيفة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بشكل رئيس اللافقاريات، خاصة الحشرات الموجودة في الغالب على السطح أو بين النباتات المنخفضة، كما أنه يتناول بعض أنواع الفاكهة والبذور. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** طائر خجول فتوار عن الأنظار، لا يتعد أبداً عن الشجيرات الكثيفة، يقفز وهو على الأرض المجردة، ولكنه سرعان ما يطير على ارتفاع منخفض، أو يركض نحو الغطاء النباتي عند شعوره بالتهديد. وقد يتسبب القلق أيضاً، في بسط ذيله والقفز لأعلى وأسفل. في فصل الربيع يُغزّد أحياناً. يوجد منه في شبه الجزيرة العربية أنواعاً فرعية عديدة، ولكل منها ترتيب لوني مختلف في ذقن الذكر دقيق الزخرفة.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



صائد ذباب أحمر الصدر*Ficedula parva*

Red-breasted Flycatcher

غير مهدد

يتزايد

-

-

12 سم / 8,5 - 12 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شرق أوروبا حتى غرب روسيا وإيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 كم باتجاه الجنوب الشرقي في باكستان والهند وسلطنة عُمان. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر، زائر شتوي نادر. هذا الطائر الصغير الذي هو يُعدُّ أصغر خاطف ذباب في المملكة، مهاجر عابر نادر (فبراير - مارس، سبتمبر - نوفمبر) في معظم أنحاء المملكة، رغم أنه يتجنب المرتفعات الجنوبية الغربية. وقد تم توثيق وجوده خلال فصل الشتاء (نوفمبر - يناير) في الرياض والظهران. **الموائل:** مناطق الغطاء النباتي الكثيف والأشجار الخفيضة، وغالباً في المناطق الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتألف في معظمه من الحشرات واللافقاريات الأخرى، بما في ذلك العنكب والحلزون وحتى ديدان الأرض. ومن المستغرب بالنسبة لصائد ذباب أنه لا يصطاد الكثير من الطعام عن طريق صيد الذباب، وبدلاً من ذلك، فإنه يحصل على معظم طعامه عبر التقاطه أو التحليق أمام الغطاء النباتي أو على الأرض. وعلى أقرب تقدير، فإنه يلتقط ربع فرائسه في الجو خلال هجماته الرشيقية، وغالباً ما تكون فوق سطح الأرض مباشرة. وينطلق من مجثم، بعيداً الأنظار في كثير من الأحيان. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر الملون من الأنواع التي تُحسن التواري عن الأنظار، إذ سرعان ما يختفي بين أوراق الشجر الكثيفة عندما يشعر بالتهديد، ويمكن رؤيته بعد ذلك، وهو ينفذ جناحيه أو يبسط ذيله.

لا ينمو ريش الصدر الأحمر لدى الذكور إلا بعد السنة الثانية، وتشبه صغار الذكور الإناث. كما تواجه عدوانية أقل من نظرائها الأكبر سناً، لكن فرصها في العثور على شريك تكون أقل.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: ينبع

**هزار شائع***Luscinia megarhynchos*

Common Nightingale

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

غير معروف

17 - 16 سم / 39 - 16 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا حتى غرب الصين وجنوب إيران، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 كم جنوباً في أفريقيا إلى أسفل منطقة الساحل الأفريقي. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. هذا العندليب ذو اللون البني الداكن ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة باعتباره مهاجراً عابراً. **الموائل:** المناطق الرطبة ذات الغطاء النباتي الكثيف، مثل برك معالجة مياه الصرف الصحي، والأركان المغمورة ذات النبات التحتي الكثيف في المتنزهات والحدائق. وقد توجد الطيور المُتعبئة في أي مكان أثناء موسم الهجرة، بما في ذلك الصحاري. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بشكل رئيس اللافقاريات، خاصة الخنافس. لكنه أيضاً يتناول الفاكهة والتوت والبذور. ويبحث عن معظم طعامه ويستهلكه على الأرض. ويرعى هذا الطائر الذي يتوارى عن الأعين، عن طريق جمع الثمار من فروع وأوراق الشجيرات، أو الانتقاض على الفرائس الأرضية من مجثم أو مطاردة الحشرات الطائرة. **النشاط:** نهاري. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** قد يتغذى على الأرض في الغطاء القريب المفتوح، لكنه يأوي بسرعة إلى الغطاء أو يتحرك في طيران منخفض المستوى عند شعوره بالتهديد. ويتميز بأنه يبسط ذيله وينفض جناحيه ويدليهما بانتظام. وتُسمع تغريداته البديعة بانتظام في الربيع، ولكن ليس في الليل، كما هي الحال عادةً في نطاق وجوده الأوروبي.

يعتقد الكثيرون أن العندليب هو صاحب أجمل تغريدة

بين الطيور في العالم.

ويستطيع كل ذكر أن يُغرد أكثر من 180 نوعاً مختلفاً

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.


من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.

من التغريدات، كما يتعلم المزيد من الأغاني تدريجياً مع تقدم العمر.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة


منطقة النشاط: الظهران



الاسم العربي:	حميراء عصماء
الاسم العلمي:	<i>Phoenicurus erythronotus</i>
الاسم الشائع:	Eversmann's Redstart, Rufous-backed Redstart
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	15 سم / 15 - 22 غم




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من طاجيكستان حتى غرب منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم باتجاه الجنوب الغربي من جنوب كازاخستان حتى إيران وشمال الهند. ويبدو أنه طائر مرتحل إلى حد ما في الشتاء، ويمكن أن يصل إلى المملكة ودول الخليج العربي الأخرى في حال أُرغم على الابتعاد خارج نطاق تَشْيِته الطبيعي بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص الغذاء. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر جداً وغير منتظم. تم تسجيل هذا الطائر النشط على أنه زائر شتوي للمملكة، بين الرياض والمنطقة الشرقية بشكل رئيس، مع عدد قليل منه في ينبع. وهو نادر للغاية، لدرجة أنه يمكن اعتباره من الأنواع الشاردة. **الموئل:** المناطق ذات الشجيرات والأشجار (لا سيما أشجار الطلح والغاف). بما في ذلك المناطق المزروعة والبساتين والحدائق العامة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل رئيس اللافقاريات، خاصة خلال موسم التكاثر. نظامه الغذائي الشتوي غير معروف. وتشير المشاهدات إلى أن هذا الطائر في المنطقة الشرقية خلال فصل الشتاء، لا يزال يستهلك كمية كبيرة من الحشرات وغيرها من مفصليات الأرجل الأرضية، بشكل أساس عن طريق الانتظار على الأرض، والانقضاض عليها، وهو يطارد أيضاً الفراش الأرضية بنشاط على الأرض، كذلك الحشرات الطائرة. كما أنه يتناول الفاكهة والبذور. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** غالباً ما يجلس على مجثم بارز، ويفتقر إلى طبيعة الانكفاء التي تتميز بها أنواع طيور حميراء الأخرى في المنطقة، ويختلف عنها أكثر من خلال عدم نفخ جناحيه، إذ غالباً ما يُبقي جناحيه منخفضين فتدلية بشكل طفيف، إضافة إلى أنه يهزّ ذيله نحو الأعلى والأسفل.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة




الاسم العربي:	صائد ذباب شبه مطوق
الاسم العلمي:	<i>Ficedula semitorquata</i>
الاسم الشائع:	Semi-collared Flycatcher
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	يتناقص
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	-
الحجم والوزن:	13 سم / 8 - 17 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في نطاق ضيق بدءاً من البلقان مروراً بتركيا حتى القوقاز وشمال إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,500 كم جنوباً في الأخدود الأفريقي العظيم بشرق أفريقيا. وتقوم تعداداته التي تتكاثر في الشرق بالهجرة في حلقة، باتجاه الجنوب عبر أفريقيا في فصل الربيع، وباتجاه الشمال عبر الجزيرة العربية في فصل الخريف. وقد تهاجر التعدادات الغربية كذلك في حلقة أثناء مرورها عبر المملكة في فصل الربيع. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. هذا الطائر المتباين الشكل بين الذكر والأنثى، واسع الانتشار في جميع أنحاء المملكة، بوصفه مهاجراً عابراً. **الموئل:** في أي مكان تتوافر به الأشجار، بما في ذلك الحدائق الكبيرة والبساتين ومنتزهات المدينة، وحتى المناطق المعزولة التي تكثر فيها أشجار الطلح. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل رئيس الحشرات الطائرة الصغيرة، بما في ذلك «ماي - فلاي» والحشرات والنمل والأرضة والخنافس التي يتم صيدها بعد هجوم من فرع، أو مجثم آخر. ولا يعود هذا الطائر إلى المجثم نفسه دائماً، مثل بعض طيور صائدي الذباب الأخرى. ويتغذى أيضاً على اليرقات وغيرها من الفرائس، وذلك عبر التقاطها من الأوراق والفروع، أو عن طريق الطيران في بعض الأحيان. كما يحط أحياناً على الأرض ليتغذى ويلتقط الفرائس الصغيرة، مثل العناكب والحلزونات الصغيرة. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مثل عديد من الأنواع القريبة منه، يبسط هذا الطائر جناحيه وذيله، كما أنه يدلني جناحيه قليلاً عندما يجثم.

كما يوحي اسمه، يتغذى طائر صائد ذباب شبه مطوق بشكل أساس على الحشرات الصغيرة التي يصطادها في الهواء، معوّلاً على قدرته المذهلة على المناورة، وقوة بصره الاستثنائية، وتوقيته المثالي في الهجوم.

السلوك الاجتماعي: منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مثل عديد من الأنواع القريبة منه، يبسط هذا الطائر جناحيه وذيله، كما أنه يدلني جناحيه قليلاً عندما يجثم.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الثمامة



حميراء شائعة*Phoenicurus phoenicurus*

Common Redstart

غير مهدد

يتزايد

قريب من التهدد

مستقر

14 سم / 11 - 23 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى حميراء شائعة



ذكر - بشرط أبيض على جناحيه



ذكر - بشرط رمادي على جناحيه

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء غرب أوروبا حتى منغوليا وإيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 6,000 كم جنوباً في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي نادر، غالباً ما يشاهد هذا الطائر ذو الألوان الجريئة في الشمال والشرق باعتباره مهاجراً عابراً في الربيع (مارس - مايو)، ولكنه أكثر شيوعاً في الجنوب والغرب في الخريف (سبتمبر - نوفمبر). ويقضي الشتاء (نوفمبر - فبراير) في الجنوب الغربي، وربما في تهامة أكثر من المرتفعات الجنوبية الغربية. **الموئل:** عند الهجرة، يوجد عادةً في الحدائق الكبيرة ذات الغطاء النباتي الكثيف والمنتزهات والمناطق الوعرة كثيفة الأشجار بالقرب من الأراضي الرطبة، على الرغم من أنه قد يظهر في أي مكان في حال تعثرت هجرته. وخلال فصل الشتاء، يوجد في المناطق شبه القاحلة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات وغيرها من اللافقاريات، مع تزايد أهمية البذور في فصل الشتاء. ويتغذى عن طريق النقر في الأوراق والأغصان، أو الانقضاض على الفرائس الأرضية من مجثم منخفض والعودة بها إلى المجثم لتناولها.

كما أنه يحوم بالقرب من الغطاء النباتي ويصطاد الذباب. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يسجل بمفرده، رغم أنه في حال «الهبوط الجماعي»، قد يظهر ما يصل إلى 30 طائراً في أي بقعة من الصحراء لمدة ساعة، أو ساعتين عندما تتوقف الهجرة مؤقتاً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** طائر مُعتد بنفسه نوعاً ما على الأرض. وعندما يكون على المجثم، تجده يهز ذيله باستمرار، وغالباً ما يتميل بجسمه صعوداً وهبوطاً. ويتميز بنمط طيران متموج قليلاً. يوجد منه نوعان فرعيان، وهما *P. p. phoenicurus* (مهاجر عابر) يتميز بجناحين رماديين، و *P. p. samamisticus* (زائر شتوي) ويتميز بشريط أبيض على جناحيه.

لدى هجرة هذا الطائر من


روسيا إلى أفريقيا، يتوقف

للتزود بالطاقة في بحر قزوين

للتحضير لأصعب جزء من

رحلته الملحمية؛ ألا وهو عبور

صحارى شبه الجزيرة العربية.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران

**حميراء سوداء***Phoenicurus ochruros*

Black Redstart

غير مهدد

يتزايد

قريب من التهدد

مستقر

14 - 15 سم / 12 - 20 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر حميراء سوداء


النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول البحر المتوسط حتى إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في أنحاء كثيرة من أوروبا والصين، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 3,000 كم جنوباً في شمال وشرق أفريقيا عبر شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى ميانمار. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود، زائر شتوي محدود. ينتشر هذا الطائر الملون على نطاق واسع بوصفه مهاجراً عابراً (مارس - مايو، سبتمبر - نوفمبر) للمملكة. كما ينتشر على نطاق واسع خلال فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير)، فتجنباً البحار الرملية والسهول الشمالية الخالية من الأشجار فقط. **الموئل:** الوديان الصخرية ذات أشجار الطلح، أو غيرها من النباتات الشجرية، والحدائق الخضراء الكبيرة، والمناطق المزروعة ذات الغطاء وفي جميع أنحاء مرتفعات عسير. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات وغيرها من اللافقاريات، مثل العناكب والرخويات وديدان الأرض، إلى جانب الفاكهة والتوت والبذور. وفي فصل الشتاء، يتغذى على الحشرات بشكل رئيس على الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مقارنةً بطيور حميراء الأخرى، فإن هذا الطائر أقل حجلاً ويقضي وقتاً أكبر على الأرض ويجري بسهولة أكبر، ويحفر أيضاً، في الطبقة السطحية لتحديد مكان الطعام، ويبدو أنه ينشئ مناطق تغذية شتوية. ويتردد على الموقع نفسه في فصول الشتاء المتتالية. كما لوحظ من الطيور المحجلة منه بالقرب من الرياض. علاوةً على ذلك، هذا النوع لا يهز ذيله بانتظام كطائر حميراء شائعة.

يغيّر هذا الطائر أسلوبه في الرعي؛ ففي الصيف يصطاد الحشرات من أوراق الشجر أو في الجو، أما في الشتاء، فيصطاد الحشرات على الأرض.

يغذي على الحشرات وغيرها من اللافقاريات، مثل العناكب والرخويات وديدان الأرض، إلى جانب الفاكهة والتوت والبذور. وفي فصل الشتاء، يتغذى على الحشرات بشكل رئيس على الأرض. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** مقارنةً بطيور حميراء الأخرى، فإن هذا الطائر أقل حجلاً ويقضي وقتاً أكبر على الأرض ويجري بسهولة أكبر، ويحفر أيضاً، في الطبقة السطحية لتحديد مكان الطعام، ويبدو أنه ينشئ مناطق تغذية شتوية. ويتردد على الموقع نفسه في فصول الشتاء المتتالية. كما لوحظ من الطيور المحجلة منه بالقرب من الرياض. علاوةً على ذلك، هذا النوع لا يهز ذيله بانتظام كطائر حميراء شائعة.



أنثى حميراء سوداء



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تنومة



سمنة صخرية زرقاء*Monticola solitarius*

Blue Rock-thrush

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

غير معروف

20 - 23 سم / 70 - 75 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر سمنة صخرية زرقاء



أنثى سمنة صخرية زرقاء

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول البحر المتوسط، ومن جبال الهيمالايا حتى الصين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من تركيا وإيران حتى شمال شرق الصين واليابان، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 3,000 كم جنوباً في شرق أفريقيا عبر شبه الجزيرة العربية حتى جنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محدود. يُصنف صائد الذباب الأزرق المتميز هذا، وهو الأكبر في عائلته في المملكة، على أنه مهاجر عابر غير شائع، لكنه واسع الانتشار عبر المملكة (مارس - مايو، سبتمبر - أكتوبر)، وهو أكثر شيوعاً في الخريف، مقارنة

بالربيع في المنطقة الشرقية. كما أنه واسع

الانتشار بوصفه زائراً شتوياً (أكتوبر - مارس)،

فيوجد في جميع أنحاء المملكة، باستثناء

بحار الرمال والسهول الشمالية. **الموئل:**

في الشتاء، يوجد في الموائل الصخرية وفي

المناطق المبنية أحياناً. يمكن أن يظهر في

أي مكان على طول طريق الهجرة. **سلوك**

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:

الحشرات، خاصة الجنادب واليرقات وغيرها

من اللافقاريات، مثل الديدان والحلزونات، وكذلك الفقاريات الصغيرة، مثل السحالي

والثعابين والضفادع. ويتناول بعض أنواع الفاكهة والبذور وثمار التوت. ويصطاد عبر

الانقضاض على الفريسة من مجثم مرتفع، كصخرة أو غصن. وهو من الطيور التي

تتغذى على الأرض بشكل عام، ولكنه أيضاً، ينتقي من النباتات ويصطاد الحشرات

في الجو أحياناً. **النشاط:** نهاري، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في

أزواج، أو مجموعات متفرقة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:**

هذا هو الطائر الأزرق الوحيد الذي يمكن رؤيته في المملكة، ومقارنة بطائر السمنة

الصخرية يبدو ذيله أطول وأقل استقامة.

يحتاج هذا الطائر إلى هرمون


التستوستيرون لإنتاج ريشه

الأزرق، ما يُضعف جهازه

المناعي. وهكذا يبرهن الذكر

ذو الريش الأزرق على قدرته في

التغلب على هذه العقبة.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جبل فيفاء



أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو

سمنة صخرية*Monticola saxatilis*

Common Rock Thrush, Rufous-tailed Rock-thrush

غير مهدد

يتناقص

قريب من التهدد

غير معروف

16 - 19 سم / 40 - 65 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى سمنة صخرية

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 - 9,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في شرق أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع. هذا الطائر الجميل مهاجر بانتظام، لكنه غير مالوف في جميع أنحاء المملكة، خاصة في فصل الربيع. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أي مكان عند الهجرة، خاصة الأماكن الصخرية أو ذات الغطاء النباتي الكثيف والمباني الكبيرة والمنتزهات العامة وعلى الأطلال. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: يقوم بشكل أساس على الحشرات وغيرها من اللافقاريات، مثل الديدان

والحلزونات. إضافة إلى السحالي الصغيرة

والضفادع إن تمكّن من الإمساك بها، ويتناول

أيضاً بعض الفاكهة وثمار التوت. ويجد

فريسته من خلال مراقبتها من مجثم ما، ثم

ينقض على الأرض للقبض عليها. وفي بعض

الأحيان، يطارد الحشرات ويأكل الفاكهة

مباشرة من الشجرة. ويمكن رؤيته على الأرض

في معظم الأحيان. **النشاط:** نهاري، ويهاجر

ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجّل

منفرداً أو في أزواج، ولكن في بعض الأحيان، قد تمرّ مجموعات متفرقة منه عبر المملكة


معاً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر متميز الشكل بين

الجنسين قصير الذيل وطويل المنقار وذو وقفة مشدودة. يُعدّ إلى حد ما طائر خجول،

وغالباً ما يطير حول عائق ما، كصخرة على سبيل المثال حتى يتوارى عن الأنظار.



ذكر سمنة صخرية



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران



يناير فبراير مارس أبريل مايو



يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

القليعي

برقش أحمر
Saxicola rubetra
Whinchat
غير مهدد
يتناقص

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:

12 - 14 سم / 13 - 26 غم



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء أوروبا وصولاً إلى شمالي كازاخستان وإيران، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 - 7,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في منطقة الساحل الأفريقي وشرق أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر. يُعدُّ هذا

الطائر ذو العلامات الداكنة مهاجراً شائعاً، وواسع الانتشار (مارس - مايو، أغسطس - أكتوبر)، وهو أكثر شيوعاً في فصل الربيع. كما يقضي عدد صغير منه فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير) في الجنوب الغربي. **الموئل:** الموائل المفتوحة، خاصة المستنقعات وأطراف أراضي المحاصيل والأراضي الساحلية ذات الأشجار الخفيفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: اللافقاريات، خاصة الحشرات الصغيرة. ويصطاد



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل

**يستطيع طائر القليعي**

محاكاة الطيور الأخرى

بسهولة، ففي إحدى المرات،

عمدَ أحد طيور القليعي إلى

تقليد العندليب، ثم قلده

جاره، وهكذا.. حتى أصبح

نصف التعداد المحلي يقلد

العندليب بعد ذلك بأيام

قليلة فقط.

الهبوط الجماعي، **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** له سلوك مشابه

لأنواع طيور القليعي الأخرى، غير أنه يمكن تمييزه عن طريق حواجبه البارزة وأطراف

ذيله باللون الأبيض. عندما يشعر بالتهديد، أو الإثارة فإنه ينفذ ذيله وجناحيه ويطيير

قزعا، في نمط صاخب إلى حد ما، مع رفرفات سريعة متتابعة من جناحيه.

سمنة صخرية صغيرة*Monticola rufocinereus*

Little Rock-thrush

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

15 - 16 سم / 20 - 27 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق أفريقيا (تنزانيا وصولاً إلى إثيوبيا وإريتريا) وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. ويُعرف منه نوعان فرعيان، أحدهما *M. r. sclateri* الذي يتوطن جنوب غرب المملكة وغرب اليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يوجد هذا الطائر البرتقالي الأنيق ولون الممر الأسود الداكن في المرتفعات الجنوبية الغربية، باستثناء الأطراف الشرقية القاحلة جنوب مدينة الطائف. **الموئل:** فوق 1,500 م في المرتفعات الصخرية ذات الغطاء النباتي الكثيف، بما في ذلك الغابات المفتوحة (خاصة غابات العرعر الناضجة)، وغابات الطلح والأشجار حول المنازل والحدائق

وأطراف المناطق المزروعة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات، بما في ذلك اليرقات والخنافس والجنادب، فضلاً عن الفاكهة، وهو يسمح المنطقة بحثاً من مجثم على شجرة ما، قبل أن ينقض على فريسته فوق سطح الأرض. وينطلق في إثر الحشرات أثناء الطيران، أو يبحث بنشاط عنها بين الشجيرات. **النشاط:** شفقي ونهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً يوجد منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات عائلية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج

لا أحد يعرف الكثير عن هذا

الطائر الصغير الذي يقتصر

وجوده على غرب شبه

الجزيرة العربية وشرق أفريقيا.

ربما يُعدُّ طائراً مدهشاً.

عائلة. متكاثر أحادية الزواج اجتماعياً، قد تكون

مناطقية. الأدوار الأبوية: غير معروفة بما

يكفي. ويتشارك كلا الطائرين البالغين


في رعاية الصغار. **العش:** قاعدة غير مرتبة (يختلف الحجم وفقاً للمساحة المتوفرة)

مصنوعة من العشب وشرائح اللحاء والأغصان والجذور والطحالب، مبطنة بالعشب

الرفيع واللحاء وأحياناً الشعر والريش، وتوضع على ارتفاع يراوح بين متر واحد إلى

3 م فوق الأرض في تجويف شجرة ناضجة (خاصة العرعر)، أو في صخرة، أو جدار، أو بناء

أو جذر شجرة مكشوف. وغالباً ما يكون التجويف مفتوحاً، مع ظهور العش بوضوح.

موقع غريب: حصان معدني هزاز مجوف في منطقة خاصة بلعب الأطفال، أو صندوقتوزيع كهربائي. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (13 - 15 يوماًفي الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (16 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة).**الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.

مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 12,500

منطقة النشاط: محمية ريدة



أبلق شمالي*Oenanthe oenanthe*
Northern Wheatear

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

15 - 16 سم / 18 - 33 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر أبلق شمالي



أنثى أبلق شمالي

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء أوراسيا وألاسكا وشرق كندا وغرينلاند، بينما يقضي فصل الشتاء بتعداده كاملاً على بُعد 3,000 - 15,000 كم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. هذا الطائر الاستثنائي الذي يُعدُّ أحد أعظم الطيور المهاجرة في العالم، مهاجر عابر شائع وواسع الانتشار (مارس - مايو، سبتمبر) في جميع أنحاء المملكة، خاصة في فصل الربيع حين يمكن رؤية العشرات، أو حتى المئات منه في يوم واحد، رغم أن الأرقام يمكن أن تختلف على نطاق واسع سنة تلو الأخرى. والطيور التي تُسجَّل في فصل الشتاء هي على الأرجح طيور مهاجرة فُكرت وليست لقضاء

الشتاء. **الموئل:** الأراضي الساحلية ذات الأشجار الخفيفة والنفائات الرملية وحقول العلف وملعب الغولف والأماكن الصخرية المفتوحة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات وغيرها من اللافقاريات، مثل العناكب والحريشة. ويتناول أيضاً، بعض ثمار التوت. ويصطاد بنشاط على الأرض، أو عن طريق الانقضاض على الفرائس، أو القفز لاصطياد الذباب، أو الحفر في الأرض بمنقاره. كما أنه يتمايل بجسده ويهز ذيله وجناحيه باستمرار. يفضل الطيران فوق

الأرض مباشرة، وغالباً ما يفز عبر الانتقال من مجثم إلى آخر عوضاً عن الطيران في رحلة واحدة طويلة. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يُسجَّل إما منفرداً، أو في مجموعات مهاجرة حرة. ويمكن أن يؤسس مناطق تغذية محلية في طريق الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يتميز الذكر بين طيور الأبلق بظهره وتاجه الرماديين. كما يهاجر أبعد من أي طائر مغرد على الأرض ويسافر بسرعة 290 كم في اليوم الواحد. إنه يُغذف أحد أروع الطيور المهاجرة في العالم.

هذا الطائر يمكنه فعل

المستحيل. فالتعدادات

منه التي تتكاثر في ألاسكا


تقطع مسافة 15,000 كم

عبر آسيا وشبه الجزيرة

العربية وصولاً إلى جنوب

أفريقيا، ثم تعود إلى ألاسكا

مرة أخرى في موسم التكاثر.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة**منطقة النشاط:** سبخة الفصل**القليبي الشائع**

برقش

Saxicola torquatus

Common Stonechat

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر (على الأرجح)

13 سم / 13 - 17 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب أفريقيا وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية وجنوب أوروبا حتى إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر عبر أوراسيا، بينما يقضي الشتاء في شمال وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي شائع. يوجد ثلاثة من أصل 24 نوعاً فرعياً مُعترف بها بانتظام في المملكة. وتعد أحياناً أنواعاً مستقلة: القليبي الأوروبي (*S. t. rubicola*)، وهو مهاجر عابر نادر وزائر شتوي إلى الشمال والشرق والغرب؛ و القليبي الشرقي أو السيبيري (*S. t. maurus*)، وهو زائر شتوي شائع منتشر، و القليبي العربي (*S. t. felix*)، وهو مقيم ومتوطن في

جنوب غرب شبه الجزيرة العربية (ويطلق عليه أحياناً اسم القليبي الأفريقي). **الموئل:**

القليبي الأوروبي، يوجد في الأراضي الساحلية ذات الأشجار الخفيفة والهضاب المرتفعة.

القليبي الشرقي، في المستنقعات. القليبي

العربي، فيوجد على ارتفاع فوق 2,000 م في

المناطق المفتوحة المسطحة التي يتوافر

بها الغطاء النباتي المنخفض. **سلوك****البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات والفقاريات الصغيرة والبيذور. يصطادعبر الانقضاض على الفريسة من مجثم بارز. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً. **السلوك****الاجتماعي:** عادةً منفرداً، أو في مجموعات صغيرة تتألف من خمسة طيور كحد أقصى.**سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أحادية الزواج اجتماعياً، أو متعددة الزواج في أحيانٍ أخرىبتعشيش ذكر واحد مع أنثيين. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض.ويشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل وعاء مصنوع من

العشب والطحالب والشعر، مبطن بالشعر وبعض الطحالب والخيوط، على أساس من

الغصينات القصيرة وشرايط اللحاء الرفيعة، موضوع على الأرض في غطاء نباتي كثيف

أو أسفل شجيرة منخفضة، أو في حزمة كثيفة من الأعشاب النامية. **البيض المحضون:**3-4 بيوض. **الحضانة:** 14-15 يوماً. **مدة التعشيش:** 13-16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.

أنثى



أنثى




ذكر



ذكر



ذكر القليبي الشائع



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 20,000**منطقة النشاط:** جبل السودان

أبلق أشهب

أبلق درجي
Oenanthe isabellina
Isabelline Wheatear
غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
مستقر
17 - 16 سم / 21 - 39 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر بدءاً في تركيا والأردن عبر إيران وسلطنة عُمان حتى منغوليا، بينما يقضي الشتاء حتى 5,000 كم باتجاه الجنوب الغربي في منطقة الساحل الأفريقي ومنطقة شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية حتى شمال الهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، **زائر شتوي شائع.** يُصنّف الأبلق الأشهب على أنه طائر شائع وواسع الانتشار في جميع أنحاء المملكة خلال موسم الهجرة (مارس-أبريل، سبتمبر،

وزائر شتوي (أكتوبر - فبراير). **الموئل:** الصحراء الرملية المفتوحة والسهوب والجبال القاحلة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات وغيرها من اللافقاريات، بما في ذلك النمل والذباب والبق والقراد والخنافس والصراصير وأسد النمل واليرقات، إلى جانب بعض البذور. وعادةً ما يجثم على صخرة ما، أو نبتة صغيرة، ثم ينقض على الفريسة ويأكلها قبل أن يعود إلى المجثم ذاته، وهو يضرب الفرائس الكبيرة، مثل الجراد والجندب قبالة الأرض قبل تقطيعها

غالباً ما تغرد طيور الأبلق في الهواء قبل أن تؤدي حركة سقوط حر عمودية مذهلة باتجاه الأرض. وعادة ما تؤدي هذه الحركة الخطرة في الظلام الدامس لتحقيق أقصى قدر من نقل الصوت.

والتهامها. كما أنه يطارد الفريسة على الأرض المفتوحة في قفزات بواسطة خطوته الطويلة المتميزة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو بأعداد صغيرة في موسم الهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يقطن هذا الطائر المناطق المفتوحة القاحلة في فصل الشتاء، لديه أرجل طويلة ويقف منتصباً على الأرض، وغالباً ما يتمايل برأسه ويهز ذيله القصير. كما يُعدّ دأبم اليقظة للفرائس والأعداء.



مهاجر عابر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: سبخة الفصل

**أبلق أحمر الصدر**

Oenanthe bottae
Buff-breasted Wheatear,
غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
14 - 16 سم / غير معروف


الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، ولا يوجد سوى في المملكة وغربي اليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يوجد في المرتفعات جنوبي مدينة الطائف. **الموئل:** على ارتفاع فوق 2,300 م في المناطق المفتوحة المسطحة أو المائلة قليلاً، بما في ذلك الحقول المزروعة والمدرّجة (خاصة ذات الضفاف أو الجدران الصالحة للتعشيش)، والهضاب الصخرية ذات الشجيرات المتناثرة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يشمل الحشرات ويرقاتها. ومن المحتمل أنه يأكل النمل والخنافس واللافقاريات الأخرى، وربما السحالي الصغيرة، والبذور والتوت. يبحث في الأرض عن الفرائس، أو يراقب من مجثم ما وينقض عليها من الأعلى. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً منفرداً، أو في مجموعات عائلية صغيرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة

منطقة متوطنة تدافع عن منطقة سيادتها بضراوة، ويطرده أي نوع آخر من طيور الأبلق يسوقه حظه العاثر إلى مجاله الجوي.

بالصغار، إلى جانب الدفاع عن منطقة السيادة بضراوة، في حين تتولى الأنثى حضن البيض. **العش:** على شكل وعاء مصنوع من العشب والقش، مبطن بالأعشاب الدقيقة والشعر، موضوع في حفرة أو شق (على عمق أقل من متر واحد) في صخرة أو تحتها، أو ضفة، أو جدار، أو في جحر قوارض. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (15 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزودة. **ملاحظة:** فيما سبق، كان هذا الطائر يُعدّ من النوع نفسه الذي يضم طيور أبلق أشهب، أو أبلق هيوجلين (*O. heuglini*)، أو أبلق أحمر الصدر (*O. frenata*). لم يتم التعرف إليه سوى في الآونة الأخيرة، بوصفه نوعاً مستقلاً محصوراً في شبه الجزيرة العربية، وبالتالي فهو متوطن.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 13,000
منطقة النشاط: تنومة



أبلق صحراوي*Oenanthe deserti*

Desert Wheatear

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

15 - 15 سم / 15 - 34 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر أبلق صحراوي

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال أفريقيا حتى سورية والأردن وشمال المملكة، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال غرب أفريقيا ومن إيران وكازاخستان حتى منغوليا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم باتجاه الجنوب الغربي القاحل شمالي أفريقيا، وشبه الجزيرة العربية حتى شمال الهند. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً، مهاجر عابر شائع جداً، زائر شتوي شائع جداً. يوجد هذا الطائر المتكيف مع الصحراء على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة خلال موسم الهجرة (أبريل - مايو، أغسطس - سبتمبر)، وفي فصل الشتاء (أكتوبر - مارس). كما يتكاثر تعداد قليل منه في أقصى شمال المملكة، ولكن ربما ليس في كل عام. **الموئل:** على ارتفاع دون 2,700 م في الأراضي المسطحة المفتوحة ذات الأشجار الخفيفة والأعشاب والمناطق المزروعة والهضاب البركانية وحزم الأشجار الخفيفة داخل أنظمة الكثبان الرملية. **سلوك البحث عن الغذاء:**

يتميز هذا النوع من طيور

الأبلق التي تعيش في


الموائل القاحلة بجسد رملي

اللون للتمويه، وأطراف سوداء

على الذيل والجناحين، لأن

الريش الأسود مقاوم للتآكل.

من على الأرض. وغالباً ما يبحث واحد أو اثنان من طيور الهاجرة الصحراوية الآسيوية عن الغذاء إلى جانب هذا النوع، ويفترض أنهما يتبادلان فوائدهم الحيوانية المفترسة وإيجاد الغذاء. **النشاط:** نهارى، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج؛ أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل وعاء ضحل مصنوع من السيقان النباتية والأعشاب، مبطن بالأعشاب الناعمة، أو الشعير، أو الصوف، أو الريش، موضوع في حفرة في الأرض (غالباً جحر قوارض مهجور)، بين الصخور، أو على الأرض تحت شجيرة. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة غالباً.



مقيم متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40

منطقة النشاط: جبل حمران جودة

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

أبلق مقلنس*Oenanthe monacha*

Hooded Wheatear

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

18 سم / 18 - 23 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى أبلق مقلنس

النطاق العالمي: مقيم مع بعض التشتت في الشتاء، حيث يوجد بشكل متقطع في شمال شرق مصر بالاتجاه نحو شبه الجزيرة العربية حتى باكستان. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع، زائر شتوي نادر. في المملكة، يُعدُّ هذا الطائر الأنيق متميز الشكل بين الجنسين مستقراً بشكل أساسي، لكن يوجد دفق صغير منه في فصل الشتاء، خاصة بمنطقة الخليج، وذلك بسبب قدوم طيور من التعداد المحلي الأكبر الذي يوجد في إيران. **الموئل:** على ارتفاع دون 1,240 م في المناطق النائية والجافة والصخرية ذات الجروف والوديان والمنحدرات الصخرية. وغالباً ما يوجد في الشتاء بعيداً عن الجروف في التلال الصخرية الصغيرة وحول المباني المنعزلة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات، مثل الجراد والخنافس

واليعسوب والفراشات والنحل والنمل وغيرها

من اللافقاريات، مثل القراد والعناكب. يربى

بشكل رئيس في الهواء، ويطارد الحشرات

بشكل عمودي حتى ارتفاع 100 م فوق

سطح الأرض. ويمسح المنطقة من مجثم

قبل أن الفتك بفريسته على الأرض. وغالباً


ما يربى على الماعز والإبل وحولها، ويتناول

حشرات القراد الكبيرة. **النشاط:** نهارى.

السلوك الاجتماعي: منفرد، أو في أزواج. كما يشكّل مناطق تغذية مؤقتة خلال فصل الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل وعاء مصنوع من الحشائش والأعشاب الجافة، مبطن بالصوف والريش ويوضع في شق عميق في صخرة. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 15 يوماً. **الحضنة:** غير معروفة.



ذكر أبلق مقلنس



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,750

منطقة النشاط: محمية طويق

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

أبلق قبرصي*Oenanthe cypriaca*

Cyprus Wheatear

غير مهدد

مستقر

-

-

14 سم / غير معروف

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر أبلق قبرصي




أنثى أبلق قبرصي

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر فقط في جزيرة قبرص، في حين يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,500 كم جنوباً في شمال شرق أفريقيا (السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتشاد). **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر نادر. تم التعرف إلى هذا الطائر النادر في المملكة منذ بضعة أشهر، في شهري مارس وسبتمبر بين ينبع وجدة (شمال المدينة) وفي البر الداخلي بالعشيرة (شمال الطائف). قد تمز بعض هذه الطيور فوق المملكة من دون توقف، بينما يهاجر البعض الآخر فوق شرق أفريقيا. **الموئل:** الوديان والأراضي ذات الأشجار الخفيفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، خاصة أثناء الهجرة. من المعروف أنه يأكل الحشرات، بما في ذلك يرقاتها. ومن المرجح أيضاً، أن يكون نظامه

هذا الطائر النادر يتكاثر فقط في قبرص، ويستطيع أن يطير مسافة 2,500 كم نحو شمال شرق أفريقيا في رحلة واحدة تستغرق يومين ونصف.

السلوك الاجتماعي: منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** لم يُصنّف هذا النوع على أنه نوع مستقل عن الأبلق الذي يوجد أيضاً في المملكة، سوى في الآونة الأخيرة. لذلك، ثمة القليل من المعلومات المسجلة عنه في المملكة. تجدر الإشارة أيضاً، إلى أن صوته يختلف تماماً عن صوت الأبلق الأبقع.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40

منطقة النشاط: المنطقة النائية من جدة

**أبلق أسود الأذن***Oenanthe hispanica*

Black-eared Wheatear

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

14 - 15 سم / 12 - 21 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أبلق أسود الأذن بفتاح وجه داكن واسع نسبياً


النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر حول البحر الأبيض المتوسط حتى إيران، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في منطقة الساحل الأفريقي. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي محلي. هذا الأبلق الصغير، الأصغر في المملكة، مهاجر عابر غير شائع ولكنه واسع الانتشار في جميع أنحاء المملكة، وتتركز هجرة الربيع في بضعة أيام فقط، عادةً في مارس أو أبريل، حيث يمكن أن يكون هذا الطائر شائعاً محلياً في بعض الأحيان، مع عودته بأعداد أصغر ولفترة أطول في فصل الخريف. وقد قضى عددٌ منه فصل الشتاء بالقرب من ينبع. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أي مكان على طول طريق الهجرة، غير أنه يفضل الأماكن المُشجرة المفتوحة، مثل

الأطراف العشبية من الحقول، أو الأراضي الرطبة والحدائق الكبيرة، وأي مكان آخر تتوفر به نباتات منخفضة ولاقاربات كثيرة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل رئيس اللاقاربات، خاصة الحشرات واليرقات، إلى جانب كميات صغيرة من التوت واليدور. ويجثم على ارتفاع أكبر نسبياً، مقارنة بمعظم أنواع الأبلق الأخرى، غالباً على سلك هاتف،

ثم ينقض مباشرة باتجاه الفريسة على الأرض، أو يطاردها وهو يقفز. كذلك يعتمد إلى الطيران لجمع الطعام من أوراق الشجر، ويقوم بهجمات قصيرة لاصطياد الذباب. **النشاط:** نهاري، ويهاجر ليلاً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في مجموعات صغيرة متفرقة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** طائر رشيق وطويل ذو ريش أنيق، وغالباً ما يتم ترويضه. يمكن أن يوجد كلا جنسيه بشكليين مختلفين من الريش، فأحدها يتميز بفتاح وجه داكن وضيق نسبياً، في حين يكون لدى الآخر وجه ورقي داكن. وتتراوح نسبة الذكور الداكنة الرقبة بين 42 - 80%، وهي الأكبر في التعدادات التي تتكاثر في الشرق.



أبلق أسود الأذن بفتاح وجه داكن ضيق نسبياً



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الجبيل



أبلق أسود الذنب

Oenanthe melanura

Blackstart

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتزايد

14 سم / 13 - 18 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في منطقة الساحل الأفريقي والسهل الساحلي للبحر الأحمر، ومن شبه الجزيرة العربية حتى سيناء وجنوب سوريا. ويوجد اثنان من إجمالي ستة أنواع فرعية مُعترف بها في المملكة، بما في ذلك *O. m. neumanni*. وهو متوطن في شبه الجزيرة العربية ويوجد في المملكة واليمن وغرب سلطنة عُمان، و *O. m. melanura*. وهو متوطن في شبه الجزيرة العربية ويوجد في وسط المملكة وشمالاً حتى سوريا. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يوجد طائر الأبلق هذا الذي يتميز بلونه الأزرق المائل إلى الرمادي في المرتفعات الجنوبية الغربية (*O. m. neumanni*)، ووسط وشمال غرب المملكة (*O. m. melanura*). **الموئل:** دون 2,150 م في الوديان والمناطق الصخرية القاحلة التي تتوافر بها أشجار الطلح. كما شوهد بانتظام بالقرب من القرى في الجنوب الغربي، لكنه يتجنب المساكن البشرية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام

الغذائي: الحشرات، خاصة النمل والخنافس واليرقات، فضلاً عن ثمار التوت التي يلتقطها عن طريق مسح المنطقة من مجثم منخفض قبل الانقضاض على الفريسة على الأرض، أو عن طريق اصطياد الحشرات الطائرة أثناء طيرانه. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج عادةً. **سلوك التكاثر:** نظام

عند تعشيش هذا الطائر في شق ما، تقوم الأنثى ببناء متراس حجري بالقرب من مدخل الشق، حيث ينهار المتراس بصوت مرتفع في حال اقترب منه أي مفترس، ما يؤدي إلى تنبيه الأنثى ومن ثم الفرار.

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار، أما عن دور البالغين في حضن البيض فغير معروف. **العش:** على شكل وعاء مصنوع من العشب، أحياناً ممزوج بخيوط أو قماش، وهو مبطن بالعشب الناعم والشعر، وفي أحيان أخرى الريش، موضوع في حفرة، أو شق بين صخور منخفضة، أو على الأرض مباشرة، وغالباً ما يكون ذلك مع رصف من الحصى الصغيرة المسطحة التي تؤدي من مدخل التجويف إلى العش (في أحايين أقل، يوضع في حفرة في جدار، أو مبنى، أو شجرة). **موقع غريب:** ماسورة عادم لسيارة. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 900,000

منطقة النشاط: جبل اللوز



أبلق أبقع

Oenanthe pleschanka

Pied Wheatear

غير مهدد

مستقر

-

-

15 - 16 سم / 16 - 22 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى أبلق أبقع


النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من رومانيا إلى شمال شرق الصين، بينما يقضي الشتاء على بُعد 4,000 - 8,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في شمال شرق أفريقيا، مع احتمال مرور معظم تعداده العالمي عبر المملكة. **حاليته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. يُصنّف هذا الطائر المتميز الشكل جنسياً، على أنه مهاجر شائع وواسع الانتشار عبر المملكة، خاصة في فصل الربيع. وربما يمضي بعض أفراد فصل الشتاء في تبوك وأقصى جنوب تهامة. **الموئل:** يمكن أن يظهر في أي مكان على طول طريق الهجرة، غير أنه يفضل مناطق الأشجار الكثيفة المفتوحة ذات الأرض المجردة حيث تكثر الفرائس اللاقارية، لا سيما المناطق الخضراء، مثل الحقول المروية بنظام الري المحوري، أو الأراضي ذات الأشجار الخفيفة بالقرب من الأراضي الرطبة. **سلوك البحث عن الغذاء:**

عادةً ما تكون أنواع الأبلق التي تعيش في الأراضي الوعرة بلونين أسود وأبيض، هذا الطائر في أي منظر طبيعي من الصخور والظل، وبالتالي إرباك الحيوانات المفترسة المحتملة.

النظام الغذائي: الحشرات، خاصة النمل والخنافس، وتزيد أهمية الفاكهة بالنسبة له في فصل الخريف. كما يصطاد من خلال مسح المنطقة من مجثم هادئ منخفض فوق الأرض المجردة، حيث ينقض على فريسته من الأعلى. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج واضحة تتحرك معاً في فصل الربيع. وفي فصل الربيع أيضاً، قد يكون هناك هبوط جماعي لعشرات من الطيور في منطقة صغيرة، نتيجة لتعطل الهجرة مؤقتاً، مع استئناف معظمها الطيران في نهاية اليوم. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يكون منتصباً في حال سكونه، ويُبرز هذا الانتصاب بتدلية ذيله، لكن ساقه القصيرتين تمنحانه مظهراً أفقياً أكثر مما لو كان على الأرض. كما يوجد منه شكل نادر أبيض الرقبة، وتم تسجيله في المملكة إلى جانب الشكل الطبيعي أسود الرقبة.



ذكر أبلق أبقع



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الظهران



أبلق فينشي*Oenanthe finschii*

Finsch's Wheatear

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

14 سم / 22 - 32 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر أبلق فينشي



أنثى أبلق فينشي

النطاق العالمي: مهاجر؛ توجد التعدادات المقيمة منه في سوريا حتى أفغانستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من تركيا حتى شمال باكستان، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 1,000 كم جنوباً من فلسطين عبر شمال شبه الجزيرة العربية حتى باكستان. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. يُصنّف هذا النوع واللامع والمتعدد الألوان وممتلئ الجسم من طيور الأبلق على أنه زائر شتوي نادر ولكن واسع الانتشار إلى الشمال ومنطقة الخليج العربي. **الموئل:** السهول الصخرية النائية ذات النباتات المتفرقة. **سلوك البحث عن**

الغذاء: النظام الغذائي: اللافقاريات، خاصة النمل والجنادب، إلى جانب مجموعة واسعة من مفصليات الأرجل الأخرى. هذا النوع يُمضي المزيد من الوقت على الأرض، مقارنةً بمعظم أنواع الأبلق السوداء والبيضاء الأخرى. ويجثم على الصخور والجلاميد والنباتات القصيرة، بدلاً من الأشجار والشجيرات. كما يستخدم المجاثم المنخفضة لتحديد موقع فريسته، ثم ينقض عليها، أو يلاحقها على أرض مكشوفة.

أو في بعض الأحيان يهاجم الحشرات الطائرة وهو في الجو. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يمكن أن يرفع ذيله إذا كان قلقاً، وهو طائر حذر نوعاً ما، ورحلات طيرانه الطويلة تعني أنه تصعب رؤيته جيداً في كثير من الأحيان. معظم الملاحظات تخص الذكور، ما يشير إلى أن الإناث أكثر خجلاً، أو على الأرجح أنها تعتمد إلى قضاء فصل الشتاء في مناطق مختلفة.

بعد هجرته إلى المملكة،


ينشئ هذا الطائر النادر

منطقة السيادة لقضاء

الشتاء، ويدافع عنها بصرامة،

وقد يعود إلى المنطقة

نفسها لسنوات عدة متتالية.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جبل حمران جودة

**أبلق أبيض قنة***Oenanthe leucopyga*

White-crowned wheatear

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

17 سم / 23 - 29 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



فرخ أبلق أبيض قنة



أبلق أبيض قنة بالغ

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد عبر شمال أفريقيا إلى شرق المملكة. ويُعرف منه نوعان، فرعيان، أحدهما *O. l. ernesti*، وهو شبه متوطن في شبه الجزيرة العربية، ويمتد نطاق وجوده إلى سيناء وجنوب الأردن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. ينتشر هذا الأبلق اللامع على نطاق واسع في الغرب، ولكنه يغيب عن القمم العليا والجرف الغربي. كذلك يوجد في السهول الوسطى وجرف طويق والحافة الشرقية لهضبة الصمان (في المنطقة الشرقية). **الموئل:** المناطق المهجورة والقاحلة، بما في ذلك الجروف الصخرية والمنحدرات الجلمودية والمنحدرات والوديان الجافة وحقول الحمم البركانية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات، خاصة النمل والذباب والخنافس وغيرها من اللافقاريات، مثل القراد على الجمال، إلى جانب الديدان والعناكب. كما يتناول السحالي الصغيرة، فضلاً عن ثمار التوت والبيذور. هذا الطائر ينقض على فريسته بعد مسح المنطقة من مجثم ما، أو يعمد إلى مطاردتها على

الأرض بأسلوب الوثبات، أو يصطاد الحشرات

الطائرة وهو في الجو. **النشاط:** نهارى.**السلوك الاجتماعي:** منفرد أو في أزواج.**سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة

مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً ذات روابط

زوجية لمدى الحياة على ما يبدو، تعيش إما

منفردة أو في مستعمرات صغيرة متفرقة

تتألف من خمسة أزواج كحد أقصى. **الأدوار****الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين فيرعاية الصغار. **العش:** على شكل وعاء مصنوع من الأغصان الدقيقة وسيقان العشب،

مبطن بشكل كثيف بالصوف وشعر الإبل والريش والنباتات، وعادة ما يوضع على

ارتفاع 1.5 - 6 م فوق سطح الأرض في شق (يصل عمقه إلى 50 سم) في منحدر

صخري، أو جرف، أو منحدر صغير، أو تحت جلمود. وتشكل الحصى الصغيرة التي توضع

داخل شق العش، رصيفاً يؤدي إلى العش. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:**14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة. **ملاحظة:** تتميز

صغار هذا الطائر بتاج أسود.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً؛ 300,000

منطقة النشاط: جبل حمران جودة



أبلق أحمر الذنب*Oenanthe chrysopygia*

Red-tailed Wheatear

غير مهدد

مستقر

-

-

15 سم / 18 - 29 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من أرمينيا حتى باكستان، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 2,000 كم جنوباً في شبه الجزيرة العربية إلى شمال غرب الهند. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي غير شائع. هذا الطائر البديع الألوان شائع وواسع الانتشار في فصل الشتاء بالنصف الجنوبي من المملكة، ويغيب عن السهول الشمالية والبحار الرملية. **الموئل:** الموائل الصخرية، بما في ذلك سفوح الجبال والوديان. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يقوم بشكل أساسي على اللافقاريات، خاصة النمل والخنافس الملتقطة من الأرض، فضلاً عن البذور والتوت. وفي بعض الأحيان يتناول أيضاً السحالي الصغيرة. يجثم هذا الطائر على الشجيرات والغطاء النباتي، لكنه عادةً ما يصطاد من فوق صخرة، حيث ينقض على الفرائس القريبة. وقد يصطاد أيضاً، على الأرض عبر الحفر باستخدام منقاره، أو يطارد الفرائس فوق السطح. كما يلتقط طعامه من الغطاء النباتي، ويقوم برحلات قصيرة في إثر الحشرات الطائرة. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يبدو هذا الطائر في البداية كأنه طائر أبلق رمادي يميل إلى الجلوس بهدوء، أو الاختباء وراء الصخور

عند الاستعراض، يهزّ الذكر ذيله بحماسة، ويعمد إلى دورانات قصيرة في الهواء ضمن فترات تدوم حتى 50 دقيقة لا ينقطع فيها عن التغريد.

وفي الأخاديد حتى يزول الخطر. لكن، وبمجرد أن يطير، فإنه يكشف عن ردف وذيل أحمرين متميزين. وفي الآونة الأخيرة جرى فصل هذا النوع عن الأبلق الكردي.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الباحة

**أبلق حزين شرقي***Oenanthe lugens*

Mourning Wheatear,

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتناقص

14 - 16 سم / 19 - 25 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر أبلق حزين شرقي

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال وشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية حتى سوريا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في العراق وإيران، بينما يقضي الشتاء على بُعد 800 كم جنوباً في شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد ثلاثة من أصل تسعة أنواع فرعية معترف بها، وهي أبلق حزين (*O. l. lugens*) المقيم في شمال غرب المملكة؛ وأبلق فارسي (*O. l. persica*) الذي يقضي فصل الشتاء شرق شبه الجزيرة العربية؛ وأبلق عربي (*O. l. lugentoides*) المتوطن في جنوب غرب المملكة (جنوب مدينة الطائف) واليمن. **الموئل:** يتخذ أبلق حزين الموائل دون 1,000 م، في في الوديان والتنوعات الرملية القاحلة. في حين يتخذ أبلق فارسي التنوعات والجروف والوديان والصحاري الصخرية وضواحي القرى، أما أبلق عربي فيوجد فوق 1,000 م في المناطق الصخرية والشجرية والتلال الصخرية والمنحدرات والحقول المدججة ذات الجدران الحجرية وضواحي القرى. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** النمل والخنافس والجنادب وغيرها من اللافقاريات التي يلتقطها عن طريق الوثب، أو الانقضاض من مجثم، أو أثناء الطيران. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشترك كلا الطائرين

في السابق، كان هذا

الطائر الموجود في جنوب

شبه الجزيرة العربية يُعدُّ

نوعاً متميزاً ويُعرف باسم أبلق


عربي. لكن أصبح يُعتقد الآن

بأنه هو ذاته أبلق حزين.

البالغين في رعاية الصغار. وفي حال تأسيس حضنة ثانية، يساعد الأبناء من الحضنة الأولى في رعاية الحضنة الثانية. **العش:** على شكل وعاء ضحل، مبطن بالعشب الدقيق والصوف والریش، ويوضع عادةً على ارتفاع يصل إلى 6 م فوق سطح الأرض في شق صخري، أو جرف، أو ضفة، أو جدار مدجج. وتشكل الحجارة المسطحة الموضوعة داخل شق التعشيش متراًساً (براجح بين 20 و35 سم) عند الطرف الخارجي للعش. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 15 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة. **ملاحظة:** كان الأبلق العربي يُعدُّ سابقاً من الأنواع المستقلة.



أنثى خارج العش



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 445,000

منطقة النشاط: جبل النعيرية

الخنق الرمادي

الاسم العربي:	الخنق الرمادي
الاسم العلمي:	<i>Hypocolius ampelinus</i>
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
حالة الحماية الإقليمية:	غير معروف
المنحى العالمي للمجموعة:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	23 سم / 48 - 57 غم




أنثى سويداء، والذكر إلى اليسار

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من العراق والكويت وجنوب إيران حتى غرب باكستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 500 كم باتجاه الجنوب الغربي بشكل رئيس في شبه الجزيرة العربية وجنوب باكستان. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي شائع. يصل هذا الطائر الفريد، العضو الوحيد في عائلته، بأعداد فغاية كل عام ومن دون انتظام وفي أي منطقة معينة. **الموئل:** يجثم في أشجار النخيل الباسقة، أو الأشجار المتساقطة الأوراق، وينطلق يومياً في رحلات إلى الصحارى المفتوحة ذات الشجيرات الخفيفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي؛ ثمار التوت والفاكهة. وعادةً ما يأكل ببساطة عن طريق الميل من المجثم. ولوحظ أيضاً، أنه يتناول الجراد والحشرات الأخرى، إلى جانب الذباب.

يُعدُّ هذا الطائر المذهل العضو الوحيد في عائلته ليس له أيُّ أقارب، علماً أن نصف تعداده العالمي يقضي فصل الشتاء في المملكة، حيث يرعى على أشجار النخيل والأراك.

النشاط: نهارى. **السلوك الاجتماعي:** طائر سربي في المملكة، وعادةً ما يتم تسجيله في مجموعات من 10 - 20 طائراً، تصل إلى 60 أو 80 في بعض الأحيان. وقد وصلت في إحدى المرات إلى 120 طائراً في صلاصل. ومع اقتراب نهاية فصل الشتاء، تصير الأزواج واضحة داخل كل سرب، وغالباً ما تغني وتتعرض مع اقتراب موسم التكاثر. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** الخنق الرمادي هو العضو الوحيد في عائلته، ما يعني أنه لا يوجد لديه أقارب أحياء. يرتفع هذا الطير عالياً وفي خط مستقيم؛ وعندما يحس بالتهديد، قد يهبط ويطير سريعاً إلى الغطاء ويصطغ في اللحظة الأخيرة عن طريق تحريك ذيله وجناحيه. كما أنه مغرم بالجلوس بجرأة على قمة شجيرة عندما لا يشعر بالتهديد. يغرد أثناء الطيران وعلى المجاثم، بطريقة تشبه طائر البلبل، لكنه يصمت عندما يحين وقت التغذية.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: السفارات

**أبلق كردي**

الاسم العربي:	أبلق كردي
الاسم العلمي:	<i>Oenanthe xanthopyrmyna</i>
الاسم الشائع:	Kurdish Wheatear, Kurdistan Wheatear
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
حالة الحماية الإقليمية:	مستقر
المنحى العالمي للمجموعة:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	غير معروف
الحجم والوزن:	14 - 15 سم / غير معروف




أنثى أبلق كردي

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من جنوب شرق تركيا حتى جنوب غرب إيران، بينما يقضي الشتاء على بُعد 1,800 كم باتجاه الجنوب الغربي على الجانب الشمالي الشرقي من البحر الأحمر (من مصر حتى الصومال)، إلى جانب تعداد قليل في غرب المملكة. **حاليته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. يمضي هذا الأبلق ذو الردف الكستنائي فصل الشتاء (نوفمبر - مارس) على طول وسط مرتفعات وتلال تهامة، لا سيما بين ينبع والبرك. وقد تم تسجيل هجرة بعض الأفراد عبر المملكة، بين مناطق التكاثر في غرب آسيا ومناطق التشتية في البحر الأحمر. **الموئل:** التلال القاحلة والوديان الصخرية. كما يوجد أحياناً في مراعي الطلع والصحارى الصخرية. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام

الغذائي: غير معروف بما يكفي، غير أنه يبدو مماثلاً للنظام الغذائي لأنواع الأبلق الأخرى، والذي يتألف من النمل والخنافس والأرضة واليرقات، إلى جانب أنواع أخرى من اللافقاريات. كما يتناول في بعض الأحيان السحالي الصغيرة، إلى جانب البذور والفاكهة. يرعى عن طريق الانتظار ومسح المنطقة من مجثم قبل الفتك بالفريسة على الأرض، أو الوثب في إثر الفريسة على الأرض. ويصطاد الذباب أيضاً، ربما بشكل أكثر انتظاماً من معظم طيور الأبلق الأخرى.

ما يشير إلى أن الحشرات الطائرة تُعدُّ عنصراً غذائياً مهماً لهذا الطائر. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** منفرد. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يميل هذا الطائر إلى تفضيل الأراضي الصخرية والتلال، الأمر الذي يميزه عن الأبلق الأشهب والأبلق الصحراوي، حتى وقت قريب، كان هذا النوع يُمزج مع الأبلق أحمر الذنب الأوفر عدداً بشكل كبير، ما أدى إلى تواضع معرفة وضعه داخل المملكة.



ذكر أبلق كردي



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الفقير

تمير فلسطيني*Cinnyris osea*

Palestine Sunbird

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

8 - 10 سم / 6,8 - 7,6 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



أنثى تمير فلسطيني




ذكر تمير فلسطيني

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية (من سوريا وسيناء عبر غرب المملكة واليمن حتى ظفار)، وفي جيوب متناثرة بأفريقيا الوسطى. وتشكل شبه الجزيرة العربية ما يزيد على 70% من نطاق وجوده العالمي. ويُعرف منه نوعان فرعيين، بما في ذلك «*C. o. osea*» الذي يُعدُّ شبه متوطن بمنطقة شبه الجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء وشمالاً حتى سوريا. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يوجد هذا الطائر المتلألئ الذي يبدو للعيان كطائر معدني – وهو أصغر الطيور في المملكة – على نطاق واسع في مرتفعات الحجاز وعسير. **الموئل:** بشكل رئيس فوق 1,500 م، لكن في بعض الأحيان نجده عند مستوى سطح البحر على ساحل البحر الأحمر الشمالي، وعند مستوى 250 م في تهامة، وفي المناطق الزراعية الغنية مع شجيرات طويلة وأشجار مزهرة، بما في ذلك غابات العرعر. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** رحيق الزهور والفاكهة والبيذور والعناكب والحشرات. ويتغذى عن طريق التحليق، أو الجثوم أمام الزهور. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج خلال موسم التكاثر، أو في مجموعات تتألف من ثمانية طيور كحد أقصى في مواسم أخرى غير التكاثر. **سلوك**

يُعرف هذا الطائر في اللغة العربية أحياناً باسم سلطان الزهر. وما يقرب من نصف أعشاشه تضم فرخاً واحداً على الأقل لا ينتمي للذكر سيد العشب.

التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية شديدة الاختلاط. **الأدوار الأبوية:** بوجود الذكر تعتمد الأنثى إلى بناء العش وحضن البيض، لكنهما يتشاركان في رعاية الصغار، في حين يدافع الذكر عن منطقته السيادية. **العش:** قبة مستطيلة على شكل الكمثرى مع «شرفة» فوق مدخل جانبي، مصنوعة من العشب والأوراق وزغب النباتات، وأحياناً ورق الكتابة أو البوليثين، مربوطة بالشعر والصوف وأنسجة العنكبوت ومبطنة بالعشب الناعم وزغب النبات والريش والشعر، معلقة في فرع أو غصين متدل على ارتفاع يراوح بين 0.3 - 5 م فوق سطح الأرض في شجرة، أو شجيرة. **البيض المحضون:** بيضتان. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 300,000

منطقة النشاط: محمية ريدة

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

تمير وادي النيل*Hedydipna metallica*

Nile Valley Sunbird

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

9 - 17 سم / 7 - 7,5 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




ذكر تمير وادي النيل

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في وادي النيل بمصر جنوباً حتى السودان، وشرقاً بالاتجاه نحو الصومال وإريتريا وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يتكاثر هذا الطائر الخلاب في الجنوب الغربي والجنوب حول ثول. بعد التكاثر وخلال فصل الشتاء، يمكن أن يتجول خارج هذا النطاق بحثاً عن النباتات المزهرة. **الموئل:** عادةً دون 1,500 م (ربما أعلى على الجانب الشرقي الجاف من المرتفعات) في الأراضي الحرجية الجافة التي غالباً ما تكون رملية، كما يوجد أيضاً، في المناطق الزراعية حول المستوطنات البشرية، حتى إنه يعيش في شوارع المدن التي تصطف على جانبيها الأشجار. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الرحيق المُستخلص عن طريق التحويم، أو الجثوم على الزهور، والحشرات التي يلتقطها. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج، لكنه يمكن أن يكون مجموعات في مواسم غير التكاثر، حيث تم تسجيل 70 طائراً منه في شجيرة طلع واحدة بجانب مجرى مائي بمنطقة تهامة في يوليو. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، ربما مع مستويات عالية من الأبوة خارج نطاق الزوجية كما هو مسجل في طيور تمير الأخرى متميزة الشكل جنسياً. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش ورعاية الصغار، وتتولى الأنثى حضن البيض، في حين يدافع الذكر عن منطقته السيادية. **العش:** على شكل قبة بيضاوية ممدودة مع «شرفة» متدلّة فوق مدخل جانبي، مصنوعة من الألياف النباتية والجذريات والأوراق وسيقان النباتات، مربوطة بأنسجة العنكبوت ومبطنة بالزغب والريش، معلقة في فرع أو غصين متدل على ارتفاع يراوح بين 2 - 10 م فوق الأرض في شجرة شائكة، وهي في كثير من الأحيان الطلع. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.



أنثى تمير وادي النيل



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500,000

منطقة النشاط: تنومة

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

مايو أبريل مارس فبراير يناير


نساج روبلي	الاسم العربي:
تبشر	الاسم العربي الآخر:
<i>Ploceus galbula</i>	الاسم العلمي:
Rüppell's Weaver	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
14 سم / الذكر 20 - 29 غم؛ الأنثى 16 - 21 غم (أخف وزناً بـ 25%)	الحجم والوزن:



ذكر نساج روبلي



أنثى نساج روبلي



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 50,000
منطقة النشاط: بحيرة ملاكي

تمير عربي	الاسم العربي:
<i>Cinnyris hellmayri</i>	الاسم العلمي:
Arabian Sunbird	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
13 سم / 7 - 12 غم	الحجم والوزن:




فرخ تمير عربي



ذكر تمير عربي



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 250,000
منطقة النشاط: وادي ريداء

النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية. يُعرف نوعان منه فرعيين: «*C. h. kinneari*» الذي يستوطن المملكة، و«*C. h. hellmayri*» الذي يوجد في المملكة واليمن وسلطنة عُمان. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يوجد طائر التيمير الملون هذا في الغرب حول أمّالج، ومن مكة المكرمة جنوباً حتى يصل بالقرب من نجران (*C. h. kinneari*). وفي

أقصى الجنوب الغربي، جنوباً بالقرب من نجران (*C. h. hellmayri*). **الموئل:** بين 250 - 1,800 م في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، بما في ذلك الحدائق والبساتين والحقول الزراعية، كما يوجد أيضاً، في الوديان شديدة الانحدار والمناطق الصخرية وسفوح

التلال، وأحياناً في المناطق الجافة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الرحيق المُستخلص عن طريق الجُثوم، أو التحليق أمام الزهور، إلى جانب اللافقاريات. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، ربما مع مستويات عالية من التكاثر خارج نطاق الزوجية (كما هو مسجل في طيور التيمير الأخرى). **الأدوار الأبوية:** بوجود الذكر تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار، في حين يدافع الذكر عن منطقتيه السيادية. **العش:** قبة بيضاوية مستطيلة مع «شُرفة» متدلّية فوق مدخل جانبي، مصنوعة من العشب وزغب النباتات، مربوطة بالآلياف وأنسجة العنكبوت ومبطنة بزغب النباتات وأنسجة العنكبوت والصوف والريش، معلقة في فرع أو غصين يتدلى على ارتفاع يراوح بين 2 - 5 م فوق الأرض (وفي بعض الأحيان 9 م) في شجرة شائكة، وهي في كثير من الأحيان الطلج. **البيض المحضون:** بيضة واحدة. **الحضانة:** غير معروفة (12 - 15 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (13 - 17 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** من المحتمل حضنة واحدة. **ملاحظة:** في السابق كان هذا الطائر يُعدُّ واحد من مجموعة أنواع فرعية من التيمير اللامع (*C. habessinicus*).



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال شرق أفريقيا (شرق السودان حتى الصومال) وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يوجد هذا الطائر الذهبي البديع في المرتفعات الجنوبية الغربية، إلى الجنوب من رابغ. **الموئل:** دون 2,800 م في الأراضي الجافة ذات الأشجار الخفيفة والشجيرات والمناطق الزراعية، خاصة بالقرب من محاصيل الحبوب، وغالباً بالقرب من المدن والقرى. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بشكل أساس البذور التي يلتقطها عن طريق الجُثوم على رؤوس البذور، إلى جانب رحيق الأزهار والحشرات. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** يربى في مجموعات من 10 - 20 طائراً، وغالباً إلى جانب العصفور الذهبي العربي، أو الدوري، ويمكنه أيضاً، أن يشكل مجامع

تضم مئات الطيور. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** متعدد الزوجات واستعماري. يبني كل ذكر أعشاشاً عديدة (5 - 15 عشاً) ويمكن أن يتكاثر مع عدد من الإناث يراوح بين اثنتين إلى 3 إناث في وقت واحد، أو بالتتابع، وغالباً ما تضم المستعمرات 30 - 50 عشاً، في شجرة واحدة. **الأدوار الأبوية:** الذكر يدافع عن منطقة السيادة ويبني أعشاشاً متعددة (بمساعدة

الأنثى أحياناً). ومن المفترض أن تتولى الأنثى اختيار العش وحضن البيض. في البداية، يحضن الذكر الطعام إلى العش، ويُسلمه عن طريق القلس، ثم بعد 4 أيام يتشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** قبة مستديرة، أو على شكل قارورة، مبطنة أحياناً بزغب النباتات وأوراقها، مع مدخل في الجانب السفلي، مصنوعة من العشب الأخضر (عندما يكون العش جديداً) وأحياناً شرائح من سعف النخيل، أو البلاستيك، أو البوليثلين، معلقة في طرف غصين رفيع متدل على ارتفاع أكثر من مترين فوق سطح الأرض في شجرة (عادةً تكون من الأنواع الشائكة). **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 17 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

فضي المنقار الأفريقي

Euodice cantans
African Silverbill
غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر (ربما يتزايد)
11 سم / 10 - 14 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد على نطاق واسع عبر المناطق المدارية الشمالية لأفريقيا وشرق أفريقيا وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. تم العثور على هذا الطائر الجميل ذي اللون الترابي والمنقار الكبير في الغرب، ولا سيما جنوب جدة. **الموائل:** الأراضي ذات أشجار الطلح القصيرة والمناطق المزروعة في تهامة والأجزاء الأكثر جفافاً من المرتفعات الغربية. عادة لا يتم تسجيل أي مشاهدة له بالقرب من المستوطنات باستثناء ضواحي جدة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور، خاصة الأعشاب والحشائش والشجيرات الصغيرة، إلى جانب بعض الحشرات. ويرعى بشكل أساسي عن طريق التقاط البذور من الأرض أو من النباتات مباشرة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يبحث عن الغذاء في أزواج صغيرة، وعادة ما تضم أقل من 25

تمتلك فراخ هذه العائلة

علامات صفراء وسوداء

زاهية داخل أفواهاها، لضمان
انفرادها بالإطعام من جانب
أبويها دون فراخ الوقواق
التي قد تكون موجودة أيضاً
في العش.

طائراً، وأحياناً ما يصل إلى 120 طائراً. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (بمواد يجمعها الذكر) وتتولى حضن البيض. يتشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل قبة مستديرة ذات مدخل جانبي قصير، مصنوعة من العشب الجاف، ومبطنة بالعشب الدقيق ورؤوس الحشائش والریش، وموضوعة على ارتفاع 1 - 4 م فوق سطح الأرض في شجيرة، أو شجرة (شجرة طلع، أو أحياناً إحدى أشجار الفاكهة)، أو في عش على شكل قبة مهجور لطائر دوري أو نساج روبرلي. **البيض:** المحضون: 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 11 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 16 - 18 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 14,000

منطقة النشاط: جازان

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

شمعي المنقار العربي

Estrilda rufibarba
Arabian Waxbill
غير مهدد
يتناقص
غير مهدد
مستقر
10 سم / 8.5 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد فقط في أقصى جنوب غرب المملكة وغربي اليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر غير شائع. يوجد هذا الطائر البديع ذو الحواجب الحمراء في المرتفعات الواقعة جنوب الطائف ومكة. **الموائل:** عادة على ارتفاع 1,000 - 2,500 م (أحياناً على ارتفاع 600 م في الأراضي المنخفضة بمنطقة تهامة) ضمن الغطاء النباتي الكثيف، خاصة بالقرب من المياه الجارية، أو المستنقعات، بما في ذلك الأراضي ذات الأشجار الخفيفة في قيعان الوديان، أو التلال الصخرية والغابات شبه الاستوائية والحدائق وغابات العرعر المرتفعة، والمدزجات المزروعة بالموز والحبوب والقهوة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: البذور الصغيرة لنبات الأسل والسعدى والنباتات المزهرة والأعشاب الأصلية والمزروعة التي يلتقطها مباشرة من الرؤوس الحاملة للبذور، أو تلك التي يجدها ويلتقطها من الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يبحث عن الغذاء في أزواج ومجموعات صغيرة، ويشكل أسراباً أكبر تتألف عادةً تقل عن 30 طائراً في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى هيكل العش الرئيس بمواد يجمعها الذكر، ويشترك كلا الطائرين البالغين في بناء العش

التمويهي وحضن البيض، أما دور الزوجين في إطعام الفراخ غير معروف (في الأنواع المماثلة يتشارك الزوجان في إطعام الفراخ). **العش:** على شكل قبة منتفخة فوضوية نوعاً ما، مصنوعة من سيقان الأعشاب الطويلة ذات مدخل منحدر وعش آخر للتمويه في الأعلى، توضع القبة على الأرض عند قاعدة جدار حجري في مكان ظليل (سجل واحد). **البيض:** المحضون: 5 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة

(11 - 13 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (18 - 21 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** غير معروفة (من المحتمل حضنة مزدوجة). **ملاحظة:** هذا الطائر شبه غير معروف، وأول مشاهدة له كانت في عام 2016 حين اكتُشِفَ العش والبيض للمرة الأولى لأغراض هذا الكتاب.

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,000

منطقة النشاط: قرية ذي عين (منطقة الباحة)

فضي المنقار الهندي

Euodice malabarica

Indian Silverbill

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتزايد

11 سم / 10 - 14 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق شبه الجزيرة العربية وجنوب إيران حتى بنغلاديش وسريلانكا. **حالته بالمملكة :** مقيم متكاثر غير شائع. قد يكون هذا الطائر البني الصغير الأخضر قد أقام في المنطقة الشرقية بشكل طبيعي أوائل القرن العشرين بعد قيام الإنسان بتعديل الموائل، أو ربما يكون قد أسس مجتمع له عبر إدخاله أو هروبه من الأسر. وفي كلتا الحالتين، يتكاثر الآن بشكل رئيس في المنطقة الشرقية على طول الحدود الساحلية للخليج العربي ومنطقة الرياض. ومن شبه المؤكد أن التعدادات الإضافية الموجودة في غرب المملكة هي من نسل الطيور الهاربة. **الموائل:** الأراضي ذات أشجار الطلح الخفيفة والأراضي العشبية والمزارع والمناطق الزراعية (خاصة الحقول المزروعة بالمحاصيل)،

والحدائق والمساحات الخضراء في المدن والبلدات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور، لا سيما الأعشاب والحشائش والشجيرات الصغيرة، إلى جانب بعض الحشرات، ويتغذى بشكل أساسي عن طريق التقاط البذور من الأرض، أو من النباتات مباشرة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل في أسراب تضم أقل من 20 طائراً، أو أحياناً في أسراب يصل حجمها إلى 70 طائراً. **سلوك التكاثر: نظام**

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. وقد تستعين بعض الأزواج بمساعد في العش. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (بمواد يجمعها الذكر) وتتولى حضن البيض، ويتشارك الطائران البالغان في رعاية الصغار. **العش:** على شكل قبة غير مرتبة بمدخل جانبي غالباً ما يكون كانبوب قصير، مصنوعة من العشب ورؤوس الحشائش

وشرائح من ألياف النخيل وأوراق الشجر، مبطنة بالعشب الرفيع وأحياناً بعض الريش، موضوعة في شجيرة، أو شجرة على ارتفاع يراوح بين متر واحد إلى 5 م من الأرض. **البيض المحضون:** 2 - 7 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 21 - 23 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة. **ملاحظة:** تم تسجيل نشاط التعشيش في كل شهر من العام.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,500

منطقة النشاط: الظهران



عصفور دوري

Passer domesticus

House Sparrow

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر (ربما يتزايد)

17 - 14 سم / 21 - 33 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




ذكر عصفور دوري



أنثى عصفور دوري

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في غرب أوروبا وشمال أفريقيا، بالاتجاه عبر شبه الجزيرة العربية إلى شمال الصين وجنوب شرق آسيا، وقد تم إدخاله في أنحاء كثيرة من العالم. تم التعرف إلى اثني عشر نوعاً فرعياً منه، بما في ذلك «*P. d. hufufae*» المتوطن في المنطقة الشرقية، و«*P. d. indicus*» واسع الانتشار في شبه الجزيرة العربية بعد نموه الهائل في العقود الأخيرة إثر إنشاء مزارع ومستوطنات جديدة. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر واسع الانتشار. هذا الطائر مألوف جداً ويتكاثر في جميع أنحاء المملكة. **الموائل:** المزارع والمستوطنات، بما في ذلك أصغر مخيم وأحياناً في المناطق النائية ذات

المنحدرات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور والبراعم وثمار التوت وفضلات الطعام النباتي البشري، إلى جانب اللافقاريات، خاصة في فصل الصيف، ويلتقط طعامه من الغطاء النباتي أو الأرض، ويلتقط أحياناً اللافقاريات أثناء طيرانه. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** أسراب صغيرة تزيد في الحجم خلال فصل الشتاء. وقد سُجّلت مجاثم تضم 2,000 طائر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش منفردة، أو في مستعمرات



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 4,000,000

منطقة النشاط: أي مدينة، أو بلدة، أو معسكر

ينمو لدى الذكور التي

تجد طعاماً أكثر، بقع حلقية

بلون أسود أكبر من غيرها،

وتصبح مهيمنة اجتماعياً.

وبالتالي ليس من

المستغرب أن الذكور ذات

البقع الحلقية الأصغر تميل

إلى تجنبها.

حرة تضم حتى 20 زوجاً، وأحياناً مختلطة مع عصافير أخرى. **الأدوار الأبوية:** يبدأ الذكر بناء العش، وفي حال تم تشكيل زوج، فإن الأنثى تساعده، خاصة في تبطين العش. يتشارك كلا الطائرين البالغين في حضن البيض ورعاية الصغار. **العش:** متغير؛ إما على شكل قبة بمدخل جانبي، مصنوعة من العشب ومبطنة بالريش وغالباً الورق، أو القماش والصوف، وموضوعة في شجرة أو شجيرة، أو قبة جزئية، أو وسادة مصنوعة من العشب والريش موضوعة داخل شق في مبنى، أو نتوء صخري، أو ضفة ترابية، أو شجرة جوفاء. **البيض المحضون:** 4 بيوض. **الحضانة:** 11 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.



عصفور مذهب عربي*Passer euchlorus*

Arabian Golden Sparrow

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

12 - 13 سم / 12 - 17 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بشكل رئيس في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، مع وجود تعدادات صغيرة في جيوتي وشمال الصومال. وتشكل شبه الجزيرة العربية أكثر من 76% من نطاق وجوده العالمي. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** بشكل عام يوجد فقط في جنوب تهامة، إلى الجنوب من الوسقة، رغم أنه يتجول بانتظام شمالاً إلى جدة. **الموئل:** يتكاثر دون 600 م في أشجار الطلح، وغالباً في المناطق التي تنتشر فيها الشجيرات، بعيداً عن المناطق الحضرية. ويوجد أيضاً في المناطق الزراعية، خاصة حقول الدخن. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غير معروف بما يكفي، ولكنه يقوم بشكل رئيس على بذور الأعشاب والدخن. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي للغاية، إذ يوجد في أسراب متقاربة تضم نحو 100 طائر أو أكثر، وتزيد أحجام الأسراب في فصل الشتاء. وتم الإبلاغ عن مجاثم تضم أكثر من 2,000 طائر. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مستعمرات كثيفة تضم عادةً بضع مئات من الأعشاش (بمعدل 50 عشاً في كل شجرة). وغالباً ما تبنى الأعشاش بعيدة عن بعضها بعضاً بمقدار متر واحد، بل وتكون متلامسة أحياناً. وغالباً ما يشكل مستعمرات مختلطة مع طيور نساغ روبرلي وعصفور دوري. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران البالغان في بناء العش ورعاية الصغار. وتتولى الأنثى حضن البيض.

العش: على شكل قبة سوداء مستطيلة متميزة ذات مدخل جانبي بالقرب من قمته، أو قاعدتها. الجزء الخارجي منها مصنوع من أغصان، أو قرون الطلح، في حين يُصنع الجزء الداخلي من العشب والأوراق، ومبطنه بالعشب الناعم، وبعض الصوف، أو الريش، أو الورق، أو القماش، وموضوعة على ارتفاع 2 - 5 م فوق سطح الأرض في الفروع الخارجية من أشجار الطلح الكثيفة. **البيض المحضون:** 2-3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (11 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (11 - 15 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة على الأرجح، ربما في موقع مختلف لكل الحضنة.

يتكاثر هذا الطائر الذهبي البديع في مستعمرات مذهلة تضم مئات عدة من الأعشاش، علماً أن ما يزيد على ثلاثة أرباع تعداده العالمي تتكاثر في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 25,000

منطقة النشاط: صبياء

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس

يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

عصفور إسباني*Passer hispaniolensis*

Spanish Sparrow

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

15 - 16 سم / 22 - 38 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




ذكر عصفور إسباني

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول غرب البحر المتوسط ومن أذربيجان حتى طاجيكستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر حول شرق البحر المتوسط، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم جنوباً في شمال أفريقيا عبر شمال شبه الجزيرة العربية حتى شمال غرب الهند. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع، زائر شتوي شائع جداً.** أقام هذا العصفور ذاتياً شمال وشرق المملكة بعد التوسع الزراعي نحو عام 1980. **الموئل:** المناطق المزروعة المفتوحة حول القرى والمزارع وبساتين التمور والقصب ومزارع الأشجار الطويلة، خاصة شجرة الكينا، ويقطن أيضاً الصحارى خلال فصل الشتاء. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يقوم بشكل أساس على بذور الأعشاب والمحاصيل والأعشاب الملتقطة من النباتات، أو الأرض، إلى جانب اللافقاريات الملتقطة عن طريق البحث في الأرض، أو أوراق الشجر. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أسراب تضم أقل من 50 طائراً، رغم أنه يشكل أحياناً أسراباً تضم مئات عدة من الطيور. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مستعمرات كثيفة متزامنة للغاية تتألف من 10 - 1,000 زوج، وأحياناً في أعشاش متلاصقة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران البالغان في بناء العش ورعاية الصغار. وتقوم الأنثى بمعظم مسؤوليات حضن البيض. **العش:** على شكل قبة بمدخل جانبي، مصنوعة من الحشائش والأوراق ورؤوس الزهور وأحياناً الخيوط والشرائط البلاستيكية، ومبطنه بالعشب الناعم والريش وزغب النبات، وموضوعة على ارتفاع 15 - 20 م فوق سطح الأرض في شجرة (أو 1.5 م في شجيرة)، أو داخل شق في مبنى. **البيض المحضون:** 3-6 بيوض. **الحضانة:** 11 - 12 يوماً. **مدة التعشيش:** 11 - 12 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.

يتكاثر هذا الطائر الذهبي البديع في مستعمرات مذهلة تضم مئات عدة من الأعشاش، علماً أن ما يزيد على ثلاثة أرباع تعداده العالمي تتكاثر في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.



أنثى عصفور إسباني



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 3,000

منطقة النشاط: حرص

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

مايو أبريل مارس فبراير يناير

تميرة الشجر

جشنة شجرية

Anthus trivialis

Tree Pipit

غير مهدد

يتناقص

-

-

14 - 15 سم / 15 - 39 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من غرب أوروبا حتى شمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 6,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محلي نادر. هذا الطائر المخطط مهاجر واسع الانتشار (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر) عبر المملكة، ويوجد بأعداد متغيرة، وهو بوجه عام أقل انتشاراً في فصل الخريف. في بعض الأحيان، تقضي أفراد ومجموعات صغيرة منه فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير) في الظهران والرياض وجدة. **الموئل:** المناطق الرطبة والخضراء ذات الشجيرات، بما في ذلك الأراضي الزراعية والحدائق والمتنزهات. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات، بما في ذلك الخنافس والبق وأبو مقص والذباب واليرقات. إضافة إلى العناكب والديدان من المفصليات



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: جدة

**عصفور صخري شاحب***Carpospiza brachydactyla*

Pale Sparrow

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

يتزايد (على الأرجح)

14 - 15 سم / 21 - 25 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من جنوب غرب تركيا حتى تركمانستان وغرب أفغانستان وجنوباً إلى شبه الجزيرة العربية، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 كم جنوب غرب المملكة وشمال شرق أفريقيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر غير شائع وغير منتظم، مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد هذا الطائر ذو اللون البني الرملي المائل للرمادي على نطاق واسع في موسم الهجرة (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر)،

تعوّض هذه الطيور عن

ريشها غير المزخرف

باستعراضات جوية مذهلة، كما

يعمد الأزواج إلى البحث عن

مجثم بارز بالقرب من العش،

حيث تغرّد في ثنائيات ساحرة.

موسم التكاثر، ويرعى على الأرض ووسط

الغطاء النباتي المنخفض. **النشاط:** نهارى.**السلوك الاجتماعي:** عادةً في أزواج أو

أسراب متكاثرة صغيرة متفرقة، والتي يزيد

حجمها في مواسم أخرى غير التكاثر. كما يمكن العثور عليه في أسراب من 300 طائر،

أو أكثر خلال موسم الهجرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقيةأحادية الزواج اجتماعياً، تعشش إما منفردة، أو في مستعمرات متفرقة. **الأدوار الأبوية:**

تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار.

العش: على شكل وعاء غير مرتب مصنوع من الأغصان والسيقان النباتية، مبطن

برؤوس نباتية ناعمة وشعر وعشب ناعم، وموضوع على ارتفاع 5 - 25 سم فوق الأرض

عند قاعدة شجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً.**مدة التعشيش:** 11 - 16 يوماً. **الحضانة:** انتهازى، حضنة مفردة.

وخلال فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير). وتعتمد أسراب الشتاء إلى التجول، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بوجودها.

قد يبقى هذا الطائر بعد موسم جيد من الأمطار، خلال فصل الصيف ويتكاثر، وأحياناً بأعداد كبيرة.

الموئل: يتكاثر على التلال الصخرية والوديان ذات المناطق الرملية والشجيرات المنخفضة، خاصة الطلح.

وعند الهجرة، يتجمع بالقرب من المياه، لا سيما برك المطر الصحراوية ويتغذى في مزارع الأعلاف والحبوب.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: البذور والأجزاء الخضراء من النباتات، كذلك الحشرات خلال

موسم التكاثر، ويرعى على الأرض ووسط

الغطاء النباتي المنخفض. **النشاط:** نهارى.**السلوك الاجتماعي:** عادةً في أزواج أو

أسراب متكاثرة صغيرة متفرقة، والتي يزيد


حجمها في مواسم أخرى غير التكاثر. كما يمكن العثور عليه في أسراب من 300 طائر،

أو أكثر خلال موسم الهجرة. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقيةأحادية الزواج اجتماعياً، تعشش إما منفردة، أو في مستعمرات متفرقة. **الأدوار الأبوية:**

تبني الأنثى العش وتحضن البيض. ويشترك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار.

العش: على شكل وعاء غير مرتب مصنوع من الأغصان والسيقان النباتية، مبطن

برؤوس نباتية ناعمة وشعر وعشب ناعم، وموضوع على ارتفاع 5 - 25 سم فوق الأرض

عند قاعدة شجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً.**مدة التعشيش:** 11 - 16 يوماً. **الحضانة:** انتهازى، حضنة مفردة.

مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 2,000

منطقة النشاط: جبل حمران جودة



تميرة الحقول

جشنة مروجية

Anthus pratensis

Meadow Pipit

قريب من التهدد

يتناقص

-

-

15 سم / 15 - 22 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تهاجر التعدادات المقيمة منه في بريطانيا وغرب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من غرينلاند إلى وسط روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 3,000 كم باتجاه الجنوب حول البحر الأبيض المتوسط عبر الشرق الأوسط حتى أفغانستان، ويغامر أحياناً باتجاه الجنوب حتى يصل إلى شمال شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي شائع. تقع المملكة حول الحد الجنوبي لنطاق هذا الطائر الطبيعي في الشتاء، وهكذا، فإن هذا الطائر زائر شتوي نادر (نوفمبر - مارس)، ويوجد بشكل عام شمال الخط الذي يمتد من المدينة المنورة إلى الرياض والهفوف. **الموئل:** المساحات المنبسطة المفتوحة ذات الأعشاب الخفيفة، بما في ذلك المحاصيل الزراعية والمستنقعات ومزارع مياه الصرف الصحي. **سلوك البحث عن**



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تبوك

**جشنة حمراء الزور***Anthus cervinus*

Red-throated Pipit

غير مهدد

مستقر

-

-

14 - 15 سم / 16 - 29 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في المنطقة القطبية الشمالية المرتفعة، بدءاً من شمال الدول الإسكندنافية ووصولاً إلى غرب الاسكا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 7,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي حول البحر المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووادي النيل وشمال شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محلي. يُعدُّ هذا الطائر المتميز بلونه البرتقالي الداكن مهاجر شائع عبر المملكة (مارس - أبريل، أغسطس - نوفمبر)، وبأعداد أقل في الخريف. وقد تم الإبلاغ عن طيور تقضي الشتاء في تبوك وسكاكا وينبع والرياض والظهران. **الموئل:** المروج والمحاصيل المروية والمستنقعات وقرب المياه السطحية. **سلوك البحث**

عن الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على الحشرات، خاصة الذباب والجنادب والبعث والخنافس واليرقات. إضافة إلى العناكب والديدان والحلزونات. كما أنه يتناول القليل من بذور الأعشاب. ويرعى على الأرض، وعادةً ما يكون ذلك في أراض جرداء أو في غطاء نباتي منخفض، خاصةً الأراض الموحلة والرطبة، حيث يستطيع النقر والسير فيما بين طبقات الغطاء النباتي.

النشاط: نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في مجموعات من 5 إلى 10 طيور أو أكثر، رغم أنه في بعض الأحيان يشكل مجموعات كبيرة جداً. على سبيل المثال، تشير الإحصاءات التي أجريت على الحقول المروية محورياً شمال تبوك إلى وجود ما يزيد على 1,000 طائر في محصولي برسيم حجازي تم حصدهما مؤخراً في منتصف أبريل. وغالباً ما يُشكل أسراب رعي مختلطة مع طيور الذعرة الصفراء. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تهاجر التعدادات المقيمة منه في بريطانيا وغرب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من غرينلاند إلى وسط روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 3,000 كم باتجاه الجنوب حول البحر الأبيض المتوسط عبر الشرق الأوسط حتى أفغانستان، ويغامر أحياناً باتجاه الجنوب حتى يصل إلى شمال شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. تقع المملكة حول الحد الجنوبي لنطاق هذا الطائر الطبيعي في الشتاء، وهكذا، فإن هذا الطائر زائر شتوي نادر (نوفمبر - مارس)، ويوجد بشكل عام شمال الخط الذي يمتد من المدينة المنورة إلى الرياض والهفوف. **الموئل:** المساحات المنبسطة المفتوحة ذات الأعشاب الخفيفة، بما في ذلك المحاصيل الزراعية والمستنقعات ومزارع مياه الصرف الصحي. **سلوك البحث عن**

النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ تهاجر التعدادات المقيمة منه في بريطانيا وغرب أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من غرينلاند إلى وسط روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,000 - 3,000 كم باتجاه الجنوب حول البحر الأبيض المتوسط عبر الشرق الأوسط حتى أفغانستان، ويغامر أحياناً باتجاه الجنوب حتى يصل إلى شمال شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. تقع المملكة حول الحد الجنوبي لنطاق هذا الطائر الطبيعي في الشتاء، وهكذا، فإن هذا الطائر زائر شتوي نادر (نوفمبر - مارس)، ويوجد بشكل عام شمال الخط الذي يمتد من المدينة المنورة إلى الرياض والهفوف. **الموئل:** المساحات المنبسطة المفتوحة ذات الأعشاب الخفيفة، بما في ذلك المحاصيل الزراعية والمستنقعات ومزارع مياه الصرف الصحي. **سلوك البحث عن**




تميرة الصحراء

الاسم العربي:	جشنة صحراء
الاسم العربي الآخر:	<i>Anthus campestris</i>
الاسم العلمي:	Tawny Pipit
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	مستقر
المنحى العالمي للمجموعة:	غير مهدد
حالة الحماية الإقليمية:	غير معروف
المنحى الإقليمي للمجموعة:	17 سم / 17 - 32 غم
الحجم والوزن:	



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا حتى منغوليا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في منطقة الساحل الأفريقي عبر شبه الجزيرة العربية إلى الهند. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي شائع، مهاجر متكاثر محتمل. هذا الطائر المحب للصحاري مهاجر بانتظام (مارس - أبريل، سبتمبر - أكتوبر) عبر المملكة، خاصة في فصل الربيع، حيث يمكن العثور عليه كل يوم تقريباً في مجموعات تتألف من دزينة تقريباً في الموئل المناسب، ويمكن العثور أيضاً، على مجموعات صغيرة في جميع المناطق خلال فصل الشتاء (نوفمبر - فبراير) بأرقام مختلفة من سنة إلى أخرى في أي مكان معين. وغالباً ما يمكن ملاحظته وهو يغني ويشكل أزواجاً في الربيع، ما يشير إلى أنه



إلى أخرى في أي مكان معين. وغالباً ما يمكن ملاحظته وهو يغني ويشكل أزواجاً في الربيع، ما يشير إلى أنه

يتكاثر أحياناً في المملكة. **الموئل:** المناطق القاحلة والرملية ذات الغطاء النباتي (خاصة المناطق الساحلية ذات الأشجار الخفيفة)، أو حقول العلف في المناطق الزراعية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات ويرقاتها، مثل الجراد وأسد المن والفرشاشات وغيرها من اللافقاريات. كما أنه يلتهم الجراد الميت أحياناً، إلى جانب

السحالي الصغيرة وبعض البذور. ويمكنه العثور على الطعام أثناء السير أو الركض في

الموائل الرملية، أو عن طريق تنقيب تجمعات النباتات والنقر على النباتات، أو عن طريق

القفز في الهواء لالتقاط الحشرات الطائرة، أو الفرائس العالية. **النشاط:** نهارى. ويمكن أن يهاجر ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في مجموعات متفرقة. **سلوك التكاثر:** لم يتم تسجيل تكاثره في المملكة، مع إمكانية حدوث ذلك. **ملاحظة:** على عكس تميرة طويلة المنقار (جشنة خطماء) المماثلة، هذا الطائر لا يجثم (لا يجلس عالياً).

**تميرة الماء**

الاسم العربي:	جشنة مائية
الاسم العربي الآخر:	<i>Anthus spinoletta</i>
الاسم العلمي:	Water Pipit
الاسم الشائع:	غير مهدد
حالة الحماية العالمية:	مستقر
المنحى العالمي للمجموعة:	-
حالة الحماية الإقليمية:	-
المنحى الإقليمي للمجموعة:	15 - 17 سم / 19 - 23 غم
الحجم والوزن:	



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شرق أوروبا وصولاً إلى منغوليا وشمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 500 - 1,000 كم جنوباً حول البحر المتوسط عبر شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط وجنوب الصين. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي. تقع المملكة حول الحد الجنوبي لنطاق تشتية هذا الطائر المحب للماء؛ ومن ثم فإنه يميل إلى أن يكون زائراً شتوياً واسع الانتشار يوجد بشكل أساسي في النصف الشمالي من المملكة. **الموئل:** الغطاء النباتي المنخفض بالقرب من المياه (خاصة بحيرات مياه الصرف الصحي وبرك الوحل الملحقة بمزارع الألبان)، والمستنقعات الساحلية وغيرها من أراضي المستنقعات، أو الحقول الرياضية المرورية جيداً. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بصفة أساسية على الحشرات ويرقاتها. إضافة إلى العناكب والحريشة

والديدان مفصليّة الأرجل (الدودة اللفية)

وصغار القواقع، فضلاً عن بعض الطحالب

والبذور وثمار التوت. ويرعى على الأرض،

حيث يتناول اللافقاريات فيما يسير صفة

الماء وينقب النباتات المجاورة. ويقفز في

بعض الأحيان لالتقاط حشرة طائرة. ويخوض

في المياه الضحلة، وقد يمشي فوق النباتات العائمة عند التغذية. **النشاط:** نهارى.

السلوك الاجتماعي: ليس من طبيعته أن يوجد في أسراب، لكن نظراً لمحدودية

الأراضي الرطبة، فقد يتم العثور على 50 طائراً، أو أكثر منه في أرض رطبة واحدة مع

تخليق عديد منها في الهواء مع كل بضع خطوات من المراقبة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر

في المملكة. **ملاحظة:** طائر أليف إلى حد ما، ويهز ذيله أكثر من معظم طيور التمير.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثر سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل

تميرة أفريقية	الاسم العربي:
<i>Anthus cinnamomeus</i>	الاسم العلمي:
African Pipit	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 سم / 18 - 31 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في معظم حقول السافانا بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومدغشقر، مع تعداد صغير منه في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. تم التعرف إلى خمس عشر نوعاً فرعياً منه، بما في ذلك «*A. c. eximius*» الذي يتوطن المملكة وغرب اليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. يوجد هذا الطائر ذو الأرجل الطويلة والمتميز بلون القرفة في أقصى المرتفعات الجنوبية الغربية، جنوب الباحة. **الموئل:** فوق

يوجد هذا النوع في

معظم أنحاء أفريقيا، مع

وجود تعداد قليل منه باليمن

وأخر ضئيل في المرتفعات

في أقصى جنوب غرب

المملكة واليمن.

2,000 م في الأراضي الزراعية المفتوحة (بما في ذلك حقول الذرة الرفيعة والأراضي العشبية)، أو الوديان الواسعة ذات الضفاف العشبية، كما يوجد أحياناً في المناطق التي تحتوي على أشجار العرعر والطلح والزيتون البري. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات الصغيرة، خاصة الجنادب والخنفسا، إلى جانب البذور والمواد النباتية الأخرى. ويرعى بشكل أساس عن طريق المشي أو الركض على الأرض، أو القفز، أو الطيران في إثر الحشرات أحياناً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد عادةً في أزواج، أو في مجموعات صغيرة متفرقة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش ورعاية الفراخ. وتتولى الأنثى حضانة البيض. **العش:** على شكل صحن مصنوع من العشب والأوراق الجافة، ومبطن بالعشب الناعم، موضوع في تجويف في الأرض، أو على صفة، ومخبأ جيداً عند قاعدة شجيرة منخفضة، أو حزمة كثيفة من الأعشاب النامية. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 يوماً. **الحضنة:** من المُرجَّح حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100

منطقة النشاط: تنوومة




تميرة طويلة المنقار	الاسم العربي:
جشنة خضراء	الاسم العربي الآخر:
<i>Anthus similis</i>	الاسم العلمي:
Long-billed Pipit	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 - 20 سم / 28 - 35 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مناطق متفرقة عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والهند وميانمار، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب إيران حتى نيبال، بينما يقضي الشتاء على بُعد 500 كم جنوباً في شمال الهند. ويوجد ثلاثة أنواع فرعية على الأقل من التسعة عشرة المعترف بها، منها «*A. s. arabicus*»، وهو متوطن في جنوب المملكة وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة واليمن. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع، زائر شتوي نادر. يوجد هذا الطائر الكبير طويل المنقار في المرتفعات الجنوبية الغربية، جنوب الطائف. وتتجول أعداد صغيرة منه في المنطقة الشرقية خلال فصل الشتاء، ربما قادمة من إيران. **الموئل:** يتكاثر على ارتفاعات تتجاوز 1,500 م على سفوح الجبال وحقول الصخور المرتفعة المدرجة ذات المناطق العشبية والأشجار والشجيرات. وفي فصل الشتاء يفضل الارتفاعات المنخفضة. **سلوك البحث**

عن الغذاء: النظام الغذائي: الحشرات واللافقاريات الأخرى، فضلاً عن البذور. ويرعى بشكل رئيس عن طريق المشي، أو الركض على الأرض، أو التقاط



مقيم متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 20,000

منطقة النشاط: تنوومة



في موسم التكاثر، تغرد

ذكور هذا الطائر وهي ترفرف

مرتفعة نحو السماء، وتستمر

في التغريد لمدة دقيقة، أو

دقيقتين، ثم تعود مرة أخرى

إلى مجثم ما بارز.

من الغطاء النباتي. **النشاط:**

نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل

منفرداً، أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام**

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج

اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تؤدي الأنثى معظم

أعمال بناء العش والحضانة. لكن يشارك كلا

الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:**

على شكل صحن عميق مصنوع من العشب والسيقان، مبطن بالعشب الناعم

والشعر والألياف النباتية، موضوع في تجويف في الأرض على جرف، أو صفة، ويكون

محمياً جزئياً بصخرة منخفضة، أو شجيرة، أو حزمة كثيفة من الأعشاب النامية. **البيض**


المحضون: 3 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 15 يوماً. **الحضنة:**

من المُرجَّح حضنة مزدوجة.

ذعرة رمداة	الاسم العربي:
<i>Motacilla cinerea</i>	الاسم العلمي:
Grey Wagtail	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهديد	حالة الحماية الإقليمية:
مستقر	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 - 20 سم / 14 - 22 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في نطاق يمتد من غرب أوروبا حتى إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق وشمال أوروبا، ومعظم مناطق شمال آسيا، بينما يقضي الشتاء حتى 4,000 كم جنوباً حول البحر المتوسط وشرق أفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع، زائر شتوي محلي. يُصنّف هذا الطائر طويل الذيل والنحيف الرشيق كمهاجر عابر في المقام الأول عبر المملكة (مارس - أبريل، أغسطس - أكتوبر)، مع مرور المزيد منه في فصل الخريف. كما يقضي بعض أفراد الشتاء (توفمبر - فبراير) في المملكة، خاصة في جهة الغرب، جنوب تبوك، **الموئل:** المياه المتحركة ذات الضفاف الرملية والصخرية، لا سيما جداول المرتفعات. ويوجد أيضاً، عند نوافير الزينة وقنوات الصرف والري. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات النهرية، بما فيها مقترنات الأجنحة وذباب مايو والفرشاشات والبعث والجنادب والبق ويرقات هذه الحشرات كلها. ويتناول صغار الحلزون والقشريات.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: الظهران



ذعرة صفراء	الاسم العربي:
<i>Motacilla flava</i>	الاسم العلمي:
Western Yellow Wagtail	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 سم / 11 - 26 غم	الحجم والوزن:



طائر أسود الرأس



طائر رمادي الرأس

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا باتجاه الشرق حتى منغوليا وباتجاه الشمال إلى الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي الشتاء على بُعد 6,000 كم باتجاه الجنوب في أفريقيا والهند وأجزاء من شبه الجزيرة العربية. ويُعرف منه أحد عشر نوعاً فرعياً (معظمها في شبه الجزيرة العربية)، منها ذات رأس أسود، أو أصفر، أو أبيض، أو رمادية، وقد نُعدّ أحياناً أنواعاً مستقلة. **حالته بالمملكة:** مهاجر متكاثر شديد الندرة، مهاجر عابر شائع، زائر شتوي غير شائع. يوجد هذا الطائر الساحر على نطاق واسع في موسم الهجرة (مارس - أبريل، سبتمبر - نوفمبر). كما يقضي بعض أفراد الشتاء (نوفمبر - فبراير) بالمملكة، خاصة في الجنوب الغربي وحول سكاكا. ويتكاثر أسود الرأس (*M. f. feldegg*) بشكل غير منتظم بالقرب من الخرج. **الموئل:** يتكاثر في المناطق المفتوحة المجاورة للمياه، بما في ذلك الأراضي العشبية المرورية والمستنقعات

وبحيرات مياه الصرف. وأثناء هجرته، يوجد

في المناطق المرورية والأراضي المحصولية،

لا سيما محاصيل الأعلاف التي تم حصدتها

مؤخراً. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: اللاقاريات والبذور وبقايا النباتات.

النشاط: نهاري. **السلوك الاجتماعي:** إما

منفرداً، أو في مجموعات صغيرة خلال فصل

الشتاء، وبعضها ينشئ مناطق رعي مؤقتة.

ويمكن أن يشكّل أسراباً تتألف من 100 طائر كحد أدنى أثناء الهجرة، حيث شوهد 1,000

منه في حقل مروى وسط المملكة في أبريل. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج

متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تختار الأنثى موقع العش وتبنيه

وتقوم بمعظم الأعمال الخاصة بحضن البيض، غير أن الطائرين البالغين يتشاركان

رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن مصنوع من سيقان النباتات والأعشاب

والجذور، مبطن بالشعر أو الصوف، موضوع على الأرض في تجويف، وعادةً ما يكون

مخبأً في الغطاء النباتي. **البيض المحضون:** 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 11 - 13 يوماً. **مدة**

التعشيش: تغادر الفراخ العش بعد 10 - 13 يوماً، وتختبئ في منطقة قريبة ثم تطير بعد

16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة غالباً.

ببحيرات مياه الصرف. وأثناء هجرته، يوجد

في المناطق المرورية والأراضي المحصولية،

لا سيما محاصيل الأعلاف التي تم حصدتها

مؤخراً. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام**

الغذائي: اللاقاريات والبذور وبقايا النباتات.

النشاط: نهاري. **السلوك الاجتماعي:** إما

منفرداً، أو في مجموعات صغيرة خلال فصل

الشتاء، وبعضها ينشئ مناطق رعي مؤقتة.

ويمكن أن يشكّل أسراباً تتألف من 100 طائر كحد أدنى أثناء الهجرة، حيث شوهد 1,000

منه في حقل مروى وسط المملكة في أبريل. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج

متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تختار الأنثى موقع العش وتبنيه

وتقوم بمعظم الأعمال الخاصة بحضن البيض، غير أن الطائرين البالغين يتشاركان


رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن مصنوع من سيقان النباتات والأعشاب

والجذور، مبطن بالشعر أو الصوف، موضوع على الأرض في تجويف، وعادةً ما يكون

مخبأً في الغطاء النباتي. **البيض المحضون:** 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 11 - 13 يوماً. **مدة**

التعشيش: تغادر الفراخ العش بعد 10 - 13 يوماً، وتختبئ في منطقة قريبة ثم تطير بعد

16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة غالباً.



مهاجر متكاثر، مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 10

منطقة النشاط: سبخة الفصل



ذعرة بيضاء*Motacilla alba*

White Wagtail

غير مهدد

مستقر

17 - 18 سم / 18 - 25 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب غرب أفريقيا، وغرب أوروبا وصولاً إلى إيران. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر عبر أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 5,000 جنوباً في شمال أفريقيا، مروراً بشبه الجزيرة العربية حتى جنوب شرق آسيا. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر واسع الانتشار، زائر شتوي واسع الانتشار. هذا الطائر الخلاب شائع للغاية وواسع الانتشار بوصفه مهاجراً عابراً، خاصة أنه زائر شتوي (أكتوبر - أبريل). في واقع الأمر، يُعدُّ أكثر الطيور الشتوية شيوعاً في المملكة. **الموئل:** الأراضي الرطبة، وأبج موائل تزخر بالمسطحات الخضراء، مثل متنزهات المدينة والحدائق والملاعب الرياضية، إلى جانب الأراضي الزراعية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات البرية والمائية ويرقاتها، فضلاً عن العناكب والديدان والحلزونات والقشريات. ويأتي أحياناً إلى منصات إطعام الطيور لتناول بقايا الطعام. ويلتقط هذا الطائر فرائسه عن طريق النقر في الغطاء النباتي، أو الأرض، أو سطح الماء أثناء السير، أو عن طريق الركض، أو أنه يعتمد للقفز لتناول الفرائس الطائرة. كما أنه يصطاد الذباب



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: سبخة الفصل



هذا الطائر الصغير الوديع يُعدُّ أكثر الطيور الشتوية شيوعاً في المملكة. وتُعدُّ مشاهدته أمراً ممتعاً حقاً؛ فهو عندما يطارد الحشرات يهز ذيله بحماسة شديدة.

ويخوض ويحوم. **النشاط:** نهارى. ويهاجر ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** رغم أنه قد يوجد في تجمعات كبيرة، إلا أنه عادةً ما يرضى منفرداً. وتم توثيق المئات منه في مجموعات، حيث سُجِّل ما يزيد على 1,000 طائر يبحثون عن الغذاء في حقل مروى محوري من حقل برسيم حديث القطف في فبراير ونحو 3,000 طائر بمزرعة للألبان في يناير، وذلك بالقرب من الرياض. وتتجمع هذه الطيور قبل الغسق في مجموعات بالمناطق المفتوحة، مثل المروج والطرق الدائرية، ثم تغادر بعد غروب الشمس إلى محل إقامتها بشكل جماعي أيضاً. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** ما يميز هذا النوع من الطيور، ذيله الذي يهزه بحماسة شديدة، وطريقته في الطيران ضمن المجموعة؛ وحين يسير فإن رأسه يتحرك للأمام والخلف بشكل ملحوظ.

**ذعرة ليمونية***Motacilla citreola*

Citrine Wagtail

غير مهدد

يتزايد

17 - 20 سم / 18 - 25 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من شرق أوروبا حتى الصين، وشمالاً إلى الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي الشتاء حتى 5,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي في إيران وشرق شبه الجزيرة العربية وشمال الهند حتى جنوب الصين. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي غير شائع. يمكن العثور على هذا الطائر البديع ذي الرأس الأصفر بأعداد صغيرة خلال فصل الشتاء، رغم أن أعداده قد ازدادت بشكل كبير في جميع أنحاء شبه الجزيرة

السبب وراء هزّ طيور الذعرة ذيلها فُحيراً نوعاً ما؛ فقد تكون إشارة اجتماعية (على الرغم من أن الإشارة التي ترسلها غير معروفة)، أو وسيلة لإثارة الحشرات، أو ربما يكون لأي سبب آخر.

إلى ذلك، يبدو أنه يفضل الرعي في البرك الرطبة على جانب الطرق. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يرضى منفرداً، أو في مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** هذا الطائر الجميل عصبي ويميل إلى الهروب، ونادراً ما يستقر لفترة طويلة، رأسه أصفر فلفت للنظر، وطوق رقبتة رمادي داكن، مع خطين باللون الأبيض على الجناحين.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً؛ لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



حسون ورد شائع

Carpodacus erythrinus
Common Rosefinch

غير مهدد
يتناقص

15 - 13 سم / 19 - 33 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



ذكر حسون ورد شائع



أنثى حسون ورد شائع

النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في معظم أنحاء شمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء حتى 7,000 كم باتجاه الجنوب الشرقي والجنوب من الهند حتى جنوب الصين بشكل رئيس. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر محدود. في ثمانينيات القرن العشرين، امتد نطاق تكاثر هذا الطائر ذي الرأس القرمزي باتجاه الغرب في أوروبا. نتيجة لذلك، بدأت الطيور من بعض التعدادات المتكاثرة الغربية تمر عبر المملكة في طريقها إلى

أماكنها الشتوية في الهند. ويبقى هذا الطائر، مهاجراً عابراً محدوداً (مايو، أغسطس - أكتوبر) عبر شرق المملكة، باتجاه الغرب إلى الرياض. معظم الطيور المهاجرة العابرة لأراضي المملكة هي من صغار الطيور التي تقوم بهجرة العودة الأولى إلى مناطق تكاثرها، ما يشير إلى أن هذه الطيور سوف تتعلم قريباً تجنب الهجرة عبر شبه الجزيرة العربية. **الموئل:** الشجيرات والأشجار، كما

على مدى السنوات الأربعين

الماضية، اتسع نطاق تكاثر

هذا الطائر في غرب أوروبا، وهو

يهاجر باتجاه الجنوب الشرقي


لقضاء الشتاء في جنوب آسيا

عبر شمال المملكة.

هي الحال في الحدائق والمتنزهات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:**

البيذور والتوت والفاكهة والبراعم والأوراق، إلى جانب بعض اللافقاريات. كما يبحث عن الغذاء أيضاً، على الأشجار والشجيرات. ويبحث في الأغصان، من أعلى إلى أسفل، عن الأوراق والبراعم المناسبة، وأحياناً يتدلى رأساً على عقب أثناء القيام بذلك. كذلك يبحث على الأرض في الأعشاب والحشائش عن البيذور واللافقاريات. ويتقدم عن طريق القفز على الأرض، وعندما يشعر بالانزعاج أو التهديد، فإنه يطير ليحتمي بغطاء الشجيرات. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجل منفرداً، وأحياناً في مجموعات مكونة من خمسة أو ستة طيور. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

ملاحظة: هذا الطائر بدين المظهر نوعاً ما وغير نشط أحياناً، حيث يمكن رؤيته في مجموعات جاثمة دون حراك في الأدغال.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: حقول تهامة

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

حسون جبلي

شرشور جبلي

Fringilla montifringilla

Brambling

غير مهدد

يتناقص

14 - 16 سم / 17 - 30 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية ومعظم روسيا، بينما يقضي الشتاء على بُعد 3,000 كم جنوباً في أوروبا عبر الشرق الأوسط حتى نيبال وشرق آسيا. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر جداً. يقضي هذا الطائر النادر فصل الشتاء في شمال المملكة، وبشكل عام جنوباً حتى تركيا وشمال إيران. لذلك، فهو زائر شتوي نادر (أو ربما شارد) إلى المملكة، وقد لا يصلها سوى في فصول الشتاء الشمالية شديدة البرودة.

معظم السجلات تأتي من شمال شرق المملكة على طول سواحل الخليج العربي. **الموئل:** الأراضي الزراعية وبحيرات مياه الصرف الصحي وأحواض القصب والمتنزهات في ضواحي المدن. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البيذور والمكسرات والفاكهة الصغيرة، إلى جانب بعض الحشرات وغيرها من اللافقاريات واليرقات. قد يكون هذا الطائر نباتياً في فصل الشتاء أثناء وجوده بالمملكة، وهو في المقام الأول يعتمد على الأرض في بحثه عن الغذاء. ومن المُرجح أنه يوجد في المملكة خلال فصول الشتاء ذات البرودة القارصة في الشمال، ولكن من المحتمل أن تواجه الطيور التي تصل إلى المملكة صعوبة في العثور على ما يكفيها من الغذاء المناسب. وبالتالي لا توجد سجلات تفيد بأنه يقيم في فصل الشتاء لفترة طويلة جداً. في بعض الأحيان قد تميل هذه الطيور لزيارة منصات إطعام الطيور لتوافر مجموعة متنوعة من البيذور. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** نوع سربي عندما لا يتكاثر، ولكن أكبر مجموعة شوهدت منه في المملكة تألفت من ستة طيور فقط. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

يمكن لهذا الطائر النادر جداً


الوصول إلى المملكة بعد

تجاوزه فصل الشتاء في

نطاق تركيا وسورية أثناء

فصول الشتاء شديدة البرودة.

من اللافقاريات واليرقات. قد يكون هذا الطائر نباتياً في فصل الشتاء أثناء وجوده بالمملكة، وهو في المقام الأول يعتمد على الأرض في بحثه عن الغذاء. ومن المُرجح أنه يوجد في المملكة خلال فصول الشتاء ذات البرودة القارصة في الشمال، ولكن من المحتمل أن تواجه الطيور التي تصل إلى المملكة صعوبة في العثور على ما يكفيها من الغذاء المناسب. وبالتالي لا توجد سجلات تفيد بأنه يقيم في فصل الشتاء لفترة طويلة جداً. في بعض الأحيان قد تميل هذه الطيور لزيارة منصات إطعام الطيور لتوافر مجموعة متنوعة من البيذور. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** نوع سربي عندما لا يتكاثر، ولكن أكبر مجموعة شوهدت منه في المملكة تألفت من ستة طيور فقط. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: الخفجي

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

زمير وردي

حسون كزبري
Bucanetes githagineus
Trumpeter Finch
غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
مستقر
13 - 15 سم / 16 - 25 غم

الاسم العربي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:



ذكر




أنثى ترقد في العش

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في جميع أنحاء الحزام الأفريقي الصحراوي، مروراً بشبه الجزيرة العربية حتى أوزبكستان وباكستان. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** يتكاثر هذا العصفور الجميل بريشه المزخرف باللون الوردي، في جميع أنحاء المملكة، لا سيما في جرف طويق. لم يُعثَر على أثر له في أي من المرتفعات الغربية، أو الجنوبية الغربية، أو سواحل تهامة، أو حتى صحراء الربع الخالي. **الموئل:** دون 1,500 م في المناطق الجافة، خاصة في المناطق الجافة والصحرية ذات الشجيرات والأعشاب المتناثرة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل رئيس على البذور، وبراعم الحشائش والأعشاب، إلى جانب بعض الحشرات واليرقات، ويرعى عن طريق الزحف، أو الركض على الأرض، أو الحفر في الرمال. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في أزواج، أو مجموعات صغيرة خلال موسم التكاثر، أو في أسراب كبيرة تتألف من 100 طائر أو أكثر خلال فصل الشتاء.

يمكن أن يبدو تغريد هذا الحسون اللطيف وكأنه طفل يلعب ببوق من البلاستيك. هذا الطائر متكيف مع الصحراء إلى أبعد الحدود، ويحصل على كل ما يلزمه من مواد غذائية ومياه من البذور التي يستهلكها.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وفي أعشاش على مقربة من بعضها أحياناً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (بحضور الذكر)، وتحضن البيض، ويتشارك الطائران البالغان رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن غير مرتب مصنوع من الأغصان والأعشاب والسيقان النباتية والجذور، ومبطن بالشعر والصوف والعشب، وموضوع داخل شق أو تجويف في حافة صخرية، أو جدار، أو مدرج، أو مبنى قديم، أو على الأرض تحت صخرة أو شجيرة. **البيض المحضون:** 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40,000
منطقة النشاط: محمية طويق

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

حسون ورد سينائي

Carpodacus synoicus
Sinai Rosefinch

غير مهدد
مستقر
غير مهدد
مستقر
15 - 16 سم / 17 - 24 غم

الاسم العربي:
الاسم العلمي:
الاسم الشائع:
حالة الحماية العالمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى الإقليمي للمجموعة:
الحجم والوزن:




ذكر



أنثى

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شمال المملكة، ويتجه شمالاً نحو الأردن وفلسطين، وغرباً حتى شبه جزيرة سيناء. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** يتكاثر هذا الطائر الوردي الرائع في أقصى الشمال الغربي والمناطق الواقعة جنوب صحراء النفود الكبير. **الموئل:** يتكاثر دون 2,000 م على الحجر الرملي الصخري الجاف، أو الجرانيت في بعض الأحيان، مثل النتوءات الصخرية والوديان العميقة شديدة الانحدار والأخاديد والصخور. وخلال مواسم أخرى يوجد أيضاً، في السهول الصحراوية. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** غير معروف، لكنه يشمل البذور والبراعم والأوراق الملتقطة من الأرض، أو في بعض الأحيان في الشجيرات. **النشاط: نهاري. السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يُسجَل منفرداً، أو في أزواج أثناء التكاثر، أو في مجموعات عائلية مفترضة تتألف من 12 - 15 طائراً بعد موسم التكاثر، كما أنه يُسجَل أسراباً أكبر تتألف من 20 - 30 طائراً في فصل الشتاء، وتوجد أسراب منه غير متكاثرة على مدار العام.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش منفردة، أو في مجموعات متفرقة. **الأدوار الأبوية:** دور الأبوين في بناء العش غير معروف، غير أن الأنثى تتولى حضانة البيض. كما يتشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن مصنوع من السيقان والأغصان الجافة الخشنة، ومبطن بالألياف النباتية والشعر والفراء، وموضوع على ارتفاع يصل إلى أكثر من 5 م فوق سطح الأرض في حفرة ضحلة، أو شق في جرف صخري، أو أحياناً على الأرض. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 16 يوماً. **الحضنة:** من المحتمل حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5,000
منطقة النشاط: تبوك

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

أشدق عربي	الاسم العربي:
<i>Rhynchostruthus percivali</i>	الاسم العلمي:
Arabian Grosbeak	الاسم الشائع:
قريب من التهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتناقص	المنحى الإقليمي للمجموعة:
15 سم / 30 - 33 غم	الحجم والوزن:



ذكر وأنثى أشدق عربي (في الأمام)

النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد فقط في كل من جنوب غرب المملكة وغرب اليمن ومنطقة ظفار في غرب سلطنة عُمان. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر.** يقتصر وجود هذا الطائر الأصفر الجناح على المرتفعات الجنوبية الغربية، إلى الجنوب من مكة المكرمة. **الموئل:** فوق 1,000 م، على سفوح التلال الجافة والهضاب العالية التي تكثر بها النباتات المختلفة من النباتات العصرية والشجيرات والأشجار، وغالباً ما تكون بالقرب من المياه. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور والبراعم والفاكهة من الأشجار والشجيرات وعلى الأرض. **النشاط:** نهارى، وغالباً ما ينشط قبل الغسق. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يرعى منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات صغيرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الزوجين مسؤوليات بناء العش

لا يوجد سوى 3,000 زوج


من هذا الطائر في العالم،

وجميعها محصورة في

اليمن، وسلطنة عُمان،

وجنوب غرب المملكة.

وإطعام الفراخ القادرة على الطيران، غير أن دورهما في حضن البيض وإطعام الفراخ غير معروف. **العش:** على شكل صحن خشن منسوج من الأعشاب وشرانق الحشرات، أو أغلفة هذه الشرانق، وهو مبطن بالأعشاب والألياف، وموضوع على ارتفاع 4 - 8 م فوق سطح الأرض في شجرة (مشاهدتان تم توثيقهما في سلطنة عُمان فقط). **البيض المحضون:** غير معروف. **الحضانة:** غير معروفة (12 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (13 - 16 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مفردة على الأرجح. **ملاحظة:** تصعب رؤية هذا الطائر من بين جميع الأنواع المتوطنة في شبه الجزيرة العربية، وغالباً ما يتم تحديد موقعه أولاً عن طريق نداءه الفردي، أو تغريده غير المتناغم.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500

منطقة النشاط: بني سعد



حسون صحراوي	الاسم العربي:
<i>Rhodospiza obsola</i>	الاسم العلمي:
Desert Finch	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
15 سم / 17 - 28 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في المملكة وتركيا إلى الصين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 1,500 كم جنوباً في أفغانستان. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** ضُف هذا الطائر الوديع زائراً محدوداً لمنطقة الشمال الغربي من المملكة حتى عام 1975. ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق انتشاره بشكل كبير بسبب نمو الزراعة، وأسس هذا الطائر أماكن لتجمعاته

على عكس ما قد يوحي

اسمُه، يفضل هذا الطائر

الجميل ذو الأجنحة الوردية


المناطق الزراعية. وقد اتسع

نطاق وجوده بشكل كبير

خلال السنوات الأربعين

الماضية مع انتشار الزراعة.

في مناطق عديدة، بما في ذلك الرياض وحائل والجوف وتبوك. **الموئل:** المناطق المزروعة بالأشجار والشجيرات، خاصة البساتين، إلى جانب الحدائق والمزارع. ويوجد أيضاً، في أطراف الحقول العشبية المرورية محورياً، والأراضي الجافة ذات الأشجار الخفيفة المتاخمة للمزارع. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور والبراعم وبعض الحشرات التي يلتقطها من الأرض، أو تحت الغطاء النباتي. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يوجد في أزواج، أو مجموعات صغيرة خلال موسم التكاثر، أو في أسراب تتألف من 100 طائر في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، مع روابط زوجية طويلة الأجل. **الأدوار الأبوية:** تؤدي الأنثى معظم أعمال بناء العش والحضانة، ويتشارك الطائران البالغان رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن عميق غير ثابت مصنوع من الأغصان والأعشاب، ومبطن بالعشب الناعم والشعر والصوف وأحياناً القطن، أو الخيط أو الريش، أو الورق، وموضوع على ارتفاع يراوح بين متر واحد إلى 5 م فوق سطح الأرض، في مكان مفتوح وواضح في الأدغال أو الأشجار، خاصة الطلع والأثل، **البيض المحضون:** 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 12 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 65,000

منطقة النشاط: حائل



الاسم العربي:	نغار عربي
الاسم العلمي:	<i>Crithagra rothschildi</i>
الاسم الشائع:	Arabian Serin,
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	11 - 12 سم / 14 غم



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية. ويوجد فقط في جنوب غرب المملكة وغرب اليمن. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع جداً. يقتصر وجود هذا الطائر الزيتوني الردف على منطقتي جبال الحجاز وعسير، إلى الجنوب من منطقة خيبر. **الموئل:** على ارتفاع 1,500 - 2,500 م (في بعض الأحيان عند مستويات أعلى) في المناطق المفتوحة ذات الأشجار والشجيرات الكثيفة إلى حد ما، خاصة العرعر والطلح. كما يوجد في مدرجات التلال المزروعة بالأشجار. **سلوك البحث عن الغذاء:** يتغذى بشكل رئيس على البذور، إلى جانب براعم الشجيرات وبعض الحشرات واليرقات من الأرض، أو بين النباتات أحياناً. طائر نشط وبهلواني، وغالباً ما يتدلى رأساً على عقب ليتغذى. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** في أزواج، أو مجموعات صغيرة من 5 - 6 طيور كحد أقصى، أو في أسراب من 18 - 20 طائر بصفة استثنائية. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي. ويُرجح أن

الأنثى تؤدي معظم الحضانة أو كلها، لكن الوالدين البالغين يتشاركان في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن مضغوط مصنوع من الأغصان الشائكة والأعشاب وشرائح اللحم والجذور وخيوط العنكبوت، ومبطن بزغب النبات والعشب والشعر، وأحياناً الخيوط، وموضوع على ارتفاع 2 - 4 م فوق سطح الأرض في الفروع الخارجية، أو بجوار جذع شجرة عرعر أو طلح. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** غير معروفة (13 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (15 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان. **ملاحظة:** عادته المتمثلة في هز ذيله باستمرار سمة تميزه عن الطيور الأخرى.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 260,000
منطقة النشاط: متنزه سييسد الوطني (الطائف)



الاسم العربي:	نغار يمني
الاسم العلمي:	<i>Crithagra menachensis</i>
الاسم الشائع:	Yemen Serin
حالة الحماية العالمية:	غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:	مستقر
حالة الحماية الإقليمية:	غير مهدد
المنحى الإقليمي للمجموعة:	مستقر
الحجم والوزن:	11 - 12 سم / غير معروف



النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية. ويوجد بشكل رئيس في المملكة وغرب اليمن، مع تعداد قليل في منطقة ظفار بسلطنة عُمان. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر شائع. يقتصر وجود هذا الطائر ذو الخطوط الرمادية البنية على المرتفعات الجنوبية الغربية، إلى الجنوب من الطائف. **الموئل:** فوق 2,000 م على سفوح التلال الصخرية المفتوحة والنتوءات الصخرية والحقول المزروعة والأراضي القاحلة المسطحة ذات الشجيرات وغابات العرعر في عسير. الغريب أنه تم توثيقه في القرى والمدن في اليمن، ولكن على ما يبدو ليس في المملكة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل رئيس البذور الصغيرة من الأعشاب والدخن والشجيرات وغيرها من النباتات الملتقطة من الصخور وعلى الأرض، أو بين النباتات أحياناً. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** في أزواج أو أسراب صغيرة من 10 - 30 طائراً، أو أكثر من 50 طائراً في بعض الأحيان. وغالباً ما يربى إلى جانب الحسون التفاحي اليمني. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** غير معروفة بما يكفي، لكن يتشارك الطائران البالغان في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن غير مرتب مصنوع من الأغصان والجذور أحياناً، ومبطن بالعشب الناعم وزغب

هذا العصفور باهت لدرجة أنه يجعل النغار العربي يبدو ملوناً كالطاووس، ومع ذلك، ربما يكون هذا الطائر البني الصغير الأكثر روعة على الإطلاق ضمن الطيور من جنسه.

النباتات والشعر والریش، وموضوع على ارتفاع 2 - 25 م فوق سطح الأرض داخل شق بمنحدر (أو مبنى كما هو مسجل في اليمن)؛ وفي أعشاش خطاف الشواهدق الباهت المهجورة في بعض الأحيان. **البيض المحضون:** 3 بيوض (الأعشاش المدروسة=1). **الحضانة:** غير معروفة (13 - 14 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (15 - 18 يوماً في الأنواع المماثلة). **الحضنة:** من المحتمل حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 25,000
منطقة النشاط: تنومة



حسون تفاحي يماني*Linaria yemenensis*

Yemen Linnet

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

مستقر

11 - 12 سم / 13 - 15 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



الذكر



أنثى حسون تفاحي يماني

النطاق العالمي: مقيم؛ متوطن في شبه الجزيرة العربية، ويوجد فقط في جنوب غرب المملكة وغرب اليمن. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** يقتصر وجود هذا الطائر المغرّد على المرتفعات الجنوبية الغربية وصولاً إلى جنوب الطائف. **الموئل:** بشكل رئيس فوق 1,800 م في المناطق الزراعية ذات الأشجار والشجيرات، خاصة أشجار العرعر الناضجة، أو بالقرب من الحقول

والمدرجات المزروعة أو المهجورة. **سلوك**

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: بذور

الشجيرات والنباتات المنخفضة، بما فيها

الحشائش والأعشاب والأشجار الخفيضة، ويبحث عن الغذاء بصفة شبه دائمة على

الأرض، رغم أنه يجثم على الأشجار وفي

الشجيرات. **النشاط:** نهاري. **السلوك**

الاجتماعي: عادةً ما يوجد في أزواج، أو

مجموعات صغيرة خلال موسم التكاثر، أو أسراب تتألف من 200 طائر في المواسم

الأخرى. كما أنه غالباً ما يشكل أسراباً مختلطة مع طائر النعار اليمني. **سلوك التكاثر:**

نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وتوجد في أعشاش

متقاربة أحياناً. **الأدوار الأبوية:** تقوم الأنثى بمعظم أعمال بناء العش وحضن البيض،

أو جميع هذه الأعمال، لكن يتشارك الطائران البالغان في رعاية الصغار. **العش:** على

شكل صحن مضغوط مصنوع من الأغصان والعشب والجذور والطحالب وأنسجة

العنكبوت، ومبطن بطبقة سميكة من زغب النبات والشعر والحشائش، ومخفي

أحياناً وراء جذائل من الطحالب المتدلية، وموضوع على ارتفاع يراوح بين مترين إلى

3 م فوق سطح الأرض (يصل أحياناً إلى 5 م) بشكل رئيس في الفروع الخارجية (في

بعض الأحيان بجانب الجذع) لشجرة عرعر. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:**

غير معروفة (12 يوماً في الأنواع المماثلة). **مدة التعشيش:** غير معروفة (13 يوماً في

الأنواع المماثلة). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.

يُصدر الذكر أحياناً عذبة


وسريعة بنغمات أشبه

بموسيقى فلوت، وأحياناً

وزقزقات عالية وحادة. إنه طائر

موسيقي ومتغير ومفعم

بالحيوية ورائع!



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 100,000

منطقة النشاط: محمية ريدة

**حسون تفاحي شائع***Linaria cannabina*

Common Linnet

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

13 - 14 سم / 15 - 26 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا عبر شرق البحر المتوسط حتى قيرغيزستان. أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً في شمال أفريقيا وشبه جزيرة سيبيريا حتى باكستان. **حالته بالمملكة: زائر شتوي محدود.** غالباً ما ينتشر هذا الطائر القرمزي في شمال المملكة وشبه جزيرة سيناء وتركيا وإيران. ومع ذلك، يقضي فصل الشتاء، في بعض الأحيان، إلى الجنوب من شمال المملكة، خاصة في محافظة تبوك، فضلاً عن المنطقة الشرقية. **الموئل:** أطراف الحقول العشبية والمروية محورياً، والنباتات الساحلية والمناطق ذات الأشجار الخفيضة بالقرب من الأراضي الرطبة. **سلوك**

البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يتغذى بشكل رئيس على البذور، لا سيما رؤوس النباتات الشوكية وغيرها من زهور الأقحوان (Asteraceae)، إلى جانب بذور مجموعة كبيرة من النباتات السنوية الصغيرة

والمنخفضة عموماً. ويلتقط أيضاً بعض

الحشرات والعناكب. وفي فصل الشتاء

يبحث عن الغذاء بشكل أساس على الأرض،

لكنه يجثم أيضاً على النباتات ليتغذى رغم

أنه لا يتدلى رأساً على عقب، مثل عديد من

أكلات البذور. **النشاط:** نهاري. **السلوك**


الاجتماعي: اجتماعي، ويشكل في فصل

الشتاء أسراباً تتألف من 15 طائراً تتجول في

مناطق التغذية المناسبة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** غالباً ما

يجلس على الأسلاك والأسوار، وهو سريع التوتر ويصعب الاقتراب منه. عندما يبدأ في

الطيران فإنه يُخلق بسهولة في حركة متغيرة، ثم في تموجات على أي مسافة.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تبوك



حسون شوكي*Spinus spinus*

Eurasian Siskin

غير مهدد

يتناقص

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

11 - 12 سم / 10 - 19 غم



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في بريطانيا وشرق أوروبا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية وغرب وشرق روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً في أوروبا إلى العراق وشرق آسيا. **حالته بالمملكة: زائر شتوي نادر.** يقضي هذا الطائر الصغير ذو اللون الأصفر المخضر فصل الشتاء عادةً بعيداً إلى الشمال من المملكة. وبالتالي، فهو زائر شتوي نادر بشكل غير منتظم إلى الشمال وساحل الخليج العربي، وربما لا يصل إلى المملكة إلا خلال فصول الشتاء الشمالية شديدة البرودة. معظم مشاهداته داخل المملكة تسجل في نوفمبر، ربما في إشارة إلى أن الطيور خلال فصل الشتاء تنتقل إلى مواقع أخرى. **الموئل:** البساتين وغيرها من المناطق التي تكثر بها الأشجار والشجيرات، مثل المزارع والحدائق العامة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بذور وبراعم الأشجار والنباتات المزهرة والأعشاب. كما يتغذى أيضاً على بعض أنواع الحشرات، والأشجار، حيث يتسم بالمرونة وخفة الحركة، ولكن في فصل الشتاء، غالباً ما يبحث على الأرض عن البذور المتناثرة، أو يتشبهت بالأشواك النباتية أو زهور الأقحوان للحصول على البذور. وفي أجزاء كثيرة من نطاق وجوده في فصل الشتاء، يأتي إلى منصات إطعام الطيور، الأمر الذي قد يكون فغرياً للبقاء في المملكة. **النشاط: نهاري.** **السلوك الاجتماعي:** نوع اجتماعي عندما لا يتكاثر، ولكن عادةً ما تتم مشاهدته في مجموعات صغيرة تصل إلى ستة، رغم تسجيل أسراب تتألف من 20 و50 طائراً بالقرب من الرياض وشمال حائل، على التوالي. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة.

يشكل الحسون الشوكي

مجموعات غير عائلية


تبقى معاً لسنوات على

الرغم من قطعها لمئات

الكيلومترات. ويُطلق علماء

الطيور على تلك المجموعات

اسم «الأصدقاء».



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: تبوك

ديسمبر / نوفمبر / أكتوبر / سبتمبر / أغسطس

يوليو / يونيو / مايو / أبريل

يناير / فبراير / مارس

حسون مذهب أوروبي*Carduelis carduelis*

European Goldfinch

غير مهدد

يتزايد

مهدد بالانقراض

يتناقص

11 - 14 سم / 9.5 - 24 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أوروبا وشمال أفريقيا وصولاً حتى شمال المملكة وإيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق أوروبا حتى وسط روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 4,000 كم إلى الجنوب من كازاخستان، ثم إلى الجنوب في شمال شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم، متكاثر غير شائع، زائر شتوي نادر.** يقضي هذا الطائر الملون فصل الشتاء (نوفمبر - مارس) في شمال غرب المملكة، وبشكل رئيس في محافظة تبوك، إضافة إلى ذلك، فإن إدخال بساتين الفاكهة المرورية الكبيرة في العقود الأخيرة مكّن التعدادات المتكاثرة على مدار السنة من الإقامة في الشمال الغربي. **الموئل:** البساتين والحدائق والأراضي الفاحلة والأطراف العشبية من الحقول المرورية محورياً. ويعشش في الأشجار والشجيرات، خاصة أشجار الفاكهة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** البذور والبراعم والزهور والفاكهة، إلى جانب بعض أنواع الحشرات التي يلتقطها مباشرة من النباتات، أو على الأرض أحياناً. **النشاط: نهاري.** **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يوجد في أزواج، أو أسراب صغيرة تتألف من نحو 30 طائراً خلال الشتاء. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش (تحت حماية الذكر، أو

نضارة القناع الأحمر لدى

هذا الطائر دليل صحة؛

فعندما يكون مريضاً، يستفيد

جسمه من بعض الصبغة


الحمراء في محاربة العدوى،

ما يؤدي إلى تحول القناع إلى

اللون البرتقالي.

ببعض المواد التي يحضرها) وتتولى حضنة البيض. ويشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن أنيق مصنوع من الجذور والعشب والصوف وزغب النباتات، ومبطن بالصوف وزغب النباتات والشعر، وموضوع على ارتفاع يراوح بين مترين إلى 15 م فوق سطح الأرض في الفروع الخارجية لشجرة ما، أو شجيرة. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 12 - 13 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 - 15 يوماً. **الحضنة:**

حضنة مزدوجة. **حالة الحماية:** يُصنّف هذا الطائر على أنه مهدد بالانقراض إقليمياً، بسبب الانخفاض المشتبه به بنسبة 50 - 70% منذ عام 2,000 الذي يرجع إلى حد كبير إلى صيده بغرض بيعه في الأسواق.



مقيم، متكاثر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 2,000

منطقة النشاط: تبوك

ديسمبر / نوفمبر / أكتوبر / سبتمبر / أغسطس

يوليو / يونيو / مايو / أبريل

يناير / فبراير / مارس

درسة قمحية*Emberiza calandra*

Corn Bunting

غير مهدد

يتناقص

غير مهدد

مستقر

17 - 19 سم / 32 - 67 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:


حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وغرب أوروبا حتى غرب الصين، إضافة إلى بعض الطيور المقيمة المتناثرة هنا وهناك في شبه الجزيرة العربية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في وسط أوروبا حتى أوكرانيا، وتهاجر مسافة 2,000 كم جنوباً إلى شمال أفريقيا والعراق وشرق شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر، زائر شتوي غير شائع.** تقضي أعداد صغيرة من هذا الطائر الكبير نسبياً والمزكش في فصل الشتاء (نوفمبر - مارس) على طول الشريط الساحلي للخليج العربي. إضافة إلى ذلك، مكن انتشار الزراعة التعدادات المقيمة من الظهور في حقول المحاصيل، وتم تسجيل تكاثره للمرة الأولى عام 1993 بالمنطقة الشرقية، ومؤخراً في المناطق الوسطى والقرب من تبوك. **الموتل:** الحقول المروية المفتوحة، بما في ذلك حقول القمح والذرة والقش. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يقوم بشكل أساس على البذور، فضلاً عن اللافقاريات (خاصة في موسم التكاثر)، والحشرات والعناكب والرخويات والحلزونات والديدان. ويرعى هذا الطائر عادةً على الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد منفرداً، أو في مجموعات صغيرة تضم حتى 15 طائراً أو 30 بشكل استثنائي. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** متعدد الزوجات، فيعيش ذكر مناطق واحد مع ما يصل إلى 18 أنثى، أو أحادي الزوج في بعض الأحيان. **الأدوار الأبوية:** تبني الأنثى العش وتحضن البيض وتعتني بالصغار، في حين يدافع الذكر عن منطقته السيادية، فضلاً عن توفير المساعدة في بعض الأحيان. **العش:** على شكل صحن غير ثابت مصنوع من سيقان النباتات والأعشاب، ومبطن بالعشب الناعم والجذور والشعر، وموضوع على الأرض، أو بالقرب منها ومخفياً وسط النباتات الكثيفة. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 9 - 12 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر، زائر شتوي
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 1,000
منطقة النشاط: تبوك

**درسة رأساء***Emberiza melanocephala*

Black-headed Bunting

غير مهدد

غير معروف

غير مهدد

غير معروف

16 - 18 سم / 16 - 18 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر من إيطاليا وصولاً إلى باكستان، بينما يقضي الشتاء على بُعد 1,500 - 6,000 كم باتجاه الجنوب الشرقي في غرب الهند. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر نادر.** تمر أعداد قليلة من هذا الطائر المتميز باللونين الأسود والأصفر عبر المملكة (أبريل، أغسطس - سبتمبر) في معظم السنوات. وتمر الطيور التي تعيش في الثلث الغربي من نطاق تكاثر هذا الطائر عبر شمال شرق المملكة في طريقها إلى أماكن

يُعَدُّ هذا الطائر أحد الطيور المهاجرة القليلة من أوروبا التي تمر عبر المملكة في اتجاه الجنوب الشرقي نحو الهند بدلاً من الجنوب الغربي نحو أفريقيا.

في غرب الهند لقضاء فصل الشتاء. **الموتل:** يمكن أن يوجد في أي مكان خلال موسم الهجرة، خاصة المناطق ذات الغطاء النباتي الخفيف، بما في ذلك الصحاري ذات الأشجار القصيرة والمزارع والحدائق. ويبدو أنه يتجنب موائل الأراضي الرطبة، مثل أحواض القصب. كما يتخذ الأشجار القصيرة والأجمات أماكن لجثومه. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** اللافقاريات، خاصة الحشرات واليرقات، إلى جانب

عديد من البذور، بما في ذلك الحبوب والقمح، وتوت سالفادورا التي يمكن العثور عليها بسهولة في المملكة، وهو يرعى على الأرض، ويتقدم عن طريق القفز. كما يبحث عن الغذاء في الشجيرات، أو أسفل الأشجار.

النشاط: نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً ما يكون أسراباً خارج موسم التكاثر، ويختلط أيضاً مع الأنواع الأخرى، ولكن غالباً ما يتم تسجيله منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات صغيرة نادرة في المملكة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** يُعَدُّ هذا الطائر كبيراً، وبأرجل طويلة نسبياً ويميل للجلوس منتصباً بشكل بارز. **باغ الجناح:** 23 - 33 سم.



مهاجر عابر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: محمية الملك سلمان (حزة الحزة)




درسة شعيرية	الاسم العربي:
<i>Emberiza hortulana</i>	الاسم العلمي:
Ortolan Bunting	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
قريب من التهديد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
16 - 17 سم / 17 - 28 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في غرب أوروبا وشبه الجزيرة الإسكندنافية حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 3,000 - 7,000 كم باتجاه الجنوب والجنوب الغربي في منطقة الساحل الأفريقي، وشرقاً حتى فيتنام. **حالته بالمملكة:** مهاجر عابر شائع. هذا الطائر الاجتماعي مهاجر عابر شائع وواسع الانتشار في جميع أنحاء المملكة (مارس-أبريل، سبتمبر-أكتوبر)، مع زيادة في أعداده بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل. **الموئل:** يفضل المناطق الجافة والمكشوفة من الحشائش والأعشاب الضارة ذات الشجيرات القصيرة، مثل أطراف الحقول المروية والحدائق الكثيفة. لكن يمكن أن يظهر في أي مكان، بما في ذلك الأراضي ذات الأشجار المتناثرة بالربع الخالي. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: بشكل أساس البذور خارج موسم التكاثر، واللافقاريات عند التكاثر. عادةً يبحث عن غذائه بهدوء على الأرض، حيث يتحرك في قفزات، أو زحفاً إلى حد ما، أو في الأشجار والشجيرات أحياناً.

صوت هذا الطائر متميز، وتغريداته متسقة بشكل كبير في أي منطقة كان، مع وجود حدود بارزة بين المناطق المتجاورة.

وغالباً ما يقترن وجوده بأنواع طيور درسة أخرى. **النشاط:** نهارى. ويمكن أن يهاجر ليلاً ونهاراً. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يُعثر عليه في مجموعات من 4 إلى 10 طيور، ولكن تم الإبلاغ عن 100 أو أكثر من حين لآخر ضمن منطقة صغيرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** عند شعوره بالتهديد، يطلق هذا الطائر نداءً قصيراً (تسييب)، وغالباً ما يطير إلى الشجيرات القريبة، أو يعود إلى الأرض مرة أخرى على مسافة قصيرة. يتميز بنمط طيران متموج قليلاً، ويغير ريشه خلال العام. كما يُظهر خلال موسم التكاثر في الربيع بطناً أبيضاً غير محدد، ورأساً زيتونياً رمادياً، وشارباً وذقناً أصفرين محددين، في حين أن الطيور في الخريف تكون ذات بطن وذقن بلون أصفر باهت وخطوط ظاهرة بلون أسود.



مهاجر عابر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: مناطق جدة النائية




درسة ذقناء غربية	الاسم العربي:
<i>Emberiza cineracea</i>	الاسم العلمي:
Cinereous Bunting	الاسم الشائع:
قريب من التهديد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
غير معروف	المنحى الإقليمي للمجموعة:
17 - 18 سم / 21 - 30 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر في ضمن نطاق ضيق للغاية من الجزر اليونانية حتى غرب إيران، بينما يقضي الشتاء على بُعد 2,000 كم على جانبي جنوب البحر الأحمر. **حالته بالمملكة:** زائر شتوي نادر. هذا الطائر زائر شتوي نادر إلى المرتفعات الجنوبية الغربية (نوفمبر - فبراير) ويهاجر عبر المملكة (مارس - مايو، أغسطس - سبتمبر). هناك مشاهدات متفرقة من المنطقة الشرقية، بالقرب من الرياض والطائف، لتعدادات منه تسافر من مناطق تكاثره الشمالية، أو إليها. **الموئل:** على مدار فصل الشتاء، يوجد على ارتفاع 1,000 - 2,500 م في المناطق الصخرية المكشوفة المغطاة بالأشجار القصيرة، أو في المناطق التي تضم مزيجاً من المروج والتلال وبعض الأشجار والمزروعات المحدودة. أثناء موسم هجرته، يمكن العثور عليه في أي منطقة مكشوفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: غير معروف بما يكفي، ولكنه يقوم على البذور في فصل الشتاء واللافقاريات عند التكاثر. ويبحث عن غذائه على الأرض

ويقطن في الأشجار. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** قد يوجد في مجموعات صغيرة تصل إلى 7 - 8 طيور في فصل الشتاء، وفي مجموعات أصغر عند الهجرة. وغالباً ما يقترن بالدرسات، أو الشرشوريات، أو العصفير الأخرى عند التغذية والهجرة. **سلوك التكاثر:** لا يتكاثر في المملكة. **ملاحظة:** طائر كبير، طويل الجسم إلى حد ما، كما يتميز بمنقار طويل نسبياً، ولكنه لا يحمل أي سمة شكلية متميزة بصرف النظر عن رأسه الأصفر، حتى تغريده غير متميز نوعاً ما، فهو عبارة عن نداء قصير يتألف من 4 - 6 نغمات.



زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة
منطقة النشاط: جبل فيفاء



درسة رفيعة الخطيطة*Emberiza striolata*

Striolated Bunting

غير مهدد

يتزايد

غير مهدد

مستقر

الحجم والوزن: 13 - 12 سم / 16 - 12 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:




ذكر (إلى اليسار) وأنثى

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في شرق أفريقيا (من تشاد حتى كينيا والصومال) ويعبر شبه الجزيرة العربية حتى شمال غرب الهند. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع.** يوجد هذا الطائر الجذاب، الأصغر في المملكة، بشكل أساس في النصف الغربي من المملكة، لا سيما في الجرف الشرقي الأكثر جفافاً، حيث تلتقي جبال تهامة بالسفوح، لكنه غير موجود في الجرف الغربي ذي الغطاء النباتي الكثيف. **الموئل:** دون 2,500 م على التلال الصخرية الجافة، أو الوديان بعيداً عن المستوطنات البشرية وبالقرب من المياه. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يقوم بشكل رئيس على بذور الأعشاب والحشائش، إلى جانب الزهور والتوت والحشرات أحياناً. يبحث عن غذائه بشكل أساس على الأرض، أو يلتقط البذور من رؤوس النباتات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادةً في أزواج خلال موسم التكاثر، أو في مجموعات صغيرة في المواسم الأخرى. **سلوك التكاثر: نظام**

يُعرف هذا الطائر أيضاً، باسم دراسة منزل لأنه غالباً ما يوجد في منازل شمال أفريقيا. لذلك، من الغريب أنه يميل إلى تفادي المنازل في شبه الجزيرة العربية ويفضل التعشيش على المنحدرات بدلاً من ذلك.

التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن منطقة السيادة فيما تبني الأنثى العش (في حراسة الذكر) وتحضن البيض، لكن يتشارك كلا الطائرين البالغين في رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن أنيق مصنوع من الأغصان والجذور وسيقان الأعشاب، ومبطن بألياف نباتية وشعر وصفوف، وموضوع داخل شق بمنحدر ما (ربما أيضاً في المباني والجدران والآثار وحتى المنازل المهولة. كما تم تسجيل وجوده في المغرب). **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 14 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 80,000

منطقة النشاط: الباحة

**درسة زرقاء***Emberiza caesia*

Cretzschmar's Bunting

غير مهدد

مستقر

غير مهدد

غير معروف

الحجم والوزن: 16 سم / 19 - 24 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:


الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مهاجر؛ يتكاثر حول منطقة شرق البحر المتوسط من اليونان وصولاً إلى شمال الأردن، بينما يقضي فصل الشتاء على بُعد 2,000 كم جنوباً في السودان وإريتريا. **حالته بالمملكة: مهاجر عابر غير شائع، زائر شتوي نادر.** هذا الطائر شائع محلياً وموسمياً في السهل الساحلي الشمالي للبحر الأحمر في المملكة خلال موسم الهجرة (مارس - أبريل، أغسطس - سبتمبر). من غير الواضح ما إذا كانت المشاهدات المسجلة من نوفمبر إلى فبراير هي لطيور فردية تقضي فصل الشتاء، أو مجرد طيور عابرة فقط. وبالنظر إلى أن نطاق تكاثره وأماكنه الشتوية تقع في شرق المملكة على العموم، فليس من المستغرب أن تحدث غالبية المشاهدات المسجلة على طول الجهة الشمالية الغربية للمملكة. **الموئل:** الغطاء النباتي والحدائق وبساتين التمر. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** بذور الأعشاب وغيرها من النباتات الأرضية. ويبحث عن الغذاء على الأرض بين الأعشاب والحشائش

يوجد هذا الطائر ضمن نطاق ضيق، ويتكاثر حول منطقة شرق البحر المتوسط، بينما يقضي فصل الشتاء في السودان وإريتريا، لذلك يمكن رؤيته بشكل رئيس في الشمال الغربي.

في المملكة. **ملاحظة:** على عكس معظم أنواع طيور دراسة الأخرى، هذا النوع ودود جداً. ويطير إلى الأشجار القريبة عندما يشعر بالتهديد، على عكس ما تفعله أنواع دراسة الأخرى، إذ تعلق بعيداً.



مهاجر عابر، زائر شتوي

الأزواج المتكاثرة سنوياً: لا يتكاثر في المملكة

منطقة النشاط: ينبع



**درسة قرفية صدر**

الاسم العربي:	الاسم العلمي:
الاسم الشائع:	حالة الحماية العالمية:
غير مهدد	المنحى العالمي للمجموعة:
مستقر	حالة الحماية الإقليمية:
غير مهدد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
مستقر	الحجم والوزن:
15 - 13 سم / 12 - 21 غم	




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شبه الجزيرة العربية. وتم التعرف إلى أربعة أنواع فرعية منه، بما فيها «*F. t. arabica*» المتوطن في شبه الجزيرة العربية الذي يوجد في المملكة وغرب اليمن وغرب سلطنة عُمان. **حالته بالمملكة: مقيم متكاثر شائع جداً.** يوجد هذا الطائر المذهل في السفوح الجبلية والجبال جنوب مدينة الطائف، لا سيما الجرف الغربي. **الموئل:** المهاجر بشكل طولي؛ يتكاثر فوق 500 م على سفوح التلال الصخرية ذات الأرض المفتوحة والمكشوفة التي تزخر بالأشجار والشجيرات والأعشاب المتناثرة. وعلى ارتفاعات أعلى، يوجد في الحقول

الزراعية والأراضي ذات الأشجار القصيرة بالقرب من المناطق الصخرية، وفي غابات العرعر أحياناً. وقد يتقلص نطاق وجوده من حيث الارتفاع خلال فصل الشتاء، ويمكن أن يتخذ من أشجار الطلح الجافة في تهامة مؤلاً له.

سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي: يقوم بشكل أساسي على بذور العشب، إلى جانب الأوراق ورقيق الأزهار، فضلاً عن الحشرات التي يلتقطها من الأرض بصورة أساس. **النشاط:** نهارى. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يسجل منفرداً، أو في أزواج، أو مجموعات عائلية صغيرة. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. الأدوار

الأبوية: يدافع الذكر عن منطقة السيادة فيما تبني الأنثى العش (في حراسة الذكر) وتحضن البيض. لكن يتشارك كلا الطائرين البالغين رعاية الصغار. **العش:** على شكل صحن ضحل مصنوع من الأغصان وسيقان العشب، ومبطن بالعشب الناعم والألياف النباتية والشعر في بعض الأحيان، وموضوع على الأرض ومحمي جزئياً بواسطة صخرة، أو عند قاعدة شجيرة منخفضة. **البيض المحضون:** 2 - 3 بيوض. **الحضانة:** 12 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 13 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر
الأزواج المتكاثرة سنوياً: 350,000
منطقة النشاط: وادي ذي غزال (الحجاز)



أنواع الطيور الغربية المدخلة

أنواع الطيور الغربية المدخلة هي تلك الطيور التي توجد وتعيش بطبيعة الحال خارج المملكة العربية السعودية، وقد أُدخِلت عن قصد أو عَرَضاً إلى الحياة الفطرية في المملكة، ويمكن لمثل هذه الطيور أن تصبح مصدر قلق كبير، في حال تأثيرها بشكل سلبي على الحيوانات والغطاء النباتي الأصلي. فعلى سبيل المثال، قد تتفوق الأنواع المدخلة على الطيور الأصلية في التنافس على الغذاء، أو مواقع التعشيش، أو حتى أنها قد تحمل أمراضاً جديدة قد لا تتحملها الطيور الأصلية.

لحسن الحظ، ثمة تعدادات قليلة من أنواع الطيور الغربية التي عمدت إلى تأسيس مجموعات تكاثر دائمة في المملكة. علاوةً على ذلك، فإن الطيور الغربية في المملكة تحظى بأزواج تكاثرية تبلغ 500 طائر أو أقل، كما أن ستة منها تحظى بأقل من 50 زوجاً تكاثرية سنوياً، وهو ليس كافياً لاستدامتها على المدى الطويل. كما أن جميع الطيور الغربية تقريباً في المملكة العربية السعودية تعيش في موائل محدودة تم تعديلها بشكل كبير، خاصة في المنطقة الشرقية، ومعظم الطيور الغربية غير قادرة على اختراق الأنظمة البيئية المتناسكة لأن الطيور الأصلية بشكل عام تشغل أغلب المواقع البيئية الملائمة)، وغالباً ما ينقصها متطلبات التأقلم اللازمة لمواجهة أجواء المناخ الحارة والجفاف وشح الغذاء في الصحارى.

هناك نوعان من الطيور لم يتم إدراجهما في هذا القسم، وذلك لعدم توافر المعلومات ونقصها، وهما البط الخضاري الذي يظهر بشكل طبيعي في المملكة، والذي يُعدُّ من الطيور غير المتكاثرية، غير أنه شهد تكاثراً مع التعداد المتكاثراً، في حين قد يكون البلبل أبيض الأذن من الطيور الأصلية في شرق المملكة وبأعداد قليلة، رغم إدخال بعض أفرادها. ولأن هذه الأنواع (غالباً) تتمتع بتعداد طبيعي في المملكة العربية السعودية، تم إدراجها ضمن قائمة الأنواع الأصلية.



بغاء هندية مطوقة (درة مطوقة). هذا النوع من الطيور يوجد بطبيعة الحال في أفريقيا والهند، وهو أحد الأنواع الأحد عشر من الطيور الغربية التي أُدخِلت في المملكة العربية السعودية، غير أنه هذا الطائر الجميل تم إدخاله في خمسينيات القرن الماضي إلى المملكة.


ببغاء نبيلة	الاسم العربي:
درة إسكندرية	الاسم العربي الآخر:
<i>Psittacula eupatria</i>	الاسم العلمي:
Alexandrine Parakeet	الاسم الشائع:
شبه مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتناقص	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
62 - 50 سم / 198 - 258 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال في شرق أفغانستان وصولاً إلى فيتنام، وقد أُدخل هذا الطائر الشائع، رهين الأقفاص والأسر، إلى مناطق عديدة، بما فيها شبه الجزيرة العربية، حيث تمكن من تشكيل مجموعات صغيرة متكاثرة بشكل هائل، لا سيما في المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، فيما تتكاثر أعداد أقل في جميع الدول الأخرى. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر نادر جداً.** تم العثور على هذا الببغاء الكبير الملون والصاخب بالمملكة في الموائل المعذلة حول جدة والظهران، وقد تم تسجيل ظهوره في المملكة للمرة الأولى عام 1983. **الموئل:** المناطق المنخفضة ذات الأشجار والغطاء النباتي الجيد، مثل الحدائق والمتنزهات في الضواحي وملاعب الغولف والمناطق الزراعية. وربما يوجد كذلك في غابات المانغروف (كما هو مسجل

الموطن الأصلي لهذا الطائر هو شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، ورغم أنه غالباً ما يعيش في أقفاص، فقد تمكن من تشكيل تجمعات صغيرة نتيجة لفرط تكاثره في الدمام عام 1983.

في الإمارات العربية المتحدة). **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى بشكل أساسي على الفاكهة والبذور والبريق والبتلات والأوراق الصغيرة. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** عادة ما يُسجل ظهوره في أسراب صغيرة مكونة من 4 - 5 طيور، وأحياناً تصل أعدادها إلى 10 - 20 طائراً. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، تعيش منفردة أو مع آخرين في أعشاش متقاربة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات حضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** تجويف في شجرة غير مبطن، أو في شق في مبنى أحياناً، أو قد تعمل الأزواج في بعض الأحيان على توسيع ثقب موجود بالأساس في شجرة. **البيض المحضون:** 2 - 4 بيوض. **الحضانة:** 19 - 21 يوماً. **مدة التعشيش:** 7 أسابيع. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 40
منطقة النشاط: جدة




دراج أرمد	الاسم العربي:
<i>Francolinus pondicerianus</i>	الاسم العلمي:
Grey Francolin	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
غير مهدد	حالة الحماية الإقليمية:
يتزايد	المنحى الإقليمي للمجموعة:
30 - 35 سم / 200 - 340 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال في النطاق من جنوب إيران عبر الهند إلى شمال سريلانكا، وأُدخل إلى عديد من الأماكن في جميع مناطق العالم، بما فيها شبه الجزيرة العربية. ويوجد تعداد كبير منه في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان أصلياً، أو أُدخل خلال القرن التاسع عشر. كما أُدخل طائر يُعدّ نوعاً فرعياً منه آخر مختلف في العقود الأخيرة، وقد انتشر بدوره في المملكة والبحرين وقطر. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر شديد الندرة.** أُدخل هذا الطائر كستنائي اللون للمرة الأولى إلى المملكة في عام 1991، ولوحظ وجوده من الظهران إلى الجبيل. ولكن، فشل في إنشاء تعداد مستدام ذاتياً، ويُعدّ شبه منقرض تقريباً. في مارس عام 2019، شوهد طائر واحد بالقرب من منطقة البري، وهو أول سجل مؤكد له منذ 15 عاماً. **الموئل:** يوجد بالقرب من مستوى سطح البحر في المناطق ذات الأشجار والشجيرات، بما في ذلك المزارع والحدائق الكبيرة والمناطق المزروعة، والغابات الجافة المفتوحة. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على بذور الأعشاب والحبوب بشكل أساسي، إلى جانب الحشرات والسحالي الملتقطة من الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في أزواج، أو مجموعات صغيرة.

سلوك التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، ربما مع روابط زوجية طويلة الأجل. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضنة البيض، وكلاهما يتشاركان رعاية الصغار. كما تظل المجموعات الأسرية معاً لأشهر عدة. **العش:** حفرة عميقة فوق سطح الأرض مبطن بالفضينات والأعشاب والجذور والأوراق، وعادة ما تكون مغطاة رغم أنها تُترك في العراء أحياناً عند قاعدة أي شجرة.

البيض المحضون: 6 - 7 بيوض. **الحضانة:** 18 - 22 يوماً. **مدة التعشيش:** تترك الصغار لديها بعد فترة قصيرة من الفقس وتختبئ في مكان قريب، علماً أن عمر الطيران الأول لديها غير معروف (الأنواع المماثلة تطير بشكل ضعيف خلال 10 - 20 يوماً، وتبلغ نموها الكامل في غضون 35 يوماً). **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.




مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5
منطقة النشاط: البري

غراب دوري	الاسم العربي:
<i>Corvus splendens</i>	الاسم العلمي:
House Crow	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
40 - 43 سم / 245 - 371 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ أصيل ضمن نطاق يمتد من باكستان حتى ميانمار، وقد انتشر في أجزاء كبيرة من أطراف المحيط الهندي (عن طريق تأسيس مجتمعات له ذاتياً، أو الانتقال على متن السفن وعمليات التوطين المقصودة)، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية وشرق وجنوب أفريقيا وأجزاء من جنوب آسيا. يوجد في جميع الدول بشبه الجزيرة العربية، لا سيما المناطق الساحلية، وتتزايد أعدادها. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** تم العثور على هذا الغراب الرشيق طويل الساقين بلونه الأسود والرمادي بصورة رئيسة في البلدات والمدن الساحلية على البحر الأحمر والخليج العربي، وقد تم تسجيله للمرة الأولى في عام 1980 بالقرب من الظهران. **الموئل:** المتنزهات والحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار الكبيرة المثمرة، خاصة أشجار النخيل. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتكون من طعام الإنسان واللافقاريات والفقاريات الصغيرة والجيف والمحاصيل، ويمكن القول أي شيء تقريباً. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** غالباً ما يبحث عن الغذاء بشكل اجتماعي ويمكن أن يشكل مجامع جماعية بأعداد كبيرة. **سلوك**



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 10,000

منطقة النشاط: جدة

التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وقد تعيش منفردة، أو محتشدة بشكل متفرق مع أعداد أخرى كثيرة. **الأدوار الأبوية:** يشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش والدفاع عنه ورعاية الصغار، وتؤدي الأنثى معظم الحضنة. **العش:** على شكل صحن كبير مكون من عيدان، وأحياناً يكون مزوداً بأسلاك، أو كابلات كهربائية أو بقايا خُطام، ويطن بالعشب والشعر، وأحياناً الخيوط أو القماش أو لحاء الشجر، وعادةً ما يكون موضعاً على ارتفاع يزيد على 5 م فوق سطح الأرض في شجرة طويلة (نخلة غالباً)، أو فوق مبنى، أو غيره من الهياكل المصنعة. **البيض المحضون:** 3 - 5 بيوض. **الحضانة:** 16 - 17 يوماً. **مدة التعشيش:** 27 - 28 يوماً. **الحضنة:** عادة ما تكون حضنة مفردة.

موطن هذا الطائر الأصلي هو شبه القارة الهندية، وهو ينتشر حول المحيط الهندي. تم توثيق مشاهدته للمرة الأولى بالقرب من الظهران بالمملكة في عام 1980.




بغاء هندية مطوقة	الاسم العربي:
درة مطوقة	الاسم العربي الآخر:
<i>Psittacula krameri</i>	الاسم العلمي:
Rose-ringed Parakeet	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
-	حالة الحماية الإقليمية:
-	المنحى الإقليمي للمجموعة:
37 - 43 سم / 95 - 143 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال في أفريقيا (من السنغال إلى إريتريا)، وآسيا (من أفغانستان إلى ميانمار)، وهو طائر شائع يعيش في الأسر وأدخل إلى مناطق عديدة، ما أدى إلى تكاثره بشكل هائل في جميع أنحاء العالم، بما فيها شبه الجزيرة العربية. فهو يوجد على نطاق واسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، لا سيما المناطق الساحلية من الخليج العربي. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر غير شائع.** سُجل ظهور هذا البغاء الجميل والسريع والصاحب للمرة الأولى بالظهران في عام 1958، وهو موجود حالياً في المدن والبلدات على طول سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر. ويوجد أيضاً في تبوك وحول الرياض. **الموئل:** يوجد على ارتفاعات دون 2,000 م في المناطق الحضرية، خاصة المتنزهات والحدائق ذات الأشجار الناضجة والأراضي الزراعية وبساتين التمر والمناطق قليلة الأشجار. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يتغذى على الفاكهة، والبذور وبتلات الزهور ورحيقها. **النشاط:**

موطن هذا الببغاء الملون والصاحب والنشط، الأصلي في أفريقيا وشبه القارة الهندية، وسُجل ظهوره للمرة الأولى في الظهران بالمملكة في عام 1958.

نهاري. السلوك الاجتماعي: يطير في أسراب، وعادةً ما يوجد بانتظام في أسراب تصل أعدادها إلى 20 طائراً، وأحياناً يتم الإبلاغ عن وجود أسراب، أو مجامع تضم مئات عدة منه. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** تتولى الأنثى حضنة البيض، ويتشارك الأبوان في رعاية الصغار. **العش:** ثقب أو شق غير مبطن مبني على ارتفاع يصل إلى 12 م تقريباً فوق سطح الأرض في أي شجرة، أو صخرة، أو مبنى، أو هيكل، بما فيها عمدة الإنارة وأبراج الاتصالات. **البيض المحضون:** 3 - 4 بيوض. **الحضانة:** 20 - 24 يوماً. **مدة التعشيش:** 40 - 50 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 5,000

منطقة النشاط: الظهران



ماينا شائعة*Acridotheres tristis*

Common Myna

غير مهدد

يتزايد

-

-

25 سم / 82 - 143 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:


المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



طائرا ماينا شائعة، فرخ وطائر بالغ (اليس اليمين)

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال في نطاق يمتد من إيران وكازاخستان حتى فيتنام. وقد أُدخل على نطاق واسع في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أفريقيا والمحيط الهادئ وأستراليا وشبه الجزيرة العربية. وتم توثيق مشاهدته للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر في أواخر سبعينيات القرن الماضي. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر ونادر.** تم الإبلاغ عن هذا البلبل الجريء للمرة الأولى في عام 1993 بالرياض. وانتشر منذ ذلك الحين إلى مناطق أخرى، منها جدة والمنطقة الشرقية. وبالنظر إلى سجله الحافل في تأسيس مجتمعات متكاثرة بنجاح بالمناطق الحضرية، فإنه من المتوقع أن يصبح شائعاً ومنتشراً بالمنطقة الشرقية مستقبلاً. علاوةً على ذلك، يلجأ «بلبل أحمر العجز» أحياناً، إلى التهجين مع «بلبل أبيض الأذن». **الموئل:** المناطق الحضرية والضواحي، خاصة المتنزهات والحدائق والأشجار على جانبي الطرقات والشجيرات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات وغيرها من اللافقاريات، بما في ذلك الديدان والقواقع والقشريات والعناكب والحريشة، فضلاً عن الفقاريات الصغيرة، مثل الضفادع وأبو بريص والبيض وفقس الطيور. إضافة إلى الفاكهة وبذور النباتات البرية والمزروعة وبقايا طعام الإنسان. ويلتقط هذا الطائر معظم طعامه من الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج، أو مجموعات صغيرة. ويمكن أن تتجمع أسراب تتألف من 30 طائراً كحد أقصى خلال فصل الشتاء، وقد تحتوي المجاثم على مئات الطيور. **نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً، وربما روابط زوجية تستمر مدى الحياة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الطائران البالغان في بناء العش وحضن البيض والاعتناء بالصغار والدفاع بصرامة عن منطقة السيادة. **العش:** قاعدة غير مرتبة من الأغصان والأوراق الخضراء والعشب وبقايا حطام، مع وعاء مركزي مصنوع من العشب الخشن والريش. ويوضع العش بشكل رئيس في تجويف في مبنى (خاصة بجانب وحدات تكييف الهواء)، أو أعمدة الإنارة، أو إشارات المرور، أو شجرة، أو صخرة في بعض الأحيان. وغالباً ما يعيد استخدام هذه المواضع. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 13 - 18 يوماً. **مدة التعشيش:** 22 - 27 يوماً. **الحضنة:** حضنات متعددة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 35,000**منطقة النشاط: الظهران****بلبل أحمر العجز**

بلبل أكسع

Pycnonotus cafer

Red-vented Bulbul

غير مهدد

يتزايد

-

-

20 - 19 سم / 28 - 40 غم

الاسم العربي:

الاسم العربي الآخر:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال ضمن نطاق يمتد من باكستان إلى شمال تايلند. وقد أُدخل إلى كثير من أنحاء العالم، خاصة بولنيزيا والمنطقة العربية، وهو يتكاثر الآن في جميع دول شبه الجزيرة العربية باستثناء اليمن. **حاليته بالمملكة: مقيم متكاثر ونادر.** تم الإبلاغ عن هذا البلبل الجريء للمرة الأولى في عام 1993 بالرياض. وانتشر منذ ذلك الحين إلى مناطق أخرى، منها جدة والمنطقة الشرقية. وبالنظر إلى سجله الحافل في تأسيس مجتمعات متكاثرة بنجاح بالمناطق الحضرية، فإنه من المتوقع أن يصبح شائعاً ومنتشراً بالمنطقة الشرقية مستقبلاً. علاوةً على ذلك، يلجأ «بلبل أحمر العجز» أحياناً، إلى التهجين مع «بلبل أبيض الأذن». **الموئل:** المناطق الحضرية والضواحي، خاصة المتنزهات والحدائق والأشجار على جانبي الطرقات والشجيرات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** الحشرات وغيرها من اللافقاريات، وفي بعض الأحيان صغار الفقاريات، مثل صغار انتهازي، ويشمل قوته الفاكهة والرحيق والبراعم واللافقاريات، وفي بعض الأحيان صغار الفقاريات، مثل صغار الوزغ. كما يتناول بقايا طعام الإنسان. ويعمد هذا الطائر إلى تناول معظم فرائسه على الأشجار. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** منفرد، أو في أزواج. **سلوك التكاثر: نظام التزاوج:** أزواج متكاثرة مناطقية أحادية الزواج اجتماعياً. **الأدوار الأبوية:** يتشارك الزوجان مسؤوليات بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل صحن منسوج من الأغصان الدقيقة والأعشاب وأوراق الشجر الميتة وليف النخيل والجذور الدقيقة الممزوجة بخيوط العنكبوت، وهو مبطن بالأعشاب والجذور الدقيقة والشعر، ويوضع على ارتفاع يصل إلى 2 - 4 م فوق سطح الأرض (وأحياناً يصل ارتفاعه إلى 8 م) في شجرة، أو شجيرة، أو على مبنى أحياناً. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 12 - 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة أو ثلاثية.

أدرج هذا البلبل ضمن ثلاثة

من أشد أنواع الطيور اجتياحاً


(غازي) في العالم، وقد رُصد

للمرة الأولى عام 1993

بالقرب من الرياض بالمملكة.

يُذكر أن أعداده آخذة في

التزايد بصورة مطردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 500**منطقة النشاط: الظهران**

نساخ مخطط	الاسم العربي:
تبشر مخطط	الاسم العربي الآخر:
<i>Ploceus manyar</i>	الاسم العلمي:
Streaked Weaver	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
مستقر	المنحى العالمي للمجموعة:
–	حالة الحماية الإقليمية:
–	المنحى الإقليمي للمجموعة:
15 سم / 16 - 22 غم	الحجم والوزن:




ذكر نساخ مخطط



أعشاش لطيور نساخ مخطط

النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال ضمن نطاق يمتد من باكستان حتى فيتنام وبالي. وقد أُدخِل إلى أجزاء مختلفة من العالم، بما فيها شبه الجزيرة العربية، حيث يوجد في جميع بلدانها باستثناء اليمن، مع تسجيل أكبر تعداد له في الإمارات العربية المتحدة (أقل من 100 زوج). **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. تم تسجيل هذا النوع الدخيل للمرة الأولى في عام 1989 بالقطيف والظهران والرياض في المملكة. وليس من الواضح ما إذا كان قد أسس مجموعة تكاثر مستدامة. **الموئل:** المراعي والحقول المزروعة بالقرب من الأراضي الرطبة، مثل البحيرات والمستنقعات وقنوات مياه الصرف الصحي. وجميع المواقع التي تشمل حقول القصب. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يقوم بشكل أساسي على البذور. في حين يتم تغذية الفراخ باللافقاريات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي، وعادة ما يوجد في مجموعات تتكون من 15 طائراً. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مجتمعات صغيرة متفرقة. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن منطقة السيادة، ويبنى هيكل العش الرئيس، ثم يغزد لجذب الأنثى. تساعد الأنثى على إكمال العش وتقوم بمعظم مسؤوليات حضن البيض. كما يتشارك الطائران البالغان في رعاية الصغار. **العش:** على شكل قبة مستطيلة تشبه «إناء تقطير معوج» تُشيد من شرائح أوراق القصب الخضراء مع الطين الملتصق على جانبي المدخل المواجه للأسفل، ومنسوجة حول سيقان القصب المستقيمة في بركة من القصب. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 14 - 17 يوماً. **مدة التعشيش:** 17 - 18 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 15
منطقة النشاط: وادي حنيفة




ماينا ضفافية	الاسم العربي:
<i>Acridotheres ginginianus</i>	الاسم العلمي:
Bank Myna	الاسم الشائع:
غير مهدد	حالة الحماية العالمية:
يتزايد	المنحى العالمي للمجموعة:
–	حالة الحماية الإقليمية:
–	المنحى الإقليمي للمجموعة:
22 سم / 64 - 76 غم	الحجم والوزن:



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال ضمن نطاق يمتد من باكستان حتى بنغلاديش. وأُدخِل إلى شبه الجزيرة العربية بوصفه من طيور الزينة، غير أن الطيور الهاربة أسست مجموعات تكاثر هائلة (وحشية)، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعداد أصغر في المملكة وسلطنة عُمان والكويت. وربما أيضاً في البحرين وقطر. **حاليته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر جداً. تم تسجيل تعدادات صغيرة من هذا الطائر بالقرب من الظهران والرياض، لكن من غير الواضح ما إذا كان ثمة أعداد منه قابلة للاستمرار في أي من الموقعين. **الموئل:** المناطق المفتوحة ذات الأشجار، بما في ذلك المتنزهات والحدائق والمشاتل والأراضي المزروعة بالمحاصيل وحقول الرش وقنوات الري، خاصة المناطق الزراعية الحافلة بالأبار التقليدية. وفي الوقت الذي يكثر وجوده من البشر، يندر ما يكون بعيداً عن المياه. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: الحشرات وغيرها من اللافقاريات، فضلاً عن بعض أنواع الفقاريات الصغيرة، والفاكهة والبذور وبقايا طعام الإنسان. يبحث هذا الطائر بشكل أساسي عن الغذاء على الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يبحث عن الغذاء في أسراب صغيرة تتكون من 5 - 10 طيور.

بيع هذا النوع من الطيور الغربية باعتباره من طيور الزينة لعقود في أسواق الخليج العربي، وسُجلت تعدادات متكاثرة هاربة منه للمرة الأولى في الظهران بالمملكة في عام 1984.

تقع في نهاية نفق أفقي أو مائل للأعلى قليلاً - عادة ما يكون طوله أقل من متر واحد - يعتمد الطائر إلى حفرة في صفة ترابية، أو بئر، أو قناة، أو خندق. وغالباً ما يستخدم الموقع نفسه لسنوات عدة. **البيض المحضون:** 4 - 5 بيوض. **الحضانة:** 13 - 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 20 - 21 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 15
منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)



شمعي المنقار الأحمر

الاسم العربي:
مونيا حمراء
الاسم العلمي:
Amandava amandava
الاسم الشائع:
Red Avadavat
حالة الحماية العالمية:
غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:
مستقر
حالة الحماية الإقليمية:
-
المنحى الإقليمي للمجموعة:
-
الحجم والوزن:
9.5 سم / 7.2 - 9.5 غم




النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد ضمن نطاق يمتد من باكستان حتى إندونيسيا. يُعدُّ من طيور الزينة المشهورة، وقد تم إدخاله إلى أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر نادر. تم توثيق هذا الطائر الأحمر الصغير للمرة الأولى بوصفه مقيماً متكاثراً وحشياً في عام 1975 بالرياض، ومنذ ذلك الحين تأسس تعداد وحشي صغير بالقرب من العاصمة، لا سيما حول نهر الرياض (مجرى وادي الحائر).

الموئل: بالقرب من المياه العذبة، أو المالحة في حقول القصب والأعشاب الطويلة والمحاصيل، أو غيرها من النباتات الكثيفة. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يقوم بشكل أساسي على بذور الأعشاب وفي بعض الأحيان الحشرات، بما في ذلك النمل الأبيض. وهو يتعلق بسيقان الأعشاب لالتقاط البذور، أو يلتقطها مباشرة من الأرض. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** اجتماعي، يبحث عن الغذاء في مجموعات متنقلة صغيرة على مدار السنة. ويجثم في تجمعات ضمن حقول القصب. وقد تشكّل أسراباً مختلطة مع العصافير

تم توثيق مشاهدة هذا الطائر الجذاب للمرة الأولى في عام 1975 بالرياض، حيث لا يزال يوجد تعداد صغير منه يتكاثر بشكل هائل (وحشي).

في فصل الشتاء. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: أزواج متكاثر أحادية الزواج اجتماعياً تعيش في مستعمرات صغيرة. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا الطائرين البالغين في بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل قبة مصنوعة من العشب والقصب مع مدخل جانبي، مبطن بزغب النبات وغيرها من المواد الدقيقة، وتوضع على ارتفاع أقل من متر واحد فوق سطح الأرض، أو الماء فُعلقاً بعشبة المياه أو سيقان القصب. **البيض المحضون:** 4 - 6 بيوض. **الحضانة:** 11 - 13 يوماً. **مدة التعشيش:** 17 - 21 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة في بعض الأحيان.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 300

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

نساج كستنائي

الاسم العربي:
تيشر بايا
الاسم العلمي:
Ploceus philippinus
الاسم الشائع:
Baya Weaver
حالة الحماية العالمية:
غير مهدد
المنحى العالمي للمجموعة:
مستقر
حالة الحماية الإقليمية:
-
المنحى الإقليمي للمجموعة:
-
الحجم والوزن:
15 سم / 18 - 28 غم



بناء العش


النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد بطبيعة الحال ضمن نطاق يمتد من باكستان حتى سومطرة. وتم إدخاله إلى شبه الجزيرة العربية، وهكذا يوجد في المملكة والإمارات العربية المتحدة. كما تم تسجيل وجوده في البحرين وسلطنة عُمان وقطر. وجميع السجلات الأولية من المُرجح أن تكون لطيور أسيرة هاربة. **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شديد الندرة. ثمة مشاهدات متكررة لهذا الطائر الغريب في المملكة. وقد تكاثر نحو 4 - 5 أزواج بالقرب من الرياض، وربما يكون قد أسس مجموعته وتكاثر بشكل هائل (وحشي)، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التعداد قائماً بذاته أم لا. **الموئل:** حقول القصب. **سلوك البحث عن الغذاء:** النظام الغذائي: يقوم بشكل رئيس على البذور، وكذلك بعض أنواع اللافقاريات. **النشاط:** نهاري. **السلوك الاجتماعي:** طائر اجتماعي، وعادةً ما يوجد في مجموعات تتكون من 15 طائراً. **سلوك التكاثر:** نظام التزاوج: متعدد الزوجات ضمن مجموعته، حيث تعشش الذكور مع 3 - 5 إناث في مجموعات صغيرة. **الأدوار الأبوية:** يدافع الذكر عن منطقة السيادة، وبينه هيكل العش الرئيس، ثم يغزّد لجذب الأنثى. تساعد الأنثى في بناء العش، وتتولى حضن البيض. كما يتشارك الطائران البالغان في رعاية الصغار. **العش:** على شكل قبة مستطيلة تشبه «إناء تقطير معوج» مع مدخل أنبوبي عمودي طويل عند القاعدة، تُبنى من شرائح منسوجة بإحكام من الأوراق، معززة بالطين، ومبطنه أساساً بألياف نباتية ومعلقة في فرع، أو ساق قصب على ارتفاع 2 - 30 م فوق سطح الأرض، أو الماء في شجرة، أو حقل قصب. **البيض المحضون:** 3 بيوض. **الحضانة:** 14 - 15 يوماً. **مدة التعشيش:** 16 يوماً. **الحضنة:** حضنة مفردة.

غالباً ما يتم الاحتفاظ بهذا الطائر الغريب بوصفه طائر زينة، وقد تم توثيق مشاهدته للمرة الأولى في عام 1989، بالقرب من الرياض. ربما يكون هنالك ثمة تعداد تكاثر وحشي ضئيل جداً في العاصمة.

المنحى الإقليمي للمجموعة:
حالة الحماية الإقليمية:
المنحى العالمي للمجموعة:
حالة الحماية العالمية:
الاسم الشائع:
الاسم العلمي:
الاسم العربي الآخر:
الاسم العربي:



ذكر نساج كستنائي



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثر سنوياً: 10

منطقة النشاط: وادي حنيقة

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مونيا محرشفة صدر*Lonchura punctulata*

Scaly-breasted Munia

غير مهدد

مستقر

-

-

10 - 13 سم / 12 - 16 غم

الاسم العربي:

الاسم العلمي:

الاسم الشائع:

حالة الحماية العالمية:

المنحى العالمي للمجموعة:

حالة الحماية الإقليمية:

المنحى الإقليمي للمجموعة:

الحجم والوزن:

تساج مخطط في منطقة نهر الرياض (مجرى وادي الحائر). تم العثور على جميع الطيور المتكاثرة منه في موائل معدلة بشكل كبير، خاصة في مدن وبلدات المملكة العربية السعودية.



النطاق العالمي: مقيم؛ يوجد ضمن نطاق يمتد من شمال باكستان شرقاً حتى جنوب الصين وجنوباً حتى إندونيسيا والفلبين. تم إدخال هذا الطائر الشهير في أماكن عديدة حول العالم، وهو غالباً ما يشكّل تعدادات تكاثر هائلة (وحشية). **حالته بالمملكة:** مقيم متكاثر شديد الندرة. سُجّل هذا الطائر بلون الشوكولاتة للمرة الأولى بوصفه طائراً هارياً في الظهران عام 1982. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيله في الرياض وجدة والطائف. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الطيور الهاربة في المملكة قد عمدت إلى تشكيل مجموعات متكاثرة (وحشية) مستدامة، أو إذا كان هذا التعداد ينمو

عن طريق تعريجات من طيور أخرى هاربة منتظمة. **الموائل:** متنزهات الزينة والحدائق والمناطق الطبيعية في المدن والبلدات. **سلوك البحث عن الغذاء: النظام الغذائي:** يقوم بشكل أساسي بذور الأعشاب والأوراق الخضراء، إلى جانب عدد قليل من ثمار التوت وربما في بعض الأحيان الحشرات. وهو يربى عن طريق التقاط

البذور من الأرض، أو النباتات مباشرة. **النشاط:**

نهاري. **السلوك الاجتماعي:** يوجد في

أسراب تضم 10 طيور بحد أقصى. **سلوك**


التكاثر: نظام التزاوج: أزواج متكاثرة أحادية

الزواج اجتماعياً تعيش في مجموعات.

وعادةً ما تبعد الأعشاش عن بعضها بعضاً

مسافة 1 - 2 م. **الأدوار الأبوية:** يتشارك كلا

الطائرين البالغين في بناء العش وحضن البيض ورعاية الفراخ. **العش:** على شكل كرة دائرية مصنوعة من العشب ورؤوس الأعشاب المزهرة، مبنية بمدخل جانبي منخفض، ومبطنة بالعشب الناعم وموضوعة في مكان مخفي جيداً بين العشب، أو على ارتفاع 4 - 10 م، أو أكثر فوق سطح الأرض في شجيرة، أو شجرة ما. **البيض المحضون:** 3 - 6 بيوض. **الحضانة:** 14 يوماً. **مدة التعشيش:** 18 - 19 يوماً. **الحضنة:** حضنة مزدوجة.



مقيم متكاثر

الأزواج المتكاثرة سنوياً: 5

منطقة النشاط: نهر الرياض (مجرى وادي الحائر)

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

الفصل الثالث

أنواع الطيور الشاردة



الطائر الشارد هو طائر يُعثر عليه خارج نطاق وجوده الطبيعي والمألوف. ولأغراض هذا الكتاب، يُعرّف الطائر بأنه شارد في المملكة إن كان لديه أقل من عشر سجلات موثّقة داخل المملكة العربية السعودية، وقد يتألف كل سجل من طائر واحد، أو مجموعة من الطيور، بغض النظر عن مدة بقاء هذه الطيور في مكان واحد. وباتباع هذا النهج، فقد تم تسجيل 87 نوعاً شارداً بشكل معقول في المملكة.

علاوةً على ذلك، يتناول هذا القسم قائمة تفصيلية بهذه الأنواع الشاردة، ونظراً لندرتها الشديدة، فقد تعذّر تصوير الكثير منها بشكلٍ جيد. لهذا السبب؛ لم يتم تضمين سوى عدد قليل من الصور في هذا القسم، مع التنويه بأن جميع الصور المستخدمة في هذا القسم التَّقَطت في المملكة، ولا تتضمن القائمة ببساطة سجلات لأيّ طيور هاربة من الأسر، أو مجموعات خاصة.

يُذكر أن الأنواع الشاردة في معظمها هي من الطيور المهاجرة التي تجاوزت وجهتها المقصودة، أو أصابها الارتباك، أو انحرفت عن مسارها بفعل الظروف المناخية غير العادية. وفي بعض الأحيان، تعاني بعض أفراد الطيور من خلل أثناء موسم الهجرة؛ إذ ما تلبث وأن تجد نفسها في موقع مخالف لخط سير هجرتها الصحيح، وبالتالي تجد نفسها في مكان غير متوقع البتة (دياموند 1982؛ ثورب وآخرون 2012). وعليه، يُصنّف نحو 87% (العدد= 76) من الأنواع الشاردة في المملكة بكونها أنواعاً مهاجرة، أو مهاجرة جزئياً. أما نسبة 13% (العدد= 11) المتبقية من الأنواع الشاردة، فيتم تصنيفها من الأنواع المقيمة (أيّ غير المهاجرة) التي يمكن أن تكون قد تجولت بعيداً عن نطاق وجودها الأصلي، ربما بحثاً عن فرص تكاثر جديدة، أو موارد أفضل، أو لأنها ضلّت طريقها.

وعند الأخذ بالاعتبار المسافات الشاسعة والطرق المعقدة التي تقطعها عديد من الأنواع المهاجرة، فإنه لا يسعنا سوى الاندهاش من حقيقة أن جزءاً صغيراً جداً فقط من كل تعداد ينتهي به المطاف خارج نطاق وجوده الطبيعي. وهو أمر مذهل على نحو خاص. ولما كانت الطيور المقتدرة على الطيران لمعظم الأنواع المهاجرة تقوم بهجرتها الأولى إلى أراضيها الشتوية عادةً من دون توجيه أبويها، فإنها تسلك بطريقة ما مساراً فطرياً محددأ مسبقاً بصفة وراثية لآلاف الكيلومترات، وتصل إلى وجهتها بدقة متناهية.

على نحو متصل، تُعزى أهمية هذه الأنواع الشاردة لجلبها مجموعة أكبر من الطيور إلى المملكة، الأمر الذي لم يكن ليذر في أذهان مراقبي الطيور رؤيتها. فعلى سبيل المثال، تتكاثر طيور النورس الأرمِل (نورس كيتيويك) في المناطق القطبية الشمالية الشرقية من سيبيريا، وأميركا الشمالية، وجرينلاند، وأيسلندا، بينما تقضي الشتاء في البحر قبالة سواحل أميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا، ومع ذلك تم تسجيل أحد طيوره في صحراء الربع الخالي. ففي حين أن مصير الطيور الشاردة الفردية غير معروف جيداً (يُفترض أن بعضها ينجم في العودة إلى نطاق وجوده الطبيعي، والبعض الآخر لا يفعل)، فقد تتوسع في نطاقها، أو تظهر تعدادات متكاثرة أو أخرى جديدة لقضاء الشتاء؛ نتيجة لإنشاء حفنة من هذه الطيور المهاجرة مجتمعات غير المقصودة (مثال على ذلك، الحالات الموثقة حول طائر هازجة مقلنسة أوراسية (أبو قلنسوة)؛ بيرثولد وآخرون 1992).

من جهة أخرى، يمكن القول إن بعض الأنواع الشاردة المسجلة في المملكة هي مصدر قلق بالنسبة لحالة حمايتها، ويشمل ذلك أربعة أنواع شبه مهددة بالانقراض، ونوعين معرضين لخطر الانقراض، ونوعين مهددين بالانقراض، ونوعين مهددين بالانقراض بشكل حرج .

وبحكم تعريفها، تكون الأنواع الشاردة نادرةً إلى حدٍ بعيد، وبالتالي يجب على مراقبي الطيور والمصورين أصحاب الخبرة التواجد في المكان والزمان المناسبين لتحديدها بدقة، والإبلاغ عن أيّ مشاهدات غير مألوفة. وعلى الرغم من العدد الصغير نسبياً من مراقبي الطيور النهمين، إلا أنه لُوحظ تسجيل عديد من الأنواع الشاردة في المملكة. ومما لا شك فيه، أنه سيتم تسجيل الكثير من الطيور الشاردة في المملكة مستقبلاً. والأكثر من ذلك قد يتم رفع تصنيف الكثير منها إلى «أنواع منتظمة» بمزيدٍ من المشاهدات وتوثيقها.

1. **البط المصفر** | *Dendrocygna bicolor* | Fulvous Whistling-duck
الحجم: 45- 53 سم.**حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في أميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند حتى ميانمار. **مواطن تسجيله في المملكة:** بحيرة ملاكي.

2. **صافرة صغيرة** | *Dendrocygna javanica* | Lesser Whistling-duck
الحجم: 38 - 42 سم.**حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ تتواجد التعدادات المقيمة منه في باكستان شرقاً حتى الساحل الصيني وجنوب شرق آسيا حتى إندونيسيا، وتهبط تعداداته المتواجدة في باكستان وشرق الصين جنوباً لقضاء فصل الشتاء. **مواطن تسجيله في المملكة:** بحيرة ملاكي.

3. **بط أبيض الرأس** | *Oxyura leucocephala* | White-headed Duck
الحجم: 43 - 48 سم. **حالة الحماية العالمية:** مهدد بالانقراض. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ تتواجد التعدادات المقيمة منه في مناطق متفرقة من شبه الجزيرة الأيبيرية حتى أفغانستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من شرق تركيا حتى غرب منغوليا، بينما يشثي في الأناضول ومنطقة بحر قزوين والعراق وإيران وباكستان، وربما يقضي فصل الشتاء بطول ساحل البحر الأحمر السعودي في بعض السنوات. **مواطن تسجيله في المملكة:** الجوف، ينبع.

4. **تم بويكي** | *Cygnus columbianus* | Tundra Swan
الحجم: 120 - 150 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في مواطن القارة الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء في المناطق المعتدلة الشمالية. **مواطن تسجيله في المملكة:** الجوف، سبخة الفصل، تبوك.

5. **بلقشة بيضاء** | *Mergellus albellus* | Smew
الحجم: 35 - 44 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء في مناطق متفرقة من أنحاء أوروبا وجنوب آسيا، باتجاه الجنوب إلى العراق، والشرق إلى الصين واليابان. **مواطن تسجيله في المملكة: الرياض.**

6. **مقششة حمراء صدر** | *Mergus serrato* | Red-breasted Merganser
الحجم: 52 - 58 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في جميع أنحاء القارة الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء بشكل رئيس على طول السواحل شمال المناطق المدارية. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، رأس تناقيب.

7. **إوزة مصرية** | *Alopochen aegyptiaca* | Egyptian Goose
الحجم: 63 - 73 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنها شرقاً إلى ساحل البحر الأحمر في الصومال والسودان. تم إدخال هذا الطائر بوصفه طائر زينة في عديد من الأماكن على مستوى العالم، منها الإمارات العربية المتحدة، حيث يتكاثر الآن. وتعداده في شبه الجزيرة العربية قيد التوسع، وقد يستعمر المملكة في المستقبل القريب. **مواطن تسجيله في المملكة:** جدة، الجبيل، ينبع.

8. **حذف قطني** | *Nettapus coromandelianus* | Cotton Pygmy-goose
الحجم: 30 - 38 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال باكستان، وشرقاً إلى جنوب شرق آسيا وشرق أستراليا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب الصين، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الرياض.



تم إدخال الإوزة المصرية إلى البحيرات الاصطناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها طيور زينة. وقد تم رصد أفراداً من هذا الطائر في المملكة العربية السعودية.



دجاجة ماء صدراء في سبخة الفصل. عادةً ما يقضي هذا الطائر فصل الشتاء في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، لكن نادراً ما يتم رصده في المملكة العربية السعودية.

9. **حذف مخطط** | *Marbled Teal* | *Marmaronetta angustirostris*

الحجم: 39 - 48 سم. **حالة الحماية العالمية:** معرض للانقراض. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مناطق متفرقة من شمال أفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية والأردن والعراق وإيران، وشرقاً إلى باكستان، أما التعدادات المهاجرة فتقضي فصل الشتاء في وادي النيل، وشرقاً إلى إيران وباكستان والهند. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الرياض.

10. **غطاس أحمر الرقبة** | *Podiceps grisegena* | Red-necked Grebe

الحجم: 40 - 50سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في مناطق خطوط العرض الوسطى والعليا في جميع أنحاء المنطقة القطبية، بينما يقضي فصل الشتاء بشكل رئيس في المناطق الساحلية الشمالية المعتدلة. **موطن تسجيله في المملكة:** الخُبر، شاطئ نصف القمر، الجبيل.

11. **قمري شرقي** | *Streptopelia orientalis* | Oriental Turtle-dove

الحجم: 33 - 35 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الهند، وشرقاً إلى الصين وجنوب اليابان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق كازاخستان عبر جنوب سيبيريا إلى شمال اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران، الرياض، الظلوف، الخليج العربي (إلى الشرق من الخفجي).

12. **سمامة بيضاء العجز** | *Apus caffer* | White-rumped Swift

الحجم: 14سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في مستعمرات معزولة في شمال غرب أفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية وجنوب أفريقيا، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **موطن تسجيله في المملكة:** كباد.

13. **دجاجة ماء صدراء** | *Amaurornis phoenicurus* | White-breasted Waterhen

الحجم: 28 - 33 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في باكستان، وشرقاً إلى جنوب الصين واليابان وجنوباً إلى إندونيسيا والفلبين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في الصين، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته، في حين أن بعض التعدادات (من المفترض أنه من الهند) فإنها تقضي فصل الشتاء في جنوب شرق الجزيرة العربية. **موطن تسجيله في المملكة:** سبخة الفصل.

14. **غراء حمرة منقار** | *Fulica cristata* | Red-knobbed Coot

الحجم: 35 - 42 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في شرق وجنوب أفريقيا، من إريتريا حتى جنوب أفريقيا مع بعض الطيور التي تتجول حتى تصل شبه الجزيرة العربية، وسُجِّل تكاثره في سلطنة عُمان. **موطن تسجيله في المملكة:** سبخة الفصل.

15. **الجبارة الصغيرة** | *Tetrax tetrax* | Little Bustard

الحجم: 40 - 45 سم. **حالة الحماية العالمية:** شبه مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في مناطق متفرقة من البرتغال والمغرب شرقاً إلى إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في إسبانيا، ومن أوكرانيا شرقاً إلى غرب الصين، بينما يقضي فصل الشتاء في تركيا شرقاً إلى باكستان وجنوباً إلى الأردن. **موطن تسجيله في المملكة:** دومة الجندل، أمّج.

16. **الجبارة الكبيرة** | *Otis tarda* | Great Bustard

الحجم: 90 - 105 سم. **حالة الحماية العالمية:** معرض للانقراض. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في المغرب وفي مناطق متفرقة من البرتغال وألمانيا شرقاً إلى إيران، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في مناطق متفرقة من أوكرانيا شرقاً إلى شمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء من اليونان إلى شرق الصين. **موطن تسجيله في المملكة:** قرية العليا.

17. **جلم فارسي** | *Puffinus persicus* | Persian Shearwater

الحجم: 27 - 33سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مشتت؛ يتكاثر

في جزر سقطرى (اليمن) وجزيرة كوربا موريبا (جنوب سلطنة عُمان) وجزر القمر قبالة سواحل شرق أفريقيا، ويبحث عن الغذاء بشكل رئيس قبالة سواحل بحر العرب والمحيط الهندي الغربي، ويتجول أحياناً في البحر الأحمر والخليج العربي، ولكون ما يزيد على 98% من تعداده المتكاثر محصور في الجزر الواقعة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية، فإن هذا النوع شبه متوطن في المنطقة، ومع ذلك يظل شارداً في المياه الإقليمية السعودية. **موطن تسجيله في المملكة:** جازان.

18. **النوء الجوانيني** | *Bulweria fallax* | Jouanin’s Petrel

الحجم: 30 - 32 سم. **حالة الحماية العالمية:** شبه مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مشتت؛ يتكاثر في سقطرى (اليمن)، وربما في جزر أخرى قبالة سواحل جنوب شبه الجزيرة العربية، وهو يبحث عن الغذاء في غرب المحيط الهندي ويدخل أحياناً مياه البحر الأحمر والخليج العربي، ولكون ما يزيد على 98% من تعداده المتكاثر محصور في الجزر الواقعة قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية، فإن هذا النوع شبه متوطن في المنطقة، ومع ذلك يظل شارداً في المياه الإقليمية السعودية. **موطن تسجيله في المملكة:** جزر فُرسان.

19. **أبو منجل الأثيوبوي** | *Threskiornis aethiopicus* | African Sacred Ibis

الحجم: 65 - 89 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويتجول أحياناً عبر البحر الأحمر في المملكة. ويوجد تعداد متبقي في جنوب العراق وغرب إيران. **موطن تسجيله في المملكة:** الخبر، الظهران، جدة، الرياض.

20. **الواق الأصفر** | *Ixobrychus sinensis* | Yellow Bittern

الحجم: 30 - 40 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ تتواجد التعدادات المقيمة منه في جنوب شرق آسيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في صلالة (سلطنة عُمان) وباكستان وشمال الهند حتى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء في غرب الهند وجنوب شرق آسيا إلى غينيا الجديدة. **موطن تسجيله في المملكة:** جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

21. **فرقاط صغير** | *Fregata ariel* | Lesser Frigatebird

الحجم: 66 - 81 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مشتت؛ يتكاثر في الجزر الاستوائية، خاصة في المحيط الهندي والمحيط الهادئ، ويبحث عن الغذاء في المياه المحيطة. **موطن تسجيله في المملكة:** الليث.

22. **الأطيش المبرقع** | *Sula dactylatra* | Masked Booby

الحجم: 81 - 92 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مشتت؛ يتكاثر على الجزر الاستوائية، بما فيها تلك الموجودة قبالة جنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب البحر الأحمر، ويبحث عن الغذاء في جميع أنحاء المحيطات المدارية، وهو يتجول أحياناً في البحر الأحمر والخليج العربي. **موطن تسجيله في المملكة:** جزيرة كدمبل (بالقرب من الشقيق).

23. **الكروان السنغالي** | *Burhinus senegalensis* | Senegal Thick-knee

الحجم: 32 - 38 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في أفريقيا في جميع أنحاء منطقة الساحل الأفريقي ووادي النيل وعلى طول الساحل المصري شمال غرب البحر الأحمر. **موطن تسجيله في المملكة:** وادي مشرف (بالقرب من بحيرة ملاكي).

24. **زقزاق كتلتزي** | *Charadrius pecuarius* | Kittlitz’s Plover

الحجم: 12 - 14 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في مناطق متفرقة من معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووادي النيل وساحل البحر الأحمر الأفريقي. **موطن تسجيله في المملكة:** الشقيق.

25. **يقنة تدرجية الذيل** | *Hydrophasianus chirurgus* | Pheasant-tailed Jacana

الحجم: 39 - 58 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً توجد التعدادات المقيمة منه في باكستان باتجاه الشرق عبر جنوب شرق آسيا والفلبين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جبال الهيمالايا والصين، بينما يقضي فصل الشتاء في سلطنة عُمان والهند وشبه جزيرة ماليزيا وإندونيسيا. **موطن تسجيله في المملكة:** الرياض.

26. **الدرجة الحمراء** | *Calidris canutus* | Red Knot

الحجم: 23 - 25 سم. **حالة الحماية العالمية:** شبه مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في المنطقة القطبية الشمالية العليا بشرق أوراسيا وأميركا الشمالية وغرينلاند، بينما يقضي فصل الشتاء على طول السواحل في المحيطات المعتدلة والمدارية والجنوبية. **مواطن تسجيله في المملكة:** الدمام، الهدا، القطيف.

27. **طيטوي صبعاا** | *Calidris subminuta* | Long-toed Stint

الحجم: 13 - 16 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في مناطق متفرقة من وسط آسيا حتى شرق مضيق بيرينغ، بينما يقضي فصل الشتاء في شرق الهند حتى جنوب أستراليا. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الظهران، الرياض.

28. **طيטوي برتقالية الصدر** | *Calidris subruficollis* | Buff-breasted Sandpiper

الحجم: 18 - 20 سم. **حالة الحماية العالمية:** شبه مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في منطقة القطب الشمالي العليا لشرق سيبيريا وأميركا الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء بشكل رئيس في أميركا الجنوبية. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الظهران.

29. **طيטوي نبطاء** | *Calidris melanotos* | Pectoral Sandpiper

الحجم: 19 - 23 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في منطقة القطب الشمالي العليا في سيبيريا وأميركا الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء في أميركا الجنوبية وأستراليا. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، القطيف.

30. **شنقب منفرد** | *Gallinago solitaria* | Solitary Snipe

الحجم: 29 - 31سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال الصين ومنغوليا وجنوب شرق روسيا؛ في حين تقضي التعدادات المهاجرة فصل الشتاء في مناطق متفرقة من كازاخستان وشمال الهند حتى جنوب الصين واليابان. **مواطن تسجيله في المملكة:** الرياض.

31. **شنقب إبري الذنب** | *Gallinago stenura* | Pintail Snipe

الحجم: 25 - 27 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال روسيا الوسطى حتى شرق سيبيريا وجنوباً حتى منغوليا؛ ويقضي فصل الشتاء في شبه الجزيرة الهندية وجنوب شرق آسيا. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الظهران، سبخة الفصل، شذقم.

32. **فلرب أرمد** | *Phalaropus fulicarius* | Red Phalarope

الحجم: 20 - 22 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في منطقة القطب الشمالي العليا في شرق سيبيريا وأميركا الشمالية حتى غرينلاند وأيسلندا، بينما يقضي فصل الشتاء في البحر قبالة سواحل أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا. **مواطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الرياض، الربع الخالي، ينبع.

33. **نورس صغير** | *Hydrocoloeus minutus* | Little Gull

الحجم: 25 - 30سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية حتى شرق سيبيريا، بينما يقضي فصل الشتاء في المناطق الساحلية حول حوض البحر المتوسط وأوروبا الغربية. **مواطن تسجيله في المملكة:** الخفجي، الرياض.

34. **نورس كيتيويك** | *Rissa tridactyla* | Black-legged Kittiwake

الحجم: 38 - 40 سم. **حالة الحماية العالمية:** معرض للانقراض. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مشنت؛ يتكاثر في شمال أوراسيا الساحلية وأميركا الشمالية ، ويتغذى بشكل رئيس في المحيطات الشمالية. **مواطن تسجيله في المملكة:** الليث.

35. **نورس أرمد الرأس** | *Larus cirrocephalus* | Grey-headed Gull

الحجم: 38 - 45 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مشنت؛

يتكاثر على السواحل وفي أودية الأنهار بأميركا الجنوبية وفي أفريقيا جنوباً من إثيوبيا، بينما يقضي فصل الشتاء بشكل رئيس في شرق أميركا الجنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. **مواطن تسجيله في المملكة:** القطيف.

36. **نورس متوسطي** | *Larus melanocephalus* | Mediterranean Gull

الحجم: 36 - 38 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر بمناطق متفرقة في جميع أنحاء وسط وجنوب أوروبا باتجاه الشرق إلى بحر قزوين، بينما يقضي فصل الشتاء في المناطق الساحلية، بشكل رئيس البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. **مواطن تسجيله في المملكة:** شاطئ نصف القمر، الرياض.

37. **نورس أصفر الساق** | *Larus michahellis* | Yellow-legged Gull

الحجم: 52 - 58 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مقيم ومشتت؛ يوجد بشكل أساس في المناطق الساحلية شمال غرب أفريقيا وشبه الجزيرة الأيبيرية والبحر الأبيض المتوسط، ويبحث عن الغذاء في المياه المحيطة. **مواطن تسجيله في المملكة:** ينبع.

38. **خرشنة سخماء** | *Onychoprion fuscatus* | Sooty Tern

الحجم: 36 - 45 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مشنتت؛ يتكاثر على الجزر الاستوائية وشبه الاستوائية، بما فيها الجزر في خليج عدن وقبالة شمال سلطنة عُمان، بينما يقضي فصل الشتاء في المحيطات المدارية وشبه المدارية. **مواطن تسجيله في المملكة:** جدة.

39. **خرشنة وردة** | *Sterna dougallii* | Roseate Tern

الحجم: 33 - 43 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مقيم ومشتت؛ يتكاثر على الجزر والسواحل في جميع أنحاء المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، بما في ذلك سلطنة عُمان، بينما يقضي فصل الشتاء قبالة أميركا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وشمال أستراليا. **مواطن تسجيله في المملكة:** جزيرة کران.

40. **كركر ذنوب** | *Stercorarius longicaudus* | Long-tailed Jaeger

الحجم: 48 - 53سم (بما يشمل الأشرطة الذيلية). **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في المناطق الساحلية فوق الدائرة القطبية الشمالية، بينما يقضي فصل الشتاء في مياه القطب الجنوبي والمناطق المتاخمة. **مواطن تسجيله في المملكة:** جزيرة کران.

41. **بومة أذناء** | *Asio otus* | Northern Long-eared Owl

الحجم: 35 - 38 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشمال أفريقيا، باتجاه الشرق حتى اليابان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في كندا وشبه الجزيرة الإسكندنافية حتى سيبيريا، بينما يقضي فصل الشتاء في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومن بحر قزوين شرقاً إلى جنوب الصين. **مواطن تسجيله في المملكة:** الزلفي، رأس تناقيب، شرمة.

42. **نسر روبلي** | *Gyps rueppelli* | Rüppell's Vulture

الحجم: 101 سم. **حالة الحماية العالمية:** مهدد بالانقراض بشكل حرج. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في منطقة الساحل الأفريقي ومعظم أنحاء منطقة شرق أفريقيا. وربما يتجول من حين لآخر عبر البحر الأحمر، وقد يتكاثر في المملكة بأعداد منخفضة للغاية. يشبه هذا الطائر النسر الأسمر، لذلك ربما أهمل تسجيله في الماضي. **مواطن تسجيله في المملكة:** تنومة.

43. **عقاب رقطاع صغرى** | *Clanga pomarina* | Lesser Spotted Eagle

الحجم: 56 - 67 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في أوروبا الشرقية وغرب روسيا وبلاد القوقاز، بينما يقضي فصل الشتاء في جنوب أفريقيا المدارية والجنوبية. **مواطن تسجيله في المملكة:** حرض، المدينة المنورة، قرية العليا، سبخة الفصل، وادي نسام، ينبع.

44. **عقاب السمك بالآسية** | *Haliaeetus leucoryphus* | Pallas's Fish-eagle

الحجم: 72 - 84 سم. **حالة الحماية العالمية:** مهدد بالانقراض. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:**



بومة أذناء في الزلفي توجد على بُعد 2,000 كم تقريباً عن نطاقها الطبيعي.



نسر روبلي. رُصد هذا الطائر المهدد بالانقراض بشكل حرج، فوق جبل عسير في تنومة، وكان هذا الرصد الوحيد لهذا الطائر الضخم.



الشنقب إبري الذنب يبحث عن الغذاء في سبخة الفصل. عادةً ما يقضي هذا الطائر فصل الشتاء في الهند وجنوب شرق آسيا، لكن تم رصده أربع مرات في المملكة العربية السعودية.



صرد ذنوب، تم رصده مرة واحدة في المملكة العربية السعودية، حيث التُقِطت هذه الصورة له في منطقة الظهران لتأكيد وتوثيق ظهوره.



عادة ما تقضي القُفْرة الغابية فصل الشتاء في المنطقة المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، لكن تم التقاط صورة لهذا الطائر في الصرّار، بالمنطقة الشرقية.

مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في باكستان حتى ميانمار، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في كازاخستان حتى شمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **موطن تسجيله في المملكة:** بحيرة ملاكي.

45. **عقاب البحر أبيض الذيل** | *Haliaeetus albicilla* | White-tailed Sea-eagle

الحجم: 69 - 92 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب غرينلاند وشمال أوروبا وشرق روسيا، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أوراسيا، بينما يقضي فصل الشتاء في مناطق متفرقة من جنوب أوروبا شرقاً عبر فلسطين والعراق وإيران وشرقاً حتى اليابان. **موطن تسجيله في المملكة:** الخبر، القطيف.

46. **صقر اليونوري** | *Falco eleonora* | Eleonora’s Falcon

الحجم: 36 - 42 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في الجزر الواقعة قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا وحوض البحر المتوسط حتى قبرص، بينما يقضي فصل الشتاء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما مدغشقر. **موطن تسجيله في المملكة:** الجبيل، مدين، وسبق لطائر مُحجّل من كينيا دخول المملكة من شمال ينبع، حيث سافر من شرق تبوك إلى الأردن، ومنها إلى قبرص.

47. **صرد كميت ظهر** | *Lanius vittatus* | Bay-backed Shrike

الحجم: 17 - 19 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شرق إيران وأفغانستان شرقاً عبر الهند حتى بنغلاديش، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في أفغانستان، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **موطن تسجيله في المملكة:** تهامة.

48. **صرد ذنوب** | *Lanius schach* | Long-tailed Shrike

الحجم: 20 - 25 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الهند، شرقاً إلى إندونيسيا وغينيا الجديدة، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر على بُعد بضع مئات من الكيلومترات من نطاق إقامته، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران.

49. **غراب جيفي** | *Corvus corone* | Carrion Crow

الحجم: 48 - 54 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه ضمن نطاق يمتد من الجزر البريطانية باتجاه الشرق إلى اليابان وباتجاه الجنوب إلى البحر المتوسط ووادي النيل والأردن والعراق، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته وجنوب شرق الصين. ومن الممكن أن يوجد تعداد صغير متكاثر في أقصى شمال غرب المملكة حيث تم إجراء عدد قليل من الدراسات على الطيور. **موطن تسجيله في المملكة:** مدين.

50. **قُبْرة شرقية** | *Melanocorypha calandra* | Calandra Lark

الحجم: 18 - 20 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في جنوب أوروبا وشمال غرب أفريقيا باتجاه الشرق عبر منطقة البحر المتوسط حتى جنوب كازاخستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر من شمال مصر مروراً بالأردن حتى إيران. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الدمام، الرياض.

51. **قُبْرة غابية** | *Lullula arborea* | Woodlark

الحجم: 15 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وأوروبا الغربية شرقاً حتى البحر الأسود والأردن، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شمال أوروبا شرقاً حتى جبال الأورال وإيران، بينما يقضي فصل الشتاء بالقرب من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. **موطن تسجيله في المملكة:** الصرّار، الجبيل.

52. **دخلة سمكة المنقار** | *Arundinax aedon* | Thick-billed Warbler

الحجم: 18 - 19 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في جنوب شرق روسيا ومنغوليا وشمال شرق الصين؛ ويقضي فصل الشتاء في جنوب وشرق الهند وشرق نيبال حتى فيتنام. **موطن تسجيله في المملكة:** الصرّار.

53. **دخلة سوقاء** | *Iduna caligata* | Booted Warbler

الحجم: 11 - 12.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في غرب روسيا شرقاً حتى غرب منغوليا وجنوباً حتى بحر قزوين، بينما يقضي فصل الشتاء في شرق الهند. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الظهران، الجبيل، الرياض، تبوك، الثّمامة، ينبع.

54. **دخلة سايكسية** | *Iduna rama* | Sykes’s Warbler

الحجم: 11.5 - 13 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في جنوب كازاخستان جنوباً حتى إيران وشمال سلطنة عُمان وباكستان، بينما يقضي فصل الشتاء في باكستان والهند وسريلانكا. **موطن تسجيله في المملكة:** جبل السوداء، الجبيل.

55. **دخلة إيلابيثية** | *Acrocephalus dumetorum* | Blyth’s Reed-warbler

الحجم: 12 - 14 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر من فنلندا شرقاً حتى وسط روسيا وجنوباً حتى طاجيكستان، بينما يقضي فصل الشتاء في الهند وسريلانكا شرقاً حتى ميانمار. **موطن تسجيله في المملكة:** جدة، الثّمامة، ينبع.

56. **دخلة نهريّة** | *Locustella fluviatilis* | River Warbler

الحجم: 14 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في وسط أوروبا شرقاً حتى وسط روسيا؛ ويقضي فصل الشتاء في زيمبابوي وزامبيا والبلدان المجاورة. وتم تسجيل مشاهدة هذا النوع مرات في جزر فُرسان وعلى طول سواحل المملكة، لذلك قد يُرفع تصنيفه قريباً ليصبح من الأنواع المنتظمة ببعض المشاهدات الإضافية. **موطن تسجيله في المملكة:** واحة العبا (بالقرب من الجعيمة)، جزيرة فُرسان، الجبيل، رأس تناقيب، الطائف، ينبع.

57. **خطاف مشرط** | *Neophedina cincta* | Banded Martin

الحجم: 17 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في المناطق الجنوبية الأفريقية الاستوائية، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في الجنوب الأفريقي، بينما يقضي فصل الشتاء في المناطق الشمالية الأفريقية الاستوائية باتجاه الشمال الشرقي حتى إريتريا. **موطن تسجيله في المملكة:** الرياض.

58. **خطاف السهول الأفريقي** | *Riparia paludicola* | African Plain Martin

الحجم: 12 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مقيم؛ يوجد في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شرقاً لإريتريا. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الظهران، بركة خفرة (جنوب الجبيل)، تبوك.

59. **نقشارة بونللي الشرقية** | *Phylloscopus orientalis* | Eastern Bonelli’s Warbler

الحجم: 11.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال شرق البحر المتوسط من كرواتيا وفي مناطق متفرقة حتى سورية وغرب إيران؛ ويقضي فصل الشتاء في الساحل الشرقي، لا سيما السودان، بما في ذلك ساحل البحر الأحمر حتى إريتريا. **موطن تسجيله في المملكة:** الخبر، تبوك.

60. **دخلة صفراء الحاجب** | *Phylloscopus inornatus* | Yellow-browed Warbler

الحجم: 10 - 11 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في سيبيريا ضمن نطاق يمتد من الدائرة القطبية الشمالية حتى منغوليا وشمال الصين؛ ويقضي فصل الشتاء في شرق الهند حتى جنوب الصين وشبه الجزيرة الماليزية. **موطن تسجيله في المملكة:** حقل، الجبيل، تبوك، ينبع.

61. **دخلة إهيمومية** | *Phylloscopus humei* | Hume’s Leaf-warbler

الحجم: 10 - 11 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في جنوب روسيا ومنغوليا والصين جنوباً حتى كشمير ونيبال، بينما يقضي فصل الشتاء في شمال باكستان حتى لاوس. **موطن تسجيله في المملكة:** سلوى.



تم التقاط الصور لطائر دخلة صفراء الحاجب هذا في تبوك، أيّ على بُعد أكثر من 5,000 كم غربي نطاق المناطق الطبيعية التي يقضي فيها فصل الشتاء في جنوب شرق آسيا.

62. **دخلة معتمة** | *Phylloscopus fuscatus* | Dusky Warbler

الحجم: 11 - 12 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في سيبيريا جنوب الدائرة القطبية الشمالية حتى وسط الصين، ويقضي فصل الشتاء في شمال شرق الهند وجنوب الصين حتى شبه الجزيرة الماليزية. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران، الجبيل.

63. **دخلة خضراء** | *Phylloscopus nitidus* | Green Warbler

الحجم: 10 - 11 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال تركيا شرقاً حتى جنوب بحر قزوين وغرب أفغانستان، ويقضي فصل الشتاء في جنوب غرب الهند وسريلانكا. **موطن تسجيله في المملكة:** محمية الخنفة، الظهران، الهفوف، ينبع.

64. **دخلة قطبية شمالية** | *Phylloscopus borealis* | Arctic Warbler

الحجم: 12 - 13 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال شبه الجزيرة الإسكندنافية شرقاً حتى سيبيريا وألاسكا، من أعلى الدائرة القطبية الشمالية جنوباً حتى منغوليا واليابان، بينما يقضي فصل الشتاء في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران.

65. **هاجرة قبرصية** | *Sylvia melanothorax* | Cyprus Warbler

الحجم: 13.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في قبرص، ويقضي فصل الشتاء على طول ساحل البحر الأحمر الغربي وسيناء وربما شمال غرب شبه الجزيرة العربية. **موطن تسجيله في المملكة:** هيت (بالقرب من الرياض)، المدينة المنورة، ينبع.

66. **سمنة دبقية** | *Turdus viscivorus* | Mistle Thrush

الحجم: 27 - 28 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الجزر البريطانية وأوروبا الغربية، وفي مناطق متفرقة من تركيا شرقاً حتى نيبال، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية شرقاً حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء جنوباً حتى البحر المتوسط والعراق وأفغانستان. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الجوف، الظهران.

67. **سمنة مطوقة** | *Turdus torquatus* | Ring Ouzel

الحجم: 23 - 24 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال غرب شبه الجزيرة الإسكندنافية والجزر البريطانية والمرتفعات من جبال البرانس شرقاً حتى جنوب بحر قزوين، بينما يقضي فصل الشتاء في شبه الجزيرة الأيبيرية وشمال أفريقيا وشرق المتوسط وإيران. **موطن تسجيله في المملكة:** الجبيل، الدمام، الظهران، شذقم، ينبع.

68. **سمنة معتمة** | *Turdus eunomus* | Dusky Thrush

الحجم: 23 - 25 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** غير معروف. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شمال روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء في جنوب الصين شرقاً حتى اليابان. **موطن تسجيله في المملكة:** الجبيل، القطيف.

69. **صائد ذباب تايجي** | *Ficedula albicollis* | Collared Flycatcher

الحجم: 13 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شرق فرنسا حتى غرب روسيا، جنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين، بينما يقضي فصل الشتاء في زيمبابوي وزامبيا والبلدان المجاورة. **موطن تسجيله في المملكة:** تبوك، الطائف، ينبع.

70. **القليعي الأبقع** | *Saxicola caprata* | Pied Bushchat

الحجم: 13 - 14 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شرق إيران شمالاً إلى بحر آرال وشرقاً حتى الهند الصينية والفلبين وغينيا الجديدة؛ وتتقلص التعدادات الشمالية الغربية إلى داخل الهند. **موطن تسجيله في المملكة:** الخبر.

71. **أبلق أحمر عجز** | *Oenanthe moesta* | Buff-rumped Wheatear

الحجم: 14.5 - 16 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:**

مقيم؛ يوجد في شمال غرب أفريقيا شرقاً حتى الأردن. **موطن تسجيله في المملكة:** وسط نجد، حائل، وادي السرحان، ينبع.

72. **أبلق متغير** | *Oenanthe picata* | Variable Wheatear

الحجم: 15 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر من جنوب شرق بحر قزوين حتى قيرغيزستان، وجنوباً حتى جنوب إيران وغرب باكستان، بينما يقضي فصل الشتاء في شرق باكستان وشمال غرب الهند. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران.

73. **عصفور البحر الميت** | *Passer moabiticus* | Dead Sea Sparrow

الحجم: 12 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه حول البحر الميت وفي مناطق متفرقة شرقاً حتى شمال الخليج العربي وغرب أفغانستان، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في قبرص وجنوب تركيا، بينما يقضي فصل الشتاء في جنوب العراق وغرب باكستان. **موطن تسجيله في المملكة:** الجبيل، بركة خفرة، سبخة الفصل.

74. **عصفور أصفر زور** | *Gymnoris xanthocollis* | Chestnut-shouldered Bush-sparrow

الحجم: 12.5 - 14 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في الهند، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شرق تركيا والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان شرقاً حتى الهند، بينما يقضي فصل الشتاء ضمن نطاق إقامته. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الظهران، الجبيل، رأس تناقيب.

75. **جشنة زيتونية ظهر** | *Anthus hodgsoni* | Olive-backed Pipit

الحجم: 15 - 17 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجرة؛ يتكاثر في روسيا تحت الدائرة القطبية الشمالية جنوباً حتى جبال الهيمالايا وشرقاً حتى اليابان، بينما يقضي فصل الشتاء في الهند وجنوب شرق آسيا حتى الفلبين. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران، الجبيل.

76. **جشنة ريتشاردية** | *Anthus richardi* | Richard’s Pipit

الحجم: 17 - 18 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شرق كازاخستان وسيبيريا جنوب الدائرة القطبية الشمالية حتى جنوب الصين، ويقضي فصل الشتاء في الهند شرقاً حتى فيتنام. تم تسجيل هذا النوع تسع مرات على الأقل، لذلك فهو قريب جداً من الارتقاء ليصبح من الأنواع المنتظمة. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران، حرص، الجبيل، بركة خفرة، قرية العليا، القطيف، سبخة الفصل.

77. **حسون القش** | *Fringilla coelebs* | Common Chaffinch

الحجم: 14 - 18 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وأوروبا الغربية وشبه الجزيرة الإسكندنافية شرقاً حتى بحر قزوين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية شرقاً حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء في الأردن والعراق وكازاخستان حتى شمال الهند. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران، حنيد، الجبيل.

78. **حسون الكرز** | *Coccothraustes coccothraustes* | Hawfinch

الحجم: 16 - 18 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وأوروبا الغربية وشمال شرق الصين، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في جنوب روسيا، بينما يقضي فصل الشتاء حول البحر الأبيض المتوسط وفي مناطق متفرقة شرقاً حتى جنوب اليابان. **موطن تسجيله في المملكة:** الجبيل.

79. **حسون أخضر** | *Chloris chloris* | European Greenfinch

الحجم: 14.5 - 16 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وأوروبا شرقاً حتى كازاخستان وجنوباً حتى فلسطين والعراق، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية حتى كازاخستان، بينما يقضي فصل الشتاء في شمال أفريقيا وسيناء وتركمانستان، وربما شمال غرب المملكة. **موطن تسجيله في المملكة:** شرفة، تبوك.



يوجد عصفور البدر الميت بشكل متقطع في المنطقة الممتدة من الأردن وحتى باكستان، لكن تم رصد هذا الطير في سبخة الفصل.



سمنة صخرية زرقاء

80. **نعار أحمر الجبهة** | *Serinus pusillus* | Red-fronted Serin

الحجم: 10.5 - 13 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ يوجد في مناطق متفرقة من تركيا شرقاً حتى نيبال وغرب الصين، بينما يقضي بعض تعداداته فصل الشتاء في تركيا جنوباً حتى فلسطين. **موطن تسجيله في المملكة:** الجبيل.

81. **درسة حمراء الرأس** | *Emberiza bruniceps* | Red-headed Bunting

الحجم: 15 - 16.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في كازاخستان حتى غرب منغوليا وجنوباً حتى أفغانستان، بينما يقضي فصل الشتاء في الهند. **موطن تسجيله في المملكة:** الرياض، تبوك.

82. **درسة صخرية** | *Emberiza cia* | Rock Bunting

الحجم: 15 - 16.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتزايد. **النطاق العالمي:** مهاجر جزئياً؛ توجد التعدادات المقيمة منه في شمال غرب أفريقيا وجنوب أوروبا شرقاً حتى نيبال، أما التعدادات المهاجرة فتتكاثر في أفغانستان باتجاه الشمال الشرقي حتى منغوليا، بينما يقضي فصل الشتاء حول البحر الأبيض المتوسط جنوباً حتى سينا، وفي باكستان حتى شمال الهند. **موطن تسجيله في المملكة:** رأس تنورة.

83. **درسة صنوبرية** | *Emberiza leucocephalos* | Pine Bunting

الحجم: 16 - 17.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في روسيا جنوب الدائرة القطبية الشمالية وجنوباً حتى كازاخستان ومنغوليا وشمال الصين، بينما يقضي فصل الشتاء في شرق البحر المتوسط، ومن شمال إيران حتى شمال الهند وشمال شرق الصين واليابان. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران، الجبيل.

84. **درسة قصبية** | *Emberiza schoeniclus* | Reed Bunting

الحجم: 14 - 16.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في أوراسيا أسفل الدائرة القطبية الشمالية؛ ويقضي فصل الشتاء حول البحر الأبيض المتوسط، شرقاً عبر العراق حتى شمال الهند وشرق الصين واليابان. **موطن تسجيله في المملكة:** بقيق، الدمام، الجبيل، سبخة الفصل.

85. **درسة صفراء صدر** | *Emberiza aureola* | Yellow-breasted Bunting

الحجم: 14 - 15.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** مهدد بالانقراض بشكل حرج. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في روسيا ومنغوليا وشمال شرق الصين، بينما يقضي فصل الشتاء في شمال الهند وجنوب شرق آسيا. **موطن تسجيله في المملكة:** الحني (بالقرب من الهفوف).

86. **درسة الريف** | *Emberiza rustica* | Rustic Bunting

الحجم: 13 - 14 سم. **حالة الحماية العالمية:** معرض للانقراض. **المنحى العالمي للمجموعة:** يتناقص. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية حتى شرق مضيق بيرينغ، بينما يقضي فصل الشتاء في شرق الصين حتى اليابان. **موطن تسجيله في المملكة:** الظهران.

87. **درسة صغيرة** | *Emberiza pusilla* | Little Bunting

الحجم: 12 - 13.5 سم. **حالة الحماية العالمية:** غير مهدد. **المنحى العالمي للمجموعة:** مستقر. **النطاق العالمي:** مهاجر؛ يتكاثر في شبه الجزيرة الإسكندنافية شرقاً حتى مضيق بيرينغ، بينما يقضي فصل الشتاء في نيبال حتى جنوب شرق الصين. **موطن تسجيله في المملكة:** الدمام، خليج العقبة، جدة.